تقـــديم

تشكل الأرض أهمية كبرى فى اقتصاديات الأمم وشعوبها المتزايدة من حيث كونها أساس إنتاج مقومات الإنسان وحضارته، لذا ارتبطت الحضارات الأولى للبشرية بالمناطق الخصبة من العالم مثل وادى النيل والفرات. وتجمعت لدى الإنسان من خلال فلاحة الأرض واستغلالها القدرة على تطويعها لصالحه قدر الإمكان. وحاليا نتيجة تطور المعلومات الجديدة عن الأراضى تسهم الدراسات بدور كبير فى وضع الأسلوب المناسب لتوصيف مشاكلها ووضع الحلول العلمية لها؛ بهدف تعظيم العائد من هذا المورد الحيوى.

وتواجه أراضى الوطن العربى العديد من العوامل تقلل من إنتاجيتها وإسهامها فى الدخل القومى، وتأتى مشكلة تأثرها بالأملاح فى مقدمة هذه العوامل نظرا لوقوع أغلب الأراضى العربية ضمن المناطق الجافة ونصف الجافة ـ وبسبب المناخ الجاف السائد إلى زيادة البخر وتراكم الأملاح بها.

ويتناول الكتاب المشاكل المختلفة التى تواجه الأراضى المصرية كأحد نماذج أراضى الوطن العربى ـ والتى تتشابه جميعها لحد كبير فى الظروف والعوامل المسببة لهذه المشاكل ـ كما يتعرض الكتاب أيضا إلى الدراسات والتطبيقات والدروس المستفادة فى مواجهة هذه المشاكل.

ويتناول الكتاب موضوع الأراضى الزراعية المصرية، وعوامل تكوينها وتقسيمها، والأسلوب المتبع فى التصنيف حسب قدرتها الإنتاجية. وتعتبر بيانات ونتائج الحصر

التصنيفى ـ التى توصل إليها معهد بحوث الأراضى والمياه (١٩٥٧ ـ ١٩٧٣) ـ حجر الأساس لمشروعات تحسين الأراضى؛ حيث أسفرت هذه البيانات عن وضع تصور دقيق لوضع الأراضى وإنتاجيتها بالمحافظات المختلفة، وفى الوقت نفسه تتخذ هذه البيانات سنة الأساس فى تتبع التغيرات بخواص الأراضى، نتيجة الأساليب الجديدة فى خدمة الأراضى والعمليات الزراعية والتسميد وطرق إدارة المياه.

وتدور فكرة هذا الكتاب حول المشاكل الرئيسية التى تواجه الأراضى المصرية والتى تقلل من مدى إسهامها فى الدخل القومى ومستقبل هذه المشاكل من خلال البرامج والحلول التطبيقية لمواجهتها. كما يهدف الكتاب كذلك إلى تعريف القارئ بمشكلات ومستقبل الأراضى المصرية فى ظل تحديات الزيادة السكانية العالية.

ويتطرق الفصل الثانى إلى معالجة موضوع الخواص الطبيعية للأراضى المصرية ومدى ارتباطها بالإنتاجية؛ فى محاولة لوضع المدى الذى تقع به قيم بعض الخواص الطبيعية للأراضى المختلفة الإنتاجية.

ويختص الفصل الثالث بموضوع فقد الأراضى الزراعية الذى يشكل أهمية كبرى فى الوقت الحالى؛ المتميز بظاهرة الزيادة المطردة فى السكان، وازدياد الفجوة الغذائية. وفى هذا الخصوص نوقشت البيانات المتعلقة بمساحة الأراضى الزراعية وتطورها، والاختلاف بين المصادر المختلفة فى تحديدها؛ مما يدعو الحاجة إلى توجيه الجهود نحو دقة تحديدها بما يكفل التخطيط الأمثل للموارد المتاحة، وفى الوقت نفسه تتفاوت المصادر المختلفة فى تحديد قيم الفقد السنوى بالأراضى الزراعية؛ نتيجة عوامل الفقد المتعددة؛ مثل الزحف العمرانى، والتجريف، وصناعة الطوب، والتبوير، والفقد بالنحر المائى.

وتواجه الأراضى المصرية مشكلة تأثرها بالأملاح، وقد تناولها الفصل الرابع من حيث انتشارها بأراضى المحافظات المختلفة، كما أظهرتها بيانات الحصر التصنيفى للأراضى، بالإضافة إلى العوامل المختلفة التى تسهم فى تواجدها، وفى الوقت نفسه استعرضت بعض الدراسات التى أجريت فى بعض المناطق حديثا، بغرض تتبع

الاختلافات التى طرأت على مساحات الأراضى المتأثرة بالأملاح بعد مرور حوالى عشرين عاما من انتهاء دراسات الحصر التصنيفى. وقد أوضحت هذه النتائج حتمية إعادة الحصر التصنيفى للأراضى المصرية لتحديث المعلومات الخاصة بالأراضى؛ مما يتيح فرصة التخطيط الأمثل للموارد الأرضية.

ومن جهة أخرى يمثل الصرف الزراعى حجر الزاوية فى تحسين الأراضى ومنع تدهورها. وقد اختص الفصل الخامس بتحديد مشكلة الصرف فى الأراضى المصرية على مستوى المحافظات، علاوة على المناطق ذات المشاكل الخاصة بالصرف التى تحتاج إلى مزيد من الدراسات، كما اشتمل كذلك على برامج الصرف المغطى فى مصر والأساليب المتبعة فى تقييم هذه البرامج.

وتحتم ظروف الجفاف ـ الذى أصاب القارة الإفريقية ـ اللجوء إلى تطبيق الدراسات المتعلقة بإدارة المياه، والعمل على ترشيد استخدامها. وقد قامت وزارة الأشغال والموارد المائية بوضع نتائج دراسات مشروع Ewup موضع التنفيذ على المستوى القومى؛ بحيث تضمنت الاستراتيجية المائية للوزارة الموارد المائية التى يمكن توفيرها، ومن ضمنها ماتوفره أساليب ترشيد الرى. وقد تناول الفصل السادس موضوع الرى فى مصر، ومشاكل الأراضى، ونوعية مياه المصارف، بالإضافة إلى الأساليب المقترحة التى تتبع حاليا فى مناطق المشروع القومى لتطوير الرى فى مصر.

ومن المشاكل الهامة التى تواجه الأراضى المصرية ـ والتى عنى الكتاب بها ـ موضوع خصوبة الأراضى والعوامل المختلفة التى تحدد صلاحية العناصر الكبرى والصغرى فى كل من الأراضى القديمة والجديدة؛ فقد شمل الفصل السابع الدراسات التى قام بها معهد بحوث الأراضى والمياه، وهى دراسات خاصة بمستويات هذه العناصر بالأراضى المخصصة لزراعة القطن بهدف استخدامها فى وضع تصور أفضل للمقررات السمادية لهذا المحصول، استرشاداً بنتائج اختبارات التربة. وقد تعرض الكتاب ـ فى هذا الأمر ـ لأسس السياسة السمادية فى مصر، وغياب طمى النيل، ووسائل صيانة خصوبة الأراضى.

ونظرا للاتجاه الحتمى للدولة نحو التوسع الأفقى.. فقد تناول الفصل الثامن موضوع الأراضى الجديدة، والبرامج المختلفة للتوسع وتطورها، وتوصيات الدراسات المختلفة، علاوة على دراسات المخطط الرئيسى للأراضى. وفى الوقت نفسه.. فقد شمل هذا الفصل الأسلوب الذى اتبع فى استصلاح الأراضى بكل من مشروعات مريوط والنهضة وسمالوط والملاك؛ بهدف إظهار الدروس المستفادة من هذه التطبيقات، وتوجيه الجهود نحو تطوير الأساليب طبقا للواقع الحالى، وتفادى السلبيات التى واجهت تحقيق أهدافها.

ويمثل موضوع التلوث إحدى النقاط الهامة فى الوقت الحالى لانعكاساته الكبيرة على العنصر البشرى. وقد اختص الفصل التاسع بدراسة عوامل التلوث بالأراضى المصرية؛ من حيث إعادة استخدام المياه الناتجة من الصرف الزراعى والمخلفات الصناعية، وكذلك تأثير استخدام مبيدات الحشائش على خواص الأراضى المختلفة، بالأضافة إلى تأثير عوادم السيارات فى كل من الأراضى والمحاصيل الناتجة. وتسهم هذه الدراسات فى كيفية مواجهة الآثار المترتبة على تنفيذ المشروعات الكبرى المستخدمة لهذه المخلفات.

obeikandl.com

الأراضى الزراعية

obeikandl.com

obeikandl.com

مقدمـــة :

تعتبر الأراضى الزراعية من أهم الثروات القومية التى يجب العناية بها والحفاظ عليها، حيث تمثل إنتاجية الرقعة الزراعية ركنا هاما فى الدخل القومى، ولهذا تستأثر باهتمامات الباحثين والدراسات المتعلقة بجميع فروع الأراضى من أجل صيانتها ورفع إنتاجيتها.

وتتحدد إنتاجية المحاصيل من خلال عوامل عديدة لها تأثيراتها الكمية والنوعية، تختلف طبقا لأهميتها من عامل لآخر. وتحتل الأراضى مقدمة هذه العوامل، حيث تمثل المهد ووسط النمو والسند الميكانيكى للنبات؛ وعلى هذا تعتبر الأرض أساس الإنتاج الزراعى؛ إن صلحت أنتجت، وإن فسدت أفقرت؛ وذلك مما يدعو المشتغل بالزراعة إلى ضرورة معرفة ماهيتها، وتكوينها، ومكوناتها، وخواصها المختلفة؛ حتى يمكن معالجة عيوبها، والاستفادة المثلى منها؛ فالإنسان يعتمد فى غذائه على ماتخرجه الأرض، كما تعتمد الأرض على الإنسان وكيفية استغلاله لها.

وبصفة عامة تعتبر الملوحة أحد المشاكل ذات الأثر الواضح فى استغلال أراضى الوطن العربى سواء التى يراد إستصلاحها وإضافتها إلى المساحة المنتجة أو الأراضى التى تزرع فعلا.

وتتناول فصول الكتاب مشاكل الأراضى المصرية من حيث العوامل المسببة لها

والدراسات العلمية وتطبيقات النتائج المتحصل عليها والوسائل المختلفة فى مواجهة هذه المشاكل..

وتواجه الأراضى المصرية ـ فى وقتنا الحاضر ـ عديد من المشاكل تتدخل فى قدر إسهامها فى تكوين الدخل القومى. ومما لاشك فيه أن توصيف هذه المشاكل وتقديرها ـ بالإضافة إلى وضع وتقييم الحلول المناسبة ـ يسهم فى تخطيط استغلال هذا المصدر الحيوى.

ويتناول هذا الفصل أسس تكوين الأراضى وعوامل تكوين الأراضى المصرية وخواصها وتقسيمها طبقا للتقسيم الأمريكى؛ شاملة الأراضى القديمة والجديدة.

عوامل تكوين الأراضي:

يتدخل عديد من العوامل فى تكوين وتحديد خواص الأراضى. وتبعا لذلك فإن الأرض الزراعية ماهى إلا نتيجة لتأثيراتها التى تتمثل فى كل من الظروف الجوية والجيولوجية والطبوغرافية والحيوية، ويرى العالم ينى Jenny (١٩٤١) أن الأرض تعتبر محصلة لعدة متغيرات؛ هى المناخ، ومادة الأصل، والزمن، والكائنات الحية، وطبوغرافية المكان. وينتج من هذه العوامل بدرجاتها المختلفة عديد من الأراضى تختلف كثيرا أو قليلا عن بعضها البعض.

وقد اتخذت هذه العوامل التكوينية المتعددة أساسا للمحاولات الخاصة بتقسيم الأراضى إلى مجموعات متشابهة أو متقاربة فى خواصها. وبرغم تعدد هذه المحاولات ـ التى تعتمد على أحد هذه العوامل أو غيرها من العوامل المرتبطة ببعضها ـ نجد أنها ترتكز على مدى ونوع عمليات غسيل ونقل مكونات التربة من طبقة لأخرى؛ وهى العمليات التى تنتهى بتكوين القطاع الأرضى.

وسنناقش ـ فيما يلى ـ العوامل الأساسية لتكوين الأراضى المصرية، علاوة على الرتب الأساسية التى تندرج تحتها هذه الأراضى طبقا للتقسيم الأمريكى-Soil Taxonomy (١٩٧٥).

عوامل تكوين الأراضي المصرية:

تتدخل بعض العوامل الأساسية فى تكوين الأراضى المصرية؛ حيث تؤثر فى مادة الأصل، وتحولها تدريجيا إلى تربة ذات خواص مميزة. وتنحصر عوامل تكوين هذه الأراضى فيما يلى:

أولا ـ المناخ:

تقسم مصر إلى ٦ مناطق مناخية فرعية؛ وهى:

١ ـ ساحل البحر الأبيض المتوسط.

٢ ـ الدلتا.

٣ ـ مصر الوسطى.

٤ ـ مصر العليا.

٥ ـ سيناء.

٦ ـ الواحات.

وتتشابه هذه المناطق ـ إلى حد كبير ـ فى متوسطاتها المناخية ماعدا المنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط؛ حيث تبلغ كمية الأمطار الساقطة حوالى ١٣٩ ملليمتراً / السنة ، فى حين تروى أراضى الوادى والدلتا ريا صناعيا تصل كميته إلى حوالى ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ ملليمتر/ السنة. كما أن أراضى الواحات تعتمد أيضا على الرى الصناعى. وعلى هذا الأساس نجد أن المناخ فى مصر ليس له تأثير يذكر على الأراضى، بعكس مناخ التربة الذى يختلف من تربة لأخرى. ويقع هذا الاختلاف فى مدى كبير بين التربة المروية صناعيا (الدلتا / الوادى/ الواحات) والتربة الموجودة تحت المناخ الصحراوى الطبيعى الشديد الجفاف.

ثانيا ـ مادة الأصل:

تعتبر معظم الأراضى الزراعية المصرية المستغلة الآن فى الزراعة أراضى منقولة،

obeikandl.com

وتزيد مساحتها على ٣,٥٪ من مساحة مصر، فى حين نجد أن بقية الأراضى ـ برغم أنها غير منزرعة ـ عبارة عن أراضٍ محلية، باستثناء الوديان المنحدرة، وسلاسل التلال التى تغطى شرقى مصر، ومناطق الكثبان الرملية فى الصحراء الغربية.

وعموما تنقسم الأراضى المصرية طبقا لتكوينها إلى قسمين:

(أ) أراضى رسوبية (منقولة):

١ ـ أراضى الوادى والدلتا.

٢ ـ أراضى طرح البحر.

٣ ـ الأراضى السافية.

٤ ـ الأراضى السفحية.

٥ ـ الأراضى البحرية النهرية.

٦ ـ الأراضى الرسوبية الملحية.

٧ ـ الأراضى الرسوبية القلوية.

(ب) الأراضى المحلية، وتشمل الأراضى التى تكونت فى مكانها؛ وهى:

١ ـ أراضى الصحراء الغربية.

٢ ـ أراضى الصحراء الشرقية.

٣ ـ أراضى الواحات.

٤ ـ أراضى صحراء مريوط.

٥ ـ أراضى صحراء شبه جزيرة سيناء.

وسنقتصر فى هذا المجال على أراضى الوادى والدلتا المكونة لمعظم الرقعة الزراعية المصرية.

وادي ودلتا النيل:

يعتبر طمى النيل ـ الذى يتكون من نواتج تحلل الصخور البازلتية والجرانيتية فى

obeikandl.com

هضبة الحبشة ـ مادة الأصل لكل من أراضى الوادى والدلتا الرسوبية. ويحمل النيل هذا الطمى فى أوقات موسمية تبعا لنزول الأمطار على الهضبة الحبشية؛ وبذلك أصبح ترسيب الطمى موسميا، وتختلف كمياته من سنة لأخرى حسب حجم الأمطار.

وتختلف الطبقات التى يرسبها النهر فى سمكها وحجم الحبيبات المكونة لها تبعا لمستوى الفيضان، بالإضافة إلى ظروف الترسيب؛ حيث تتاح الفرصة للحبيبات الدقيقة للترسيب عند بطء التيار، فى حين ترسب الحبيبات الخشنة بزيادة سرعة الفيضان. وطبقا لجون بول (١٩٣٩) يصل سمك الطبقة التى يرسبها النيل سنويا فوق مساحة الوادى كله إلى نحو ٠,٩ ملليمتراً. وتختلف الأراضى الرسوبية النهرية اختلافا واسعا فيما بينها؛ من حيث تكوين هذه الطبقات وقوامها واندماجها.

وتكون الأراضى النهرية الرسوبية نحو ٧٠ ـ ٨٠٪ من مساحة الأراضى المنزرعة فى مصر. ويتراوح سمك طبقة الطمى بين ٦,٧ مترا للمسافة من أسوان إلى قنا، و ٨,٥ مترا للمسافة من قنا إلى المنيا، و ٩,٧ مترا للمسافة من المنيا إلى القاهرة؛ أى بمتوسط قدره ٨,٣ متراً للوجه القبلى. ويبلغ سمك هذه الطبقة حوالى ١١,٣ مترا شمالى خط عرض ٣١°، الذى يمر بمدينة طنطا، فى حين يبلغ سمكها ٨,٥ مترا جنوبى هذا الخط؛ وبذلك يبلغ متوسط سمك هذه الطبقة ٩,٨ مترا فى الوجه البحرى.

والطبقات الرسوبية النهرية طبقات عديسية الشكل غير مستمرة الامتداد لمسافات طويلة. وطبيعى أن تكون بعض الطبقات رملية أو سلتية أو طينية حسب ظروف تكوينها، وهذا يؤثر فى مستوى الماء الأرضى فى هذه الأراضى، بل ويسبب بعض المشاكل المرتبطة بالصرف الزراعى.

وينحدر منسوب وادى النيل ابتداء من وادى حلفا حتى البحر المتوسط بما يوازى ١٠٠ متر خلال المسافة التى تبلغ حوالى ١٠٠٠ كيلو متر. والجدير بالذكر أن الانحدار بطول الوادى غير ثابت فى هذه المسافة كلها؛ حيث يصل إلى ١ : ٧٠٠٠

فى جنوبى الوادى، بينما يبلغ ١ : ١٢٠٠٠ فى شمال الدلتا؛ مما يدل على أن سرعة التيار تقل كلما توغل النهر مقتربا من المصب بالبحر المتوسط، وهذا الاختلاف ينعكس على قدرته على حمل الحبيبات، مما يؤدى إلى خشونة القوام فى الصعيد، ثم يتحول هذا القوام بعد ذلك إلى قوام طينى فى شمالى الدلتا.

وفى الوقت نفسه تصاحب الاختلافات فى سرعة المياه بمنتصف المجرى حتى الجانبين ترسيبا للحبيبات الخشنة أولا، ثم الحبيبات الأدق من الطين والسلت عند إبطاء سرعة النهر؛ ويؤدى ذلك إلى وجود نطاقات موازية للمجرى تبدأ بالأرض الرملية، وتتدرج حتى تصل إلى الطينية الثقيلة. وقد تتداخل بعد ذلك الرمال التى تحد الوادى من الجانبين؛ فبعد أن تصبح الأرض طينية تعود فيتحول قوامها سريعا إلى طينية رملية ورملية بجانب الصحراء مباشرة.

وتعتبر الأراضى النهرية النيلية من أجود الأراضى الزراعية المصرية وأغناها بالعناصر الغذائية برغم تعرضها لبعض المشاكل المتعلقة بالصرف وارتفاع مستوى الماء الأرضى والملوحة.

تقسيم الأراضي المصرية:

طبقا للتقسيم الأمريكى Soil Taxonomy (١٩٧٥) تندرج الأرض الزراعية المصرية القديمة والجديدة تحت ثلاث رتب رئيسية؛ هى:

أولا ـ رتبة : Vertisols

تشمل هذه الرتبة أراضى السهول الفيضية لنهر النيل وفروعه، كما تشمل بعض أراضى الواحات بالصحراء الغربية. وتبلغ مساحة هذه الأراضى حوالى ٩٠٪ من جملة الأراضى القديمة لكل من الوادى والدلتا. وتتميز هذه الأراضى بما يلى:

١ ـ حدوث شقوق عميقة قد تصل إلى حوالى ١,٥ متراً عند جفاف هذه الأراضى، وتظل هذه الشقوق مفتوحة معظم شهور السنة مادامت عملية الرى لم تحدث.

٢ ـ وجود ظاهرة Slicken Sides (السطوح المنزلقة) نتيجة عمليات التمدد والانكماش.

٣ ـ تزيد نسبة الطين عن ٣٥٪. والمعدن السائد هو المونتموريللونيت.

٤ ـ عند ترك هذه الأراضى بورا تسود ظاهرة Gilgai؛ وهى عبارة تموج السطح عند جفاف الأرض.

ويراعى عند خدمة هذه الأراضى ضرورة عدم الوصول بمحتواها الرطوبى إلى درجة الجفاف لمدة طويلة؛ لتلافى حدوث الشقوق العميقة التى تعوق خدمتها، علاوة على ماتسببه من أضرار للمجموع الجذرى للمحاصيل المنزرعة بها. وبالإضافة إلى ماسبق يراعى الاهتمام بعملية العزيق لسطح التربة مع مراعاة إضافة الأسمدة العضوية؛ لتسهيل عمليات الخدمة وإجراء العمليات الزراعية المختلفة. وهذه الأراضى تجود بها معظم المحاصيل، وخاصة القطن ذا الجذر الوتدى.

ثانيا ـ رتبة : Entisols

وهى الأراضى الحديثة التى لم يحدث بها تطور فى قطاعها الأرضى، ولم يظهر بها آفاق تشخيصية. ويقع تحت هذه الرتبة تحت المجموعات التالية:

١ ـ Typic Torrifluvents :

وتشمل أكتاف النهر Levees وفروعه المختلفة القديمة والحديثة التى تتخلل الدلتا والوادى. وتتميز هذه الأراضى بأنها:

(أ) ذات قوام متوسط يقع بين القوام الطميى الرملى والطميى، أو الطميى الطينى الرملى.

(ب) تقل نسبة الطين فيها عن ٣٥٪.

وهذه الأراضى تغطى حوالى ٥ ـ ١٠٪ من جملة الأراضى القديمة. وتتميز هذه الأراضى بسهولة خدمتها وصرفها، علاوة على أنها تناسب زراعة أشجار الفاكهة ومحاصيل الخضر.

٢ ـ تحت مجموعة : Vertic Torrifluvents

وتتواجد هذه الأراضى بالسهول الفيضية للوادى والدلتا. وتتميز بما يلى:

(أ) شقوق عميقة عند جفافها، مع غياب ظاهرة الانزلاق Slicken Sides. ويعزى غياب هذه الظاهرة إلى كون هذه الأراضى رطبة بصفة مستمرة، وخاصة فى الطبقات تحت السطحية، بالإضافة إلى أن حركة الأرض نتيجة التمدد والانكماش غير كافية لظهورها.

(ب) غياب ظاهرة Gilgai.

(جـ) ترتفع بها نسبة الطين عن ٣٥٪ فى طبقات يزيد مجموعها على ٥٠ سم خلال متر من السطح.

٣ ـ تحت مجموعة : Typic Torripsamments

يندرج تحتها معظم الأراضى الجديدة، بالإضافة إلى الأراضى الرملية التى تتخلل الوادى والدلتا. ونسبة الطين والسلت بهذه الأراضى تقل من ١٠٪.

٤ ـ تحت مجموعة : Lithic Torripsamments

وهى الأراضى الرملية التى يقل عمق القطاع فيها عن ٥٠ سم.

٥ ـ تحت مجموعة : Typic Torriorthents

وهى الأراضى الحصوية، وتتواجد بها نسبة عالية من الحصى أكثر من ٣٥٪. وتوجد هذه الأراضى فى الشرفات النهرية القديمة. وقد تعرضت هذه الأراضى للتعرية وهى غير مستوية السطح، ولا توجد بها شقوق، ونسبة الطين فيها أقل من ٣٥٪.

٦ ـ تحت مجموعة : Lithic Torriorthents

وهى أراضٍ حصوية ذات قطاع محدود حتى ٥٠ سم من السطح.

٧ ـ تحت مجموعة : Vertic Torriorthents

وهى أراضٍ حصوية بها نسبة طين أعلى من ٣٥ ٪، وبها شقوق.

٨ ـ تحت مجموعة : Aquic Torriorthents

وهى أراضٍ حول البحيرات الشمالية ذات مستوى ماء أرضى مرتفع، تغمرها مياه البحر فى بعض أوقات السنة، وتظهر بها بقع Mottling وظاهرة Gley.

ثالثا ـ رتبة : Aridisols

وتشمل كلاً من الأراضى الملحية شمالى الدلتا، وكذلك الأراضى الجيرية والجبسية المحتوية على آفاق تشخيصية تشملها تحت المجموعات التالية:

١ ـ تحت مجموعة : Typic Salorthids

وتتميز هذه الأراضى الملحية بوجود أفق ملحى، تزيد نسبة الأملاح الذائبة على ٢ ٪. وتتواجد أغلب هذه الأراضى فى شمالى الدلتا؛ حيث تغطى المساحات غير المستصلحة المتأثرة بزحف مياه البحر، علاوة على ارتفاع ملوحة الماء الأرضى القريب من السطح.

٢ ـ تحت مجموعة : Typic Calciorthids

وتشمل الأراضى الجيرية التى تتميز بوجود أفق سمكه لايقل عن ١٥ سم، حدُّه الأعلى خلال متر واحد من السطح، مع وجود كربونات الكالسيوم أعلى من ١٥ ٪ تحتوى على تكوينات ثانوية جيرية تزيد على الأفق الذى يليه بمقدار ٥ ٪، ومعظم هذه الأراضى تتواجد بغرب النوبارية وامتداد الساحل الشمالى.

وتتميز هذه الأراضى بتكون القشرة السطحية الصلبة التى تؤثر فى الإنبات والمجموع الجذرى للبادرات؛ لذا تحتاج إلى الإضافات العضوية مع حسن إدارة المياه بها.

٣ ـ تحت مجموعة : Typic Gypsiorthids

وهى الأراضى الجبسية التى تتميز بوجود أفق جبسى (كبريتات كالسيوم)، حدُّه الأعلى خلال متر واحد من السطح. ويزيد حاصل ضرب سمك الطبقة فى نسبة الجبس على ٣٠٠٠. وعندما يقل حاصل الضرب عن ٣٠٠٠ تندرج تحت المجموعة Cambic Gypsiorthids .

وإذا تواجد الأفق الجبسى فى حالة تحجر ـ بحيث لايمكن كسره أو اختراقه أو تفككه بالماء ـ توضع الأراضى تحت المجموعة Petrogypsic Gypsiorthids. وعند وجود أفق جيرى يعلو الأفق الجبسى تقع هذه الأراضى ضمن تحت المجموعة Calcic Gypsiorthids.

القدرة الإنتاجية للأراضي المصرية:

يسهم القطاع الزراعى فى مصر إسهاماً كبيراً فى تكوين الدخل القومى؛ لذا تحظى عناصر الإنتاج الزراعى الخاصة بالأراضى والمياه باهتمام الدولة؛ من حيث برامج تحسينها وصيانتها وزيادة مواردها؛ معتمدة على الأساليب العملية ونتائج الدراسات المختلفة.

ومن أجل تخطيط أمثل للزراعة المصرية تهتم وزارة الزراعة بدراسة خواص الأراضى، وتتبع العوامل المختلفة التى تؤثر فى مستوى قدرتها الإنتاجية؛ مثل كفاءة الصرف، وارتفاع مستوى الماء الأراضى، وملوحة الأراضى، علاوة على العمليات الزراعية المختلفة.

وقد قام معهد بحوث الأراضى والمياه بتنفيذ مشروع حصر وتقسيم الأراضى المصرية خلال الفترة من (١٩٥٧ ـ ١٩٧٣). وهذا التقسيم يعد تقسيما للأراضى حسب قدرتها الإنتاجية؛ حيث تم تجميع البيانات المتعلقة بالخواص الطبيعية والكيماوية للأراضى، وكذلك البيانات الخاصة بالمحاصيل. وتسهم هذه البيانات فى تحديد المناطق المختلفة فى إنتاجيتها، وتحديد المحصول المناسب، بالإضافة إلى حصر المناطق البور، وتحديد أولوية وطرق إصلاحها.

وقد أجريت دراسات الحصر التصنيفى للأراضى على أساس المستوى نصف التفصيلى (قطاع واحد لكل ٥٠ ـ ٦٠ فداناً) وبعمق ١٥٠ سم أو مستوى الماء الأرضى، ودرست خواص القطاع من حيث اللون، والقوام، والبناء، والتماسك، والليونة، وتتابع طبقات القطاع، ونسبة الكربونات، وعمق الماء الأرضى وملوحته. هذا إلى جانب البيانات الأخرى بالمنطقة؛ من حيث الغطاء النباتى، والمحاصيل المزروعة، والإنتاجية، وحالة الرى والصرف، وتكلفة إنتاج المحاصيل.

وقد قسمت الأراضى ـ حسب قدرتها الإنتاجية ـ إلى ست مجموعات طبقا للبيانات المتحصل عليها فى الحقل، علاوة على قيم التقديرات الكيماوية والطبيعية لطبقات التربة؛ وذلك باتباع أسلوب المكتب الأمريكى لاستصلاح الأراضى (١٩٥٠)، بالإضافة إلى بعض التعديلات التى أدخلت عليه تحت الظروف المصرية (غيث ١٩٥٨).

١ ـ أراضى الدرجة الأولى:

وهذه تشمل الأراضى ذات الخواص المناسبة لإنتاج جميع المحاصيل بتكلفة أقل من قيمة إنتاجيتها، ويتوفر لها مصدر جيد للرى مع كفاءة عالية للصرف. كما أنها ذات قطاع أرضى عميق يسوده القوام المتوسط، ولا يزيد مجموع الأملاح الذائبة بمستخلص عجينة التربة على ٠,٢ ٪، ولا تزيد قيم التوصيل الكهربى على ٤ ملليموز / سم، ويقل الصوديوم المتبادل عن ١٥ ٪، كما أن رقم الحموضة PH أقل من ٨,٥.

٢ ـ أراضى الدرجة الثانية:

هذه الأراضى مناسبة لإنتاج معظم المحاصيل، وتتميز بكفاءة عالية للصرف، مع توفر مصدر الرى. وهذه الأراضى ذات قوام ناعم ويتراوح مجموعة الأملاح الذائبة بمستخلص عجينة التربة من ٠,٢ ٪ ـ ٠,٥ ٪. كما تقع قيم التوصيل الكهربى فى المدى ما بين ٤ ـ ٨ ملليموز/ سم. ويقل الصوديوم المتبادل عن ١٥ ٪ ، كما أن رقم الحموضة PH أقل من ٨,٥.

٣ ـ أراضى الدرجة الثالثة:

تناسب هذه الأراضى زراعة عدد محدود من المحاصيل. وترتفع تكلفة إنتاجها مع انخفاض العائد الناتج منها. وقوام هذه الأراضى ثقيل جدا أو خشن. ويقع مجموع الأملاح الذائبة فى المدى مابين ٠,٥ ـ ١ ٪. ودرجة التوصيل الكهربى لمستخلص عجينة التربة تتراوح بين ٨ ـ ١٦ ملليموز/ سم، وتبلغ نسبة الصوديوم المتبادل أقل من ١٥ ٪، ودرجة الحموضة أقل من ٩,٠

٤ ـ أراضى الدرجة الرابعة:

تشمل الأراضى المحدودة الإنتاجية التى تكون إمكانات الصرف بها سيئة، وتحتاج إلى ظروف خاصة لإنتاج المحاصيل. وتكلفة إنتاج المحاصيل هنا عالية. ويندرج تحت هذه الأراضى مايلى:

(أ) الأراضى الرملية المحتوية على أكثر من ٩٠ ٪ رملاً.

(ب) الأراضى الجيرية المحتوية على أكثر من ٢٠ ٪ كربونات الكالسيوم.

(جـ) الأراضى الثقيلة جدا المحتوية على نسبة عالية من الأملاح الذائبة.

(د) الأراضى القلوية.

(هـ) الأراضى التى يرتفع بها مستوى الماء الأرضى.

(و) الأراضى ذات القطاع الأرضى غير العميق.

(ز) الأراضى التى تحتوى على طبقات صماء محددة لنمو الجذور وتقلل النفاذية.

٥ ـ أراضى الدرجة الخامسة:

تشمل كلاً من الأراضى البور والأراضى التى تحت الإصلاح. وتقسم أراضى هذه الدرجة إلى أربعة أقسام تعتمد على نوعية الأراضى بعد استصلاحها.

٦ ـ أراضى الدرجة السادسة:

تشمل جميع الأراضى التى لاتناسب إنتاج المحاصيل؛ كالأراضى الحجرية، وكذلك المخصصة للمنافع العامة.

وقد أشار غيث (١٩٥٨) إلى فعالية تطبيق هذا النظام فى حصر كل من الأراضى المزروعة وغير المزروعة وإمكانية تطويره؛ اعتمادا على الخبرة وحسن استخدام بيانات الدراسات الحقلية والمعملية.

الحصر التصنيفي للأراضي الزراعية المصرية:

باستعراض نتائج الحصر التصنيفى (١٩٥٧ ـ ١٩٧٣) المبينة بالجدولين (١، ٢) يتضح مايلى:

١ ـ تبلغ جملة المساحة المزروعة بدرجاتها الأربع ٣,٥٩٢، ٢,٢٩١ مليون فدان فى كل من الدلتا والوجه القبلى على الترتيب.

٢ ـ تمثل أراضى الدرجة الأولى نسبة بسيطة جدا؛ حيث تبلغ ٥,٣٤٪ فى الدلتا، وترتفع قليلا لتصل إلى ٧,٣١٪ فى الوجه القبلى. ويعتبر هذا اتجاها له دلالته فى تدهور إنتاجية الأراضى المصرية؛ مما يستدعى ضرورة صيانتها ورفع قدرتها؛ وذلك عن طريق توصيف المشاكل ووضع الحلول المناسبة.

٣ ـ تتركز أراضى الدرجة الأولى فى محافظتى القليوبية والمنوفية (جنوبى الدلتا)، فى حين تنعدم فى المحافظات الشمالية حيث مستوى الماء الأرضى المرتفع، والملوحة العالية، وثقل القوام الذى ينعكس على قدرة الأراضى الإنتاجية.

٤ ـ طبقا لبيانات جدول (١) يقع حوالى ٣٠٪ فقط من أراضى الدلتا ضمن أراضى الدرجة الثانية، أما باقى المساحة فيندرج ضمن الدرجة الثالثة والرابعة؛ أى إن حوالى ٦٠٪ من مساحة الدلتا ينخفض بها الإنتاج لسيادة العوامل المحددة للإنتاج.

٥ ـ يختلف الوضع كليا فى حالة الوجه القبلى بمقارنته بأراضى الدلتا؛ حيث

تزداد نسبيا مساحات أراضى الدرجة الأولى، كما تمثل أراضى الدرجة الثانية نصف المساحة تقريبا؛ وعلى هذا يختلف العائد طبقا لتصنيف التربة.

٦ ـ تنخفض النسبة المئوية لأراضى الدرجة الأولى والثانية فى محافظة الفيوم إذا ماقورنت ببقية محافظات الوجه القبلى، فى حين تقع أراضى محافظة أسيوط بالكامل تقريبا ضمن أراضى الدرجة الأولى والثانية، وتصل نسبتها إلى حوالى ٩٣٪.

ويرى الدكتور الطوبجى (١٩٧٦) أن التدهور الحادث فى القدرة الانتاجية للأراضى قد حددت كثيرا من معدلات النمو للزراعة المصرية فى العقد الأخير؛ حيث أدى إدخال الأصناف العالية الإنتاج لمعظم المحاصيل ـ بالإضافة إلى زيادة المقررات السمادية، ومكافحة الآفات الزراعية، وتطبيق الأساليب العلمية لمواجهة المشاكل، والاهتمام بالتطوير العلمى للإرشاد الزراعى والائتمان والتعاون الزراعى ـ إلى زيادة معدل الإنتاج الزراعى، ولكن بدرجة أقل من المتوقع؛ نظرا للتدهور المستمر فى القدرة الإنتاجية للأراضى.

وقد أسهمت هذه النتائج المثيرة لدراسات الحصر التصنيفى فى وضع الخطط المستقبلية لإصلاح وصيانة الموارد الأرضية؛ وذلك من خلال تنفيذ مشروعات الصرف المغطى والمكشوف، وكذلك الأسس الخاصة بمشروعات تحسين الأراضى. وقد وضعت هذه الأسس من أجل رفع القدرة الإنتاجية لأراضى كل من الدرجة الثالثة والرابعة التى تبلغ مساحتها حوالى ٣ ملايين فدان خلال ١٥ عاما؛ وذلك بإصلاح حوالى ٢٠٠ ألف فدان سنويا.

ويقوم برنامج تحسين الأراضى على أساس زيادة كفاءة الصرف وتكسير الطبقة الصماء التى تعوق نمو الجذور باستخدام محراث تحت التربة، كما يتضمن البرنامج معالجة القلوية باستخدام الجبس الزراعى مع التخلص من الأملاح.

جدول (١) : مساحة الأراضى الزراعية بدرجاتها المختلفة طبقا للحصر التصنيفى للأراضى.

	محافظات الوجه البحرى				جملة المنزرع	بور صالح للزراع	بور مغمور	بور غير صالح للزراعة	منافع	الجملة
	الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة						
الأسكندرية	—	٦١٨٠	١١٤٤٣	٥٤٣٩	٢٣٠٦٢	٨٩	٢١٨٣٦	١٠٢٠	٢٠٩١٢	٦٦٩١٩
٪	—	٩,٢٩	١٧,١٠	٨,١٣	٣٤,٤٦	٠,١٣	٣٢,٦٤	١,٥٢	٣١,٢٥	
البحيرة	٦٤٧٦	١٣٢٣٧٢	٤٥١٨٣٣	١١٢٨٧٨	٧٠٣٥٥٩	٢٤٥٥٦٣	٧٢٤٩٠	٣١٦٥	٥٦٢٠٢	١٠٨٩٧٩
٪	٠,٦	١٢,٣	٤١,٨	١٠,٤	٦٥,١	٢٢,٧	٦,٧	٠,٣	٥,٢	
كفر الشيخ	—	٦٣٠٠٧	٢٩٦٤٦٩	٦٩٧١٩	٤٢٩١٩٥	١٣٢٠٩٢	٢١٧٧٢٠	١٠٢٢	٣٧٦٤٢	٨١٧٦٧١
٪	—	٧,٧٣	٣٦,٢٤	٨,٥٢	٥٢,٤٩	١٦,١٥	٢٦,٦٢	٠,١٢	٤,٦	
الدقهلية	٦٣٧٠	٢٣٨١٥٠	٣٣٩٥١٢	٦٢٠٧٥	٦٤٦١٠٧	١٠٦٥٥٠	٩٧٢٠	٢١٢	٦١٧٦٢	٨٢٤٣٥٤
٪	٠,٧٧	٢٨,٨٩	٤١,١٨	٧,٥٣	٧٨,٣٧	١٢,٩٣	١,١٨	٠,٠٣	٧,٤٩	
دمياط	—	٢٣٣٨٢	٥٦٠٩١	٢٣١٥٦	١٠٢٦٢٩	٢٨٣٣٩	٣٩٠٥	٤٢	٩٧٢٠	١٤٤٦٣٥
٪	—	١٦,١٨	٣٨,٧٩	١٦,٠١	٧٠,٩٨	١٩,٥٧	٢,٦٩	٠,٠٢	٦,٧٣	
الشرقية	١٣٣٨٢	٢٦٦٣٩٣	٢٨٢٧٧٠	٧٩١٣٨	٦٤١٦٨٣	١٧١٣٩١	٩١٣٩٠	٤٨٧	٦٨٢٨٩	٩٧٣٢٤٠
٪	١,٢٧	٢٧,٣٧	٢٩,٠٦	٨,١٣	٦٥,٩٣	١٧,٦١	٩,٢٩	٠,٠٦	٧,٠١	
الإسماعلية	—	٢٠٤٤	٤٧٥١٦	٣٨٧٥٢	٨٨٣١٢	١٢٥٥٤٨	٧٤٨١٧	١٤٥٩٠	٤٦٦٧٦	٣٤٩٩٤٣
٪	—	٠,٥	١٣,٥	١١,٠٧	٢٥,٠٧	٣٥,٨٧	٢١,٥٧	٤,١٦	١٣,٣٣	
السويس	—	—	٥٢٦٥	٢٦٧٨	٧٩٤٣	٤٢٠٠٠	٣٣٠	—	٨٠٧٢	٥٨٣٤٥
٪	—	—	٩,٠٢	٤,٥٩	١٣,٦١	٧١,٩٩	٠,٥٧	—	١٣,٨٣	
بورسعيد	—	—	—	٥٠٠	٥٠٠	١٠٠٠٠	٦٤٥٠٠	—	١٠٠٠	٧٦٠٠٠٠
٪	—	—	—	٠,٦٦	٠,٦٦	١٣,١٦	٨٤,٨٧	—	١,٣١	
الغربية	٢٦٣٨٣	٢٣٧٢٩٣	١٣٤٦٧١	١٧٦٧٠	٤١٦٠١٧	٧٢٠	٣٩٦	—	٤٤٨٠١	٤٦١٩٣٦
٪	٥,٧١	٥١,٣٧	٢٩,١٥	٣,٨٢	٩٠,٠٥	٠,١٦	٠,٠٩	—	٩,٧	
المنوفية	٧٥٣٧٥	١٩٠٠٥٠	٤٩٦٦٠	١٠٥١٠	٣٢٥٥٩٥	٢٢٨٧	٤٦٧	—	٣٧٢١٢	٣٦٥٥٦١
٪	٢٠,٦١	٥١,٩٩	١٣,٥٨	٢,٨٨	٨٩,٠٦	٠,٦٣	٠,١٣	—	١٠,١٨	
القليوبية	٦٤١٧١	٨٥٥١١	٣٨٣٦٥	٥٥٣٤	١٩٣٥٨١	٤٣٥٥	١٧٧	٥٦٦	٢٥٦٨٣	٢٢٤٣٦٢
٪	٢٨,٦	٣٨,١١	١٧,١٠	٢,٤٧	٨٦,٢٨	١,٩٤	٠,٠٨	٠,٢٥	١١,٤٥	
ضواحى القاهرة	—	٧٩٥٢	٥٠٢٧	٩٧٦	١٣٩٥٥	٤٣٤٣	٢١	٢٣٨٧٣	—	٤٢١٩٢
٪	—	١٨,٨٥	١١,٩١	٢,٣١	٣٣,٠٧	١٠,٢٩	٠,٠٥	٢٦,٥٩		
إجمالى	١٩٣١٥٧	١٢٥٢٣٣٤	١٧١٧٦٢٢	٤٢٩٠٢٥	٣٥٩٢١٣٨	٨٧٣٢٧٧	٥٥٧٧٦٩	٤٤٩٨٢	٤١٧٩٧١	٥٤٨٦١٣٧
٪	٣,٥	٢٢,٨	٣١,٤	٧,٩	٦٥,٥	١٥,٩	١٠,٢	٠,٨	٧,٠٦	

obeikandl.com

تابـــــع - جدول (١):

	محافظات الوجه القبلى				الجملة	بور صالح للزراعة	بور مغمور	بور غير صالح للزراعة	منافع	الجملة
	الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة						
الفيوم	١٠٢٦٥	٦١٧٨٥	١٨٧٨٦٧	٥٤٧٠٩	٣١٤٦٧٦	٤٩٣٨٣	٣٣٣٠	٢٥٠٠٩	٢١٧٤٠	٤١٤١٣٨
٪	٢,٤٩	١٤,٩٢	٤٥,٣٦	١٣,٢١	٧٥,٩٨	١١,٩٢	٠,٨١	٦,٠٥	٥,٢٥	
الجيزة	١٢٨٦٩	١١٣٠٠٧	٤٢٨١٢	٩٠٧٩	١٧٧٧٦٧	١٥٤٧٤	٢٦٢	٢٠٣	٣٦٩١٧	٢٣٠٦٢٣
٪	٥,٥٨	٤٩,٠	١٨٥٦	٣,٩٤	٧٧,٠٨	٦,٧١	٠,١١	٠,٠٩	١٦,٠١	
بنى سويف	٢٦٠٧٣	١٣٠١٨٤	٩٠٧٨٨	١٨٠٣٥	٢٦٥٠٨٠	١١٠٨١	١١٠٠	٢٨٦٣	٢٩٦١٨	٣٠٩٨١٢
٪	٨,٤٢	٤٢,٠٣	٢٩,٣٠	٥,٨٢	٨٥,٥٦	٣,٥٨	٠,٣٦	٠,٩٢	٩,٥٩	
المنيا	٤٩٥٩١	٢٧١١٤٣	٩٢٨٤٩	٢٧٤٧٦	٤٤١٠٥٩	٣٥٤٤٦	١٤٠٢	١٧٧٥	٤٩٩٧٦	٥٢٩٦٥٧
٪	٨,٤	٥١,٢٠	١٧,٥٠	٥,٢٠	٨٣,٣	٦,٧٠	٠,٣٠	٠,٣٠	٩,٤٠	
أسيوط	٣١٣٥٩	٢٥٤٧٤٤	١٥٠١٦	٦٤٨٥	٣٠٧٦٠٤	١٧٠٢٥	٤٩٥	٧٩٥	٣٢٩٨٩	٣٠٨٩٠٨
٪	٨,٧٤	٧٠,٩٨	٤,١٨	١,٨١	٨٥,٧١	٤,٧٤	٠,١٤	٠,٢٢	٩,١٩	
سوهاج	٢٤٣٦٩	٢٢٦٠٩٥	٤١٧٥٠	١٢٨٥٠	٣٠٥٠٦٤	١١٠٨١	٣٤١	—	٣٦٨٢٥	٣٥٣٣٠٨
٪	٦,٩	٦٤,٠	١١,٨٠	٣,٦	٨٦,٣	٥,٦٠	٠,٢٠	—	١٠,٤٠	
قنا	١٠٤٤٨	٢٦٤٦٦٥	٥٥٠٦٥	١٧٥١٢	٣٤٧٦٩٠	٢٩٣٨٣	٣٥٢	٩٠٢	٤٦١٧٧	٤٢٤٥٠٤
٪	٢,٤٦	٦٢,٣٤	١٢,٩٧	٤,١٣	٨١,٩٠	٦,٩٢	٠,٠٨	٠,٢٢	١٠,٨٨	
أسوان	٢٤٣٦	٥٩٤٠٠	٤٦٨٧٧	٢٣٥٠٩	١٣٢٢٢٢	١٨٢١٨	٤٣٦	٤٥٤٨	٢٢٢٣٥	١٧٧٦٥٩
٪	١,٣٧	٣٣,٤٣	٢٦,٣٨	١٣,٢٣	٧٤,٤١	١٠,٢٥	٠,٢٥	٢,٥٥	١٢٥٣	
إجمالى الوجه القبلى	١٦٧٤٦٠	١٣٨١٠٤٣	٥٧٣٠٢٤	١٦٩٦٥٥	٢٢٩١١٦٢	١٨٧٠٩١	٧٧١٨	٣٦٠٩٤	٢٧٦٥٤٤	٢٧٩٨٦٠٩
٪	٥,٩٨	٤٩,٣٥	٢٠,٤٨	٦,٠٦	٨١,٣٧	٦,٦٩	٠,٢٨	١,٢٩	٦,٨٩	
إجمالى الجمهورية	٣٥٩٦١٧	٢٦٣٣٣٥٧	٢٢٩٠٦٤٦	٥٩٨٦٨٠	٥٨٨٣٣٠٠	١٠٦٠٣٦٨	٥٦٥٤٨٧	٨١٠٧٦	٦٩٤٥١٥	٨٢٨٤٧٤٦
٪	٤,٣٤	٣١,٧٩	٢٧,٦٥	٧,٢٣	٧١,٠١	١٢,٧٩	٦,٨٢	٠,٩٩	٨,٣٩	

obeikan.com

جدول (٢) : النسبة المئوية للمساحات المختلفة القدرة الإنتاجية بالنسبة للمساحة الكلية المنزرعة.

المحافظة	الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	المساحة الكلية
الاسكندرية	—	٢٦,٧٩	٤٩,٦٢	٢٣,٥٨	٢٣٠٦٢
البحيرة	٠,٩٢	١٨,٨١	٦٤,٢٢	١٦,٠٤	٧٠٣٥٥٩
كفر الشيخ	—	١٤,٦٨	٦٩,٠٧	١٦,٢٤	٤٢٩١٩٥
الدقهلية	٠,٩٨	٣٦,٨٥	٥٢,٥٥	٩,٦١	٦٤٦١٠٧
دمياط	—	٢٢,٧٨	٥٤,٦٥	٢٢,٥٦	١٠٢٦٢٩
الشرقية	٢,٠٩	٤١,٥١	٤٤,٠٧	١٢,٣٣	٦٤١٦٨٣
الإسماعلية	—	٢,٣١	٥٣,٨٠	٤٣,٨٨	٨٨٣١٢
السويس	—	—	٦٦,٢٨	٣٣,٧٢	٧٩٤٣
بورسعيد	—	—	—	١٠٠,٠٠	٥٠٠
الغربية	٦,٣٤	٥٧,٠٤	٣٢,٣٧	٤,٢٤	٤١٦٠١٧
المنوفية	٢٣,١٥	٥٨,٣٧	١٥,٢٥	٠,٣٠	٣٢٥٥٩٥
القليوبية	٣٣,١٥	٤٤,١٧	١٩,٨٢	٢,٨٦	١٩٣٥٨١
القاهرة	—	٥٦,٩٨	٣٦,٠٢	٦,٩٩	١٣٩٥٥
الجملة	٥,٣٤	٣٤,٨٦	٤٧,٨٢	١١,٩٤	٣,٥٩٢١٣٨
الفيوم	٣,٢٦	١٩,٦٣	٥٩,٧٠	١٧,٣٨	٣١٤٦٧٦
الجيزة	٠,٧٢	٦٣,٥٧	٢٤,٠٨	٥,١١	١٧٧٧٦٧
بنى سويف	٩,٨٤	٤٩,١١	٣٤,٢٤	٦,٨٠	٢٦٥٠٨٠
المنيا	١١,٢٤	٦١,٤٧	٢١,٠٥	٦,٢٢	٤٤١٠٥٩
أسيوط	١٠,١٩	٨٢,٨١	٤,٨٨	٢,١٠	٣٠٧٦٠٤
سوهاج	٧,٩٧	٧٣٩٨	١٣,٦٦	٤,٢٠	٣٠٥٦٠٤
قنا	٣,٠	٧٦,١٢	١٥,٨٤	٥,٠٤	٣٤٧٦٩٠
أسوان	١,٨٤	٤٤,٩٢	٣٥,٤٥	١٧,٧٨	١٣٢٢٢٢
الجملة	٧,٣١	٦٠,٢٧	٢٥,٠١	٠,١٣	٢,٢٩١١٦٢
الإجمالى العام	٦,١١	٤٤,٧٦	٣٨,٩٣	١٠,١٧	٥,٨٨٣,٣٠٠

الفصل الثانى

الأراضى الزراعية
(خواصها الطبيعية وانتاجيتها)

obeikandl.com

obeikandl.com

أولا ـ الخواص الطبيعية للأراضى المصرية:

مقدمـــة:

تُكَوَّن الخواص المختلفة للأراضى فيما بينها منظومة تسهم كل خاصية منها فى تحديد إنتاجية الأراضى التى تعتبر فى النهاية محصلة لتأثير هذه الخواص مجتمعة.

يختص هذا الفصل بدراسة بعض الخواص الطبيعية للأراضى المصرية، ومدى ارتباطها بالمشاكل السائدة بها، وطرق خدمتها، وأسلوب إدارتها. كما يشمل أيضا محاولة وضع بعض المعايير لبعض الخواص الطبيعية للأراضى ذات القدرات الإنتاجية المختلفة.

١ ـ القوام:

يعبر عن نسب توزيع الحبيبات المعدنية بالأراضى أو درجة نعومتها. وتختلف الأراضى المصرية فيما بينها فى قوامها تبعا لظروف وعوامل تكوينها بكل من الوادى والدلتا والأراضى الجديدة. ويؤثر قوام الأراضى فى حركة الماء بها هبوطا وصعوداً، علاوة على قوة حفظها للمياه وتماسكها وتهويتها ودرجة حرارتها وغيرها من الخواص؛ ومن ثم.. يؤثر فى خصوبتها وقدرتها الإنتاجية.

ويسهم تحديد قوام التربة فى التعرف إلى خواصها من خلال الصفات المرتبطة

obeikandl.com

بالمجموعات المكونة له، فعلى سبيل المثال نجد أن مجموعة الطين ذات سطح داخلى كبير، وتتميز بارتفاع قدرتها على الاحتفاظ بالماء، كما يمكنها الاتحاد مع الحبيبات الخشنة مكونة حبيبات مركبة؛ وهى إحدى وسائل تحسين الأراضى الرملية.

وتتميز مجموعة الطين بخاصية التمدد بالابتلال والانكماش بالجفاف؛ وهذه الخاصية لها فاعليتها من حيث تجديد الهواء الأرضى وتبخر وطرد الماء الأرضى الزائد، كما أن لها مضارها من حيث تقطيع جذور النباتات، علاوة على ارتفاع الاحتياجات المائية لريها، خاصة فى حالة الأراضى الطينية التى تترك شراقى لفترة طويلة.

ويسهم تحديد القوام فى اختيار نظام الرى المناسب ومواعيد الرى؛ حيث يعتبر أسلوب الرى بالغمر مناسبا للأراضى ذات القوام الطينى. أما الأراضى الرملية فيناسبها أسلوب الرى بالرش والتنقيط؛ حيث يتميز هذا الأسلوب بارتفاع كفاءة استخدام المياه، وحسن توزيعها، وتوفير رطوبة مناسبة لنمو المحاصيل، وتلافى الإجهاد الرطوبى أثناء موسم النمو.

كما تختلف شبكات الصرف الحقلى فى تصميماتها تبعا لاختلاف قوام الأراضى من حيث أبعاد وأعماق المصارف بما يكفل حسن أدائها وكفاءتها.

وبرغم وجود علاقة وثيقة بين قوام الأراضى ونمو المحاصيل المختلفة إلا أن القوام ليس دليلا على خصوبة الأرض أو إنتاجيتها؛ حيث تتدخل عوامل أخرى فى تحديدها.

٢ ـ البناء الأرضى:

مقدمة:

البناء الأرضى يعبر عن نظام ترتيب وتجاور حبيبات الأرض من الطين والسلت والرمل وما يوجد من مسافات محصورة بين تلك الحبيبات. كما يعبر أيضا عن الشكل والحجم الناتج من تجمع الحبيبات المفردة لتكوين تجمعات تعتمد فى تكوينها على عديد من العوامل المساعدة؛ مثل مقدار الغرويات المعدنية والعضوية وما عليها

من شحنات موجبة وسالبة، وكذلك مقدار الرطوبة بالأراضى والمواد اللاحمة؛ مثل كربونات الكالسيوم، وأكاسيد الحديد والألومنيوم.

وينعكس أسلوب العناية بعمليات خدمة الأراضى على حالة البناء الأرضى. وقد أدت زيادة عدد السكان وما تلاها من برامج التكثيف الزراعى وإهمال عمليات الخدمة والإسراف فى مياه الرى وعدم كفاءة الصرف الزراعى إلى تدهور البناء.

والبناء الأرضى محصلة لعديد من الصفات الطبيعية والحيوية. ويزداد معامل البناء الأرضى بانخفاض الأملاح الذائبة والصوديوم المتبادل. وقد أشارت دراسات ميلاد وآخرين (١٩٧٤) إلى أن قيم معامل البناء له معنويتها فى التعبير عن مستوى الصوديوم المتبادل وقلوية الأراضى.

ويتأثر البناء الأرضى تحت الظروف المصرية بعديد من العوامل؛ ففى شمالى الدلتا ـ حيث تسود الأراضى الملحية غالبية المناطق ـ نجد أن الأراضى ذات بناء كاذب؛ نتيجة تجمع حبيبات التربة بفعل التركيزات العالية للأملاح. وسرعان ماينهار هذا البناء بإضافة الماء إليها، وفى الوقت نفسه.. نجد أن الأراضى القلوية ـ التى تتخلل المساحات المتأثرة بالأملاح ـ تكون ذات حبيبات متفرقة غير واضحة البناء، سواء فى الطبقات السطحية، أم فى الطبقات تحت السطحية.

أما فى حالة مناطق وسط الدلتا وشرقها وغربها .. فإن البناء الأرضى يختلف من مكان لآخر تبعا لعمليات الخدمة والعناية بالصرف الزراعى وإضافة الأسمدة العضوية، وعلى هذا الأساس نجد وضوح البناء بطول القطاع الأرضى. ويعبر شكل وحجم القلاقيل الناتجة بعد إجراء عملية الحرث عن أشكال البناء الأرضى السائدة.

ونظرا للتغييرات الجذرية فى نظام الزراعة بأراضى الوادى ـ بالتحول من الرى الحوضى إلى الرى المستديم ـ فقد تبعتها تغيرات فى الخواص الطبيعية للأراضى وسيادة البناء العمودى والمنشورى نتيجة عمليات الترطيب والتجفيف المصاحبة للتحول فى أسلوب الرى والزراعة. أما فى حالة الأراضى الجديدة .. فتكون الأراضى

الرملية ـ بصفة عامة ـ ذات حبيبات مفردة دون ترتيب أو شكل خاص، فى حين تتكون قشرة على سطح الأراضى الجيرية ذات بناء طبقى.

ويرتبط البناء الأرضى بعمليات خدمة الأراضى وإعداد المهد المناسب للبذور؛ حيث يوفر البناء المتضاغط بالأراضى الرملية فرصة حفظ الرطوبة بها. ومن جهة أخرى يؤدى تفكيك الأرض الطينية الثقيلة إلى تسهيل حركة مرور الماء وانتشار الجذور.

البناء الأرضي الجيد ووسائل تحسين البناء:

يعتبر عامل البناء الأرضى من العوامل الهامة المؤثرة فى حركة المياه بالأرض؛ إذ يوفر البناء الجيد فرصة تحرك المياه بالأرض، وتأدية دوره بكفاءة، خاصة عند رى الأرض وتوزيع الماء بانتظام، علاوة على سهولة التخلص من الأملاح الزائدة بقطاع التربة؛ بهدف صيانتها والمحافظة على إنتاجيتها. من جهة أخرى تتحدد قيم الماء الميسر بالأراضى على أساس نوع المسافات البينية التى يوفرها البناء الأرضى الجيد؛ من حيث المسام المتسعة والضيقة التى تحتفظ بالماء فى حالة ميسرة.

وتشترط وسائل تحسين البناء الأرضى ضرورة إجراء عمليات الخدمة عند نسبة رطوبة معينة تصل إلى ٢٥ ـ ٤٠ ٪ فى حالة الأراضى الطينية الثقيلة، و١٢ ـ ١٥ ٪ فى حالة الأراضى الرملية. وتسهم إضافة الجبس الزراعى، والمادة العضوية وإضافات الطين أو الطمى فى العمل على تجميع الحبيبات المفردة وتكوين تجمعات أكبر نسبيا؛ ففى حالة الجبس الزراعى نجد أن محتواه من عنصر الكالسيوم الذائب يعمل على تجاور حبيبات التربة المفردة عند إحلاله محل عنصر الصوديوم فى حالة الأراضى القلوية والقلوية الملحية.

وللمادة العضوية دورها الأساسى فى تحسين البناء الأرضى وتكوين تجمعات ثابتة. كما تسهم الكائنات الدقيقة بإفرازها للمواد الناتجة من تحلل المواد العضوية فى تكوين وثبات هذه التجمعات؛ وهذا يوضح أهمية تزويد الأراضى بالمواد العضوية؛ وذلك

لضمان استمرار وصيانة البناء الأرضى الجيد، الذى يتمثل فى توفير الظروف المناسبة لتحلل المواد العضوية؛ مثل المحتوى الرطوبى، ودرجة الحرارة، والتهوية.

كما يلعب الطين دورا كبيرا فى تكوين تجمعات التربة عند إضافته إلى الأراضى الرملية؛ حيث يعمل كمادة لاحمة لحبيبات الرمل؛ مما يحسن من بنائها، وينعكس ذلك على زيادة قدرتها على الاحتفاظ بالماء؛ ومن ثم تحسين إنتاجيتها.

٣ ـ الماء الأرضى:

الماء هو المكون السائل للأرض، ويعبر عن الرطوبة الأرضية بحالات جفاف وابتلال التربة، كما يعبر عنها أيضا بمدى ماتوفره الأرض من الماء الميسر لنمو النبات، وهو أحد العوامل الهامة فى تحديد القدرة الإنتاجية للأراضى. وتمثل ثوابت الرطوبة الأرضية الحدود التى توضح علاقة الماء بكل من الأرض والنبات. وقد قسمت مياه التربة إلى ماء أيجروسكوبى وشعرى وحر، يمكن على أساسها تحديد قيم السعة الحقلية، والمكافئ الرطوبى، ونقطة الذبول، والماء الميسر بالأراضى المختلفة.

الأراضي المصرية والعلاقات المائية:

أولا ـ الأراضى الطينية الرسوبية:

تشغل الأراضى الطينية معظم المساحة المنزرعة فى مصر. وتؤدى النسبة العالية من الطين إلى زيادة قدرة هذه الأراضى على احتفاظها بالماء لمواجهة الاحتياجات المائية للزراعات القائمة. وفى الوقت نفسه يؤدى سوء استخدام مياه الرى إلى ارتفاع مستوى الماء الأرضى، وامتلاء المسافات البينية بالماء، وطرد الهواء؛ مما يعرض جذور النباتات للاختناق، وحدوث اختلال فسيولوجى لوظائفها الحيوية.

وتساعد عمليات الخدمة وتحسين الأراضى على رفع كفاءة استخدام المياه بالأراضى الطينية؛ وذلك بتوفير الصرف الحقلى الفعال، وتسوية التربة، وإضافة محسنات التربة الكيماوية والعضوية. وتتوقف حالة الخواص الطبيعية لهذه الأراضى

على مدى فعالية أساليب ترشيد المياه، بالإضافة إلى نوعية المياه المستخدمة فى الرى ومحتواها الملحى؛ إذ يؤدى سوء الخدمة والصرف الحقلى ـ وكذلك الإسراف فى استخدام المياه ـ إلى تكون الطبقات الصماء، وتدهور خواصها، ومن ثم قدرتها الإنتاجية.

ومن ناحية أخرى يؤدى ثبات مستوى الماء الأرضى لمدة طويلة بالأراضى الطينية الثقيلة إلى تكون طبقات صماء من الجبس أو تكون القلوية فى المنطقة الواقعة فوق سطح هذا المستوى مباشرة؛ وذلك نتيجة تفاعلات كيماوية وحيوية تحت الظروف اللاهوائية، بالإضافة إلى تبادل أيونات الكالسيوم والمغنسيوم والصوديوم والبوتاسيوم؛ بحيث تنتج فى بعض الأحيان رواسب من الجبس، وفى البعض الآخر تتكون كربونات الصوديوم التى تسبب تفرقة الطين؛ مكونة طبقة غير منفذة، ومسببة خفض إنتاجية هذه الأراضى.

ثانيا ـ الأراضى الرملية:

تسود الأراضى الرملية معظم مساحات الأراضى الجديدة، وتتميز بعدم قدرتها على الاحتفاظ بالماء بسبب صغر السطح النوعى لحبيباتها، وطبيعة سطوحها، وكبر حجم المسافات البينية غير القادرة على حمل الماء بالخاصية الشعرية.

وتظل هذه الأراضى عطشى باستمرار بسبب انخفاض سعتها الحقلية وكمية الماء الميسر. ويتضاعف تأثير الإجهاد الرطوبى على المحاصيل فى طور الإنبات؛ نظرا لجفاف السطح بسرعة كبيرة؛ وعلى هذا الأساس تتبع طرق الرى الحديثة فى توفير الاحتياجات المائية للمحاصيل المنزرعة بهذه الأراضى، مع ضرورة إضافة العناصر الغذائية إلى ماء الرى، والاعتناء بتوفير معدلات عالية من الأسمدة العضوية وقلب بقايا المحاصيل بها، لرفع محتواها العضوى؛ ومن ثم زيادة سعتها الحقلية.

ثالثا ـ الأراضى الرملية الجيرية:

تتواجد هذه الأراضى فى مناطق التوسع الأفقى بالساحل الشمالى والمناطق المتاخمة للوادى والدلتا. تتراوح نسبة كربونات الكالسيوم بها بين ٢٥ ـ ٦٠٪ فى

معظم الأحيان. ويظهر تأثير كربونات الكالسيوم فى خواص الأراضى الطبيعية عند تواجدها بنسب تتراوح بين ١٠ ـ ١٥ ٪؛ حيث تتكون طبقة صلبة على السطح عند الجفاف.

ويمكن تحسين الخواص المائية للأراضى الرملية الجيرية عن طريق عدم السماح بجفافها الزائد؛ وذلك بتقريب فترات الرى قدر الإمكان، مع الاهتمام بإضافة المادة العضوية وزراعة المحاصيل، ثم قلبها بالتربة.

٤ ـ التماسك:

يعبر «التماسك» عن درجة التصاق حبيبات التربة ومقاومة تجمعاتها أو حبيباتها للتفكك والانفصال عن بعضها أو لتغيير شكلها. ويعتبر التماسك إحدى الصفات الهامة بالأراضى؛ حيث يعتبر عاملا هاما فى ثبات البناء الأرضى.

وينشأ التماسك نتيجة جذب الحبيبات بعضها لبعض، علاوة على وجود بعض المواد اللاحمة كالغرويات العضوية والمعدنية والجبس وأكاسيد الحديد والألومنيوم. وتختلف الأراضى فيما بينها فى تماسكها باختلاف موقعها وخدمتها وأسلوب زراعتها كما يلى:

أولا ـ التماسك بالأراضى الطينية الرسوبية:

تختلف الأراضى الرسوبية فى محتواها من حبيبات الطين والسلت والرمل من مكان لآخر. ولما كان التماسك يرتبط ـ إلى حد كبير ـ بمساحة السطوح القابلة للالتصاق بعضها ببعض.. فإنه يزداد بزيادة المحتوى الطينى للأراضى؛ وعلى هذا يلاحظ أن الأرض الطينية الثقيلة تحتاج إلى مجهود عالٍ فى جر المحراث؛ نتيجة زيادة تماسكها؛ وبذلك سميت بالأراضى الثقيلة.

وتنعكس هذه الخاصية على النواحى الزراعية والاقتصادية فى إدارة الأراضى؛ حيث تؤدى زيادة التماسك إلى مقاومة عالية لانتشار الجذور؛ مسببة نموا ضعيفا

للنباتات النامية بها؛ ومن ثم انخفاض إنتاجيتها، علاوة على زيادة تكاليف عمليات الخدمة بها.

وتعتبر صعوبة خدمة الأراضى الطينية مظهرا لقوة التماسك بها. وتؤثر الرطوبة الأرضية بوضوح على ظاهرة التماسك؛ حيث يؤدى نقصها إلى زيادة قوة التماسك؛ ولذلك يجب إجراء عمليات الخدمة بالأراضى الطينية عند محتوى رطوبى معين يتيح سهولة إجراء عمليات الخدمة وتقليل تكلفتها. وتعتبر الأرض المفككة المستحرثة أنسب حالات الرطوبة لخدمة الأراضى الطينية. ومن ناحية أخرى فإن زيادة الرطوبة تؤدى إلى التصاق التربة بآلات الخدمة وتعجنها.

ثانيا ـ التماسك بالأراضى الرملية:

إن قوة التماسك بالأراضى الرملية له أهميته الخاصة من حيث إيجاد البيئة الصالحة للجذور وتشبثها بالأرض وزيادة مقاومتها للانجراف الهوائى. وتختلف هذه المقاومة عند مقارنتها بالأراضى الطينية.

ويؤدى انخفاض التماسك بالأراضى الرملية إلى سهولة تعرضها للانجراف الهوائى. ويعتبر تحرك الرمال فى الصحارى مظهرا لهذه الخاصية لانعدام تماسك حبيبات التربة الرملية.

وجدير بالذكر أن وجود المواد اللاحمة بالطبقة السطحية أو تحت السطحية ـ أحيانا ـ يؤدى إلى تماسك هذه الطبقات إلى حد كبير.

ثالثا ـ التماسك بالأراضى الرملية الجيرية:

يلاحظ وجود تماسك شديد بين حبيبات التربة، وخاصة فى الطبقة السطحية عند جفاف هذه الأراضى تماما. وهذه الظاهرة تسبب انخفاض نسبة الإنبات؛ مما ينعكس على إنتاجية المحاصيل بها.

وترجع ظاهرة التماسك فى هذه الأراضى إلى قوة Cohesion الشديدة بين

حبيباتها، وزيادة نقط التلامس سواء بين حبيبات التربة نفسها أو بين حبيبات الجير، علاوة على خاصية Adhesion بين حبيبات التربة ـ خاصة السلت ـ وبين حبيبات الجير التى فى حجم الطين والسلت. وقد تتواجد هذه الطبقات المتماسكة فى الطبقات العميقة نتيجة الغسيل غير التام تحت تأثير كميات الأمطار القليلة التى تسقط عليها.

وبصفة عامة.. فإن الإدارة السليمة للأراضى الطينية الرسوبية يمكن تحقيقها من خلال حسن إدارة مياه الرى، وإضافة الأسمدة العضوية ومحسنات التربة؛ مما يقلل من التماسك الشديد فى الأراضى الطينية، ويشجع التماسك المعتدل فى كل من الأراضى الرملية والجيرية.

٥ ـ التمدد والانكماش:

هما ظاهرتان متضادتان، لهما قدر كبير من الأهمية؛ حيث يمكن تتبعهما فى الأراضى المحتوية على نسبة من الطين؛ فيحدث الانكماش نتيجة الجفاف، فى حين يحدث التمدد فى حالة ابتلال الأراضى. وتتم هذه الظواهر نتيجة وجود الغرويات الأرضية أو المواد العضوية، علاوة على ضغط الأغشية المائية حول حبيبات التربة. وهذه العوامل تعتبر مكملة لبعضها.

أولا ـ التمدد والانكماش بالأراضى الطينية الرسوبية:

توجد علاقة وثيقة بين هذه الظواهر ونسبة الطين بالأراضى؛ حيث تزداد طرديا بزيادته؛ فعند رى الأراضى الطينية يحدث التمدد؛ مما يجعل سطح الأرض قطعة واحدة، ثم يبدأ الانكماش بدرجات متفاوتة حسب سرعة فقد الماء منها؛ ومن ثم ينكمش السطح بسرعة أكبر من انكماش الطبقات تحت السطحية.

وباختلاف الانكماش الذى يحدث فى جميع الاتجاهات يتمزق سطح التربة لوجود علاقة بين الانكماش والتماسك؛ حيث يزداد التمزق فى المناطق الضعيفة التماسك. وعموما.. تتشقق الأراضى الطينية فى الدلتا والوادى باتباع النظام المعروف

بالكتلى، وهو يميل إلى الشكل المكعبى. وفى حالة الأراضى القلوية السوداء يحدث تشقق صغير الأضلاع غير منتظم الشكل على هيئة شقف الفخار.

وتؤثر ظاهرة التمدد والانكماش فى استهلاك مياه الرى؛ حيث يؤدى الجفاف المصاحب للشراقى إلى حدوث انكماش كبير وتكوين شقوق واسعة تسبب ضياع كميات كبيرة من المياه.

ثانيا ـ التمدد والانكماش بالأراضى الرملية:

إن الأراضى الرملية فقيرة فى محتواها من الطين والمواد العضوية؛ ومن ثم لا تَظْهَر ظاهرتا التمدد بالابتلال والانكماش بالجفاف. وتسبب الرطوبة القليلة تماسك حبيبات التربة الرملية، وتعمل على نقص حجمها وليس العكس.

وإذا زادت الرطوبة بالأراضى على حد معين (السعة الحقلية مثلا) .. فإن حبيبات التربة تنهار. وبصفة عامة تعتبر ظاهرتا التمدد والانكماش غير ذات تأثير فى حالة الأراضى الرملية.

ثالثا ـ التمدد والانكماش بالأراضى الرملية الجيرية:

يختلف محتوى الأراضى الرملية الجيرية من كربونات الكالسيوم حسب مناطق تواجدها. ويلاحظ ـ بصفة عامة ـ تمدد الطبقة السطحية عقب الرى، وانفصالها عند جفافها؛ مسببة مايسمى بالقشرة، والتى تكون صلبة عند الجفاف الشديد، وغالبا لاتظهر شقوق عميقة فى هذه الأراضى.

٦ ـ حركة الماء:

الماء هو المكون السائل للأرض، وهو فى حركة مستمرة. ويمكن تمييز ثلاثة أنواع من الحركة: الأولى على صورة بخار فى حالة انخفاض نسبة الرطوبة إلى مستوى نقطة الذبول. والثانية تسمى بالحركة غير المشبعة والثالثة تسمى الحركة المشبعة.

ويتوقف معدل حركة الماء بالأراضى على كميتها، وعوامل القوة المحركة للماء، وكذلك التوصيل الهيدروليكى. كما تأتى أهمية حركة الماء فى الأراضى على أساس علاقتها بنمو النبات من ناحية، وعمليات غسيل الأملاح الذائبة من قطاع التربة من ناحية أخرى.

أولا ـ علاقة تحرك الماء بالأراضى الطينية الرسوبية:

تتفاوت الأراضى الطينية فيما بينها فى مدى تجانس طبقاتها المتتالية من حيث القوام والبناء وحجم المسام؛ ومن ثم تتأثر حركة الماء بالأراضى. وقد لوحظ فى كثير من الأراضى الطينية بالدلتا والوادى أنواع مختلفة من التتابع الطبقى، بالإضافة إلى تواجد الطبقات الصماء الطينية غير المنفذة التى تبطئ حركة الماء إلى أسفل.

ويتحرك الماء إلى أعلى من مستوى الماء الأرضى نتيجة التبخير من السطح. وتتفاوت الأراضى فيما بينها فى طول المسافة التى يمكن أن يرتفع خلالها الماء الأرضى عندما يصبح السطح أكثر جفافا من الطبقات السفلى للتربة.

ثانيا ـ علاقة تحرك الماء بالأراضى الرملية:

تتميز الأراضى الرملية بارتفاع التوصيل الهيدروليكى، واتساع مسامها، وانخفاض نسبة المواد الناعمة؛ ولذا نجد أن حركة الماء تكون سريعة من أعلى لأسفل، فى حين يؤدى اتساع المسام غير الشعرية فى الأراضى الرملية إلى ارتفاع الماء من أسفل إلى أعلى بدرجة ليست كبيرة.

ثالثا ـ علاقة تحرك الماء بالأراضى الرملية الجيرية:

لا تختلف كثيرا حركة الماء فى الأراضى الرملية الجيرية عنها فى الأراضى الرملية إلا فى الطبقة السطحية التى تتركز بها كربونات الكالسيوم بدرجة تجعلها شديدة الصلابة عند الجفاف.

٧ ـ الهواء الأرضى:

يعتبر الهواء الأرضى الجزء الغازى فى الأراضى، ويوجد بصورة حرة فى المسافات البينية، أو فى صورة ذائبة فى ماء التربة؛ حيث يحدث تبادل مستمر بين هذه الصور وللهواء أهمية فى تنفس الجذور والكائنات الدقيقة، وكذلك التفاعلات الكيماوية التى تحدث بالتربة.

أولا ـ علاقة الهواء بالأراضى الطينية الرسوبية:

يؤثر قوام التربة الطينية ووجود المجمعات الأرضية الكبيرة والصغيرة وانخفاض كثافتها الظاهرية على المسامية الكلية بهذه الأراضى.

وتحت ظروف الزراعة المصرية وبرامج التكثيف الزراعى والدورات الزراعية المطبقة حاليا من حيث تعاقب المحاصيل فإن سوء الخدمة ومستوى العمليات الزراعية بالإضافة إلى الإسراف فى مياه الرى وعدم فاعلية شبكة الصرف الحقلى أدى إلى تشبع الأراضى بالمياه فى صورة سائلة أو على هيئة بخار ماء. وفى هذه الحالة يتأثر المحتوى الغازى للتربة كما ونوعا، وبصفة خاصة محتواه من الأكسجين، الذى يؤثر فى العمليات الحيوية بالتربة. وتحت ظروف الأراضى القلوية يعزى تدهور المحاصيل النامية بها بصفة أساسية إلى انخفاض التبادل الغازى.

ثانيا ـ علاقة الهواء بالأراضى الرملية:

تتميز هذه الأراضى بكبر حجم حبيباتها وارتفاع كثافتها الظاهرية؛ مما ينعكس أثره على حجم المسافات البينية الكبيرة؛ ومن ثم على محتواه المرتفع من الهواء، وهى إحدى خصائص هذه الأراضى التى تسهم فى إنتاجية جيدة للمحاصيل إذا ما توفرت الرطوبة الملائمة باستخدام طرق الرى الحديثة.

ثالثا ـ علاقة الهواء بالأراضى الرملية الجيرية:

تتشابه كثيرا الأراضى الرملية الجيرية مع الأراضى الرملية فى محتواها المرتفع من

الهواء الجوى، إلا أن جفاف الطبقة السطحية وتكوين القشرة الصلبة يعوقان ـ إلى حد ما ـ عملية التبادل الغازى.

وبصفة عامة يمكن الوصول إلى توازن بين المحتوى الرطوبى والغازى بإجراء عمليات تحسين الأراضى الطينية وعلاج مشاكلها. ويؤدى الحرث العميق ـ باستخدام محراث تحت التربة لعمق ٩٠ سم بغرض تكسير الطبقات الصماء والمتماسكة تحت سطح التربة ـ إلى تحسين خواص الأراضى، خاصة إذا ما اقترنت بإضافة الجبس الزراعى، سواء بتشجيع البناء الجيد، أم بالتخلص من القلوية. ويراعى تكرار الحرث العميق كل ثلاث سنوات، مع إضافة الاحتياجات الجبسية، والعناية بالرى، وعدم الإسراف فيه، والاهتمام بالصرف الحقلى وصيانته.

٨ ـ حرارة الأراضى:

تتحكم حرارة الأرض فى نمو النبات وامتصاص جذوره للعناصر الغذائية والماء، بالإضافة إلى جميع العمليات الحيوية الأخرى.

وتكتسب الأرض حرارتها من مصادر عديدة؛ أهمها الشمس؛ وكذلك الحرارة الناتجة من التفاعلات الكيماوية والنشاط الحيوى، وحرارة ابتلال التربة، وتكاثف بخار الماء، وهبوب الرياح الساخنة. وتحكم حرارة الأرض بعض الثوابت؛ مثل الحرارة النوعية، وحرارة الابتلال، والتوصيل الحرارى للأراضى. وبصفة عامة تكون حرارة الطبقة السطحية أعلى من الطبقات التى تليها بالقطاع.

أولا ـ حرارة الأراضى الطينية الرسوبية:

يؤدى توفر الماء الأرضى ذى الحرارة النوعية العالية ونقص المادة العضوية إلى خفض حرارة الأرض الطينية التى تؤثر بدورها فى تأخير إنبات البذور ومحدودية نمو وانتشار الجذور. وفى الوقت نفسه يسبب انخفاض حرارة التربة زيادة لزوجة الماء؛ مما ينعكس على عملية امتصاص المحلول الغذائى؛ فيتأثر معدل النمو الخضرى والثمرى للنبات وباقى العمليات الحيوية.

وقد وجد سليم (١٩٧٨) أن زيادة حرارة التربة تؤدى إلى زيادة التبخر ومعدل البخر ـ نتح من الأرض والنبات، كما يقل التوصيل الشعرى نتيجة نقص كل من لزوجة الماء والجذب السطحى. وتؤثر حرارة التربة بصفة عامة على الهواء الأرضى؛ ففى حالة الأرض الطينية نجد أن انخفاض حرارتها يؤدى إلى بطء عملية تبادل الغازات نظرا لإمتلاء مسافاتها البينية بالماء؛ ولذلك تعانى النباتات نقصاً فى الأكسجين بالأرض.

ويلعب الصرف الحقلى دورا هاما فى تحديد حرارة التربة؛ ففى حالة توفر الصرف الحقلى الفعال بالأراضى تعمل شبكات الصرف على التخلص من الماء الزائد؛ ومن ثم تقل كمية الماء الحر بالأرض، وتنخفض حرارتها النوعية ومعدل البخر؛ مما يؤدى فى النهاية إلى رفع درجة حرارة الأراضى وتوفير الحرارة المثلى لإنبات البذور، ونمو وانتشار الجذور خاصة فى موسم الشتاء.

أما فى حالة الأراضى التى ينعدم فيها الصرف أو فى وجود الصرف غير الفعال يرتفع مستوى الماء الأرضى حتى يصبح قريبا من سطح الأرض؛ ومن ثم ترتفع حرارتها النوعية، ويحدث إسراع فى عملية البخر؛ مما يؤدى إلى خفض حرارة الأرض إلى ما دون الحرارة المثلى لإنبات البذور ونمو وانتشار الجذور.

ثانيا ـ حرارة الأرض الرملية:

تتميز هذه الأراضى بانخفاض حرارتها النوعية، وكذلك محتواها الرطوبى بصفة دائمة؛ ولذا فهى أراضٍ دافئة، تعمل على سرعة إنبات البذور ونضج المحاصيل النامية فيها فى حالة توفر الماء اللازم والعوامل الأخرى.

وتواجه الأراضى الرملية مشاكل تأثرها بالرياح الساخنة وتأثيرها فى حرارة التربة. كما يؤدى ارتفاع حرارة التربة إلى فقد الأرض لبعض هوائها؛ مما يسبب انخفاض نسبة كل من قيم الأكسجين الغازى والذائب فى الماء الأرضى؛ ومن ثم يتأثر تنفس الجذور ونشاط الكائنات الدقيقة لفترة من الزمن.

ثالثا ـ حرارة الأراضى الرملية الجيرية:

تتشابه هذه الأراضى مع الأراضى الرملية من حيث حرارتها وتأثير الحرارة على هواء التربة وتأثرها بالظروف الجوية، إلا أن بناء الأراضى الرملية الجيرية ـ الذى يتميز

بتزاحم أكبر منه فى حالة الأراضى الرملية نتيجة توفر المواد اللاحمة ـ يساعد كثيرا على التوصيل الحرارى؛ ولذا تسخن الأراضى الرملية الجيرية وتبرد بسرعة.

٩ ـ الطبقات الصماء بالأراضى:

تتكون الطبقات الصماء بالأراضى نتيجة عوامل طبيعية أو بتدخل الإنسان، وهى توجد إما فى الطبقات السطحية، وإما فى الطبقات العميقة. وتختلف هذه الطبقات فى خواصها عن الطبقات التى فوقها أو التى تليها.

وتسبب الطبقات الصماء مشاكل عديدة فى حالة تواجدها؛ مما ينعكس على إنتاجية الأراضى.

أولا ـ الطبقات الصماء بالأراضى الطينية الرسوبية:

يؤدى توالى استخدام آلات الحرث على عمق معين ـ فى وجود خاصية الطين البلاستيكية ـ إلى حدوث انضغاط على حبيبات الطين وتماسكها مع بعضها؛ ومن ثم يتغير بناء تلك الطبقة من نظام التفكك إلى نظام التزاحم؛ حيث يقل حجمها، وترتفع كثافتها الظاهرية، وتنخفض قيم النفاذية.

وتتأثر النفاذية ـ بدرجة كبيرة ـ بثبات البناء الأرضى، خصوصا فى الآفاق العليا من القطاع الأرضى، بالإضافة إلى نوع وكمية الطين المنتفخ، وسمك الطبقة الصماء، وكذلك الأكاسيد السداسية التى تزيد من تماسك الطبقات فى نفاذية الماء بالأرض، وربما يؤثر أيضا فى الهواء؛ ينعكس على مدى انتشار الجذور والإنتاجية.

وتلعب حركة الماء بالأراضى دورا كبيرا فى تكوين الطبقات الصماء بالأراضى الطينية؛ بسبب سوء الصرف وتفرق حبيبات الطين؛ مما ينشأ عنه أفق أرضى متماسك قليل النفاذية.

وقد أشار جورج باسيلى والمصرى (١٩٦٢) أن الحرث العميق لمدة سنتين أدى إلى نقل تماسك طبقات تحت التربة إلى طبقات أعمق، بينما نتج عن الحرث السطحى طبقات ملحوظة التماسك بعمق يتراوح بين ١٥ ـ ٢٠ سم. وتتواجد

منطقة ذات قيم عالية فى كثافتها الظاهرية ومنخفضة النفاذية أسفل هذه المنطقة من القطاع، وهذه منطقة تتم إثارتها أثناء عمليات الخدمة العادية.

كما تشير هذه الدراسة إلى أن انضغاط التربة يؤثر بطريق مباشر وغير مباشر فى مدى صلاحية العناصر الغذائية وكفاءة استخدام الأسمدة.

ويشير طلحة وآخرون (١٩٧٨) إلى أن الاندماج يسبب تناقص المسام المسؤولة عن الصرف الحقلى وزيادة المسام الشعرية. هذا بالإضافة إلى أن مقاومة التربة للاختراق تزداد بزيادة ثقل القوام، وبزيادة محتوى التربة من كربونات الكالسيوم، وزيادة قيم الكثافة الظاهرية.

ثانيا ـ الطبقات الصماء بالأراضى الصحراوية:

تتكون هذه الطبقات ـ أساسا ـ نتيجة غسيل المكونات الذائبة من الطبقات السطحية وانتقالها إلى الطبقات التحتية بأبعاد تتوقف على كميات الأمطار ومدى تغلغلها بالقطاع.

الخواص الطبيعية وإنتاجية الأراضي المصرية:

تتأثر القدرة الإنتاجية للأراضى بعديد من العوامل المختلفة، تأتى فى مقدمتها الخواص الطبيعية للأراضى؛ نظرا لما تحدثه من آثار مباشرة وغير مباشرة فى نمو وإنتاجية المحاصيل بها.

وقد تناولت دراسات معهد بحوث الأراضى والمياه (نشرة حصر الأراضى/ غيث ١٩٥٨) موضوع تقسيم الأراضى إلى مجموعات تختلف فى قدرتها الإنتاجية. ونحاول فى هذا الموضوع تحديد المدى الذى تقع فيه الخواص الطبيعية المختلفة لهذه المجموعات، وذلك باستقراء نتائج الدراسات المختلفة، مع التركيز بصفة خاصة على النتائج التى أوردتها دراسة المركز القومى للبحوث (١٩٩١)، والتى تناولت موضوع تتبع التغيرات التى طرأت على خصوبة الأراضى المصرية. وفيما يلى المجموعات المختلفة للأراضى، مع التركيز ـ بصفة أساسية ـ على خواصها الطبيعية.

أولا ـ أراضى الدرجة الأولى:

تتميز هذه الأراضى بأنها ذات قطاع أرضى عميق أكبر من ١٥٠ سم، مع صلاحيتها لإنتاج جميع المحاصيل الزراعية، وخاصة المحاصيل ذات الجذور العميقة؛ مثل: القطن، وأشجار الفاكهة. وقوام هذه الأراضى متوسط يحتوى على خليط من الطين والسلت والرمل بنسب متقاربة حوالى ٣٠٪ لكل منها. كما أن هذه الأرض ذات كثافة ظاهرية صغيرة تتراوح مابين ١,١٢ ـ ١,٤٥ جم/ سم٣، وذات مسامية تتراوح بين ٤٥ ـ ٥٨٪، وتوصيلها الهيدروليكى متوسط يقع مابين ١٦ ـ ٥٠ ملليمتراً / ساعة.

وتتميز هذه الأراضى بالتجمعات الثابتة مائيا، وبقطر متوسط يتراوح بين ٠,١٥ ـ ٠,٢٥ ملليمتراً. وتعتبر درجة ثبات هذه التجمعات عالية، وتزداد درجة ثباتها فى الطبقات السطحية الغنية بالمادة العضوية والمواد اللاحمة والحبيبات الدقيقة (٨٠٪ فأكثر) إذا ماقورنت الطبقات العميقة بالقطاع الأرضى، و٧٠٪ بالطبقة المتوسطة، و٣٠٪ بالطبقات العميقة. وينعكس ذلك على قيم الكثافة الظاهرية؛ حيث تنخفض إلى ١,١٢ جم/ سم٣ بالطبقات السطحية، وترتفع إلى ١,٤٨، ١,٦٩جم/ سم٣ فى كل من الطبقات تحت السطحية والعميقة على الترتيب. ودرجة التماسك فى هذه الأراضى متوسطة.

وحالة الرى والصرف الحقلى بهذه الأراضى جيدة؛ ولذا فهى ذات تهوية ممتازة وحرارة مناسبة، تعطى أكبر إنتاج بأقل التكاليف؛ حيث يقل المجهود اللازم لإجراء عمليات الخدمة؛ وذلك باستخدام الآلة أو الماشية.

ثانيا ـ أراضى الدرجة الثانية:

تشابه أراضى الدرجة الأولى من حيث قطاعها الأرضى العميق وإنتاجها لأغلب المحاصيل الزراعية. وقوامها ثقيل؛ نظرا لاحتوائها على نسبة أكبر من الطين تصل إلى حوالى ٥٥٪، بينما تصل نسبة السلت والرمل إلى نحو ٣٠٪، ١٥٪ على الترتيب.

تقع كثافتها الظاهرية فى المدى بين ١,٢٥ ـ ١,٥٥ جم/ سم^{٣}. ومساميتها تتراوح مابين ٤٢ ـ ٥٣ ٪. وتوصيلها الهيدروليكى متوسط منخفض يتراوح بين ٥ ـ ١٦ ملليمتر/ ساعة؛ نظرا لزيادة محتوى الأراضى من الطين وانخفاض مساميتها خاصة فى الطبقة تحت السطحية والعميقة.

وتتواجد التجمعات الثابتة مائيا بقطر متوسط من ٠,٢٥ ـ ٠,٤٢ ملليمتراً. ويرجع زيادة القطر المتوسط فى هذه الحالة إلى ارتفاع نسبة الطين. ودرجة ثبات التجمعات عالية؛ حيث تصل نسبتها إلى حوالى ٧٠ ٪ فى الطبقات السطحية، بينما تنخفض إلى حوالى ٣٠ ٪ فى باقى طبقات القطاع. وهذا يتمشى مع درجة تماسك التربة التى تكون متوسطة بالطبقة السطحية، وشديدة فى الطبقات تحت السطحية. وطبقا لذلك تكون تكاليف الخدمة متوسطة، ويكون العائد مرتفعاً لمعظم المحاصيل الزراعية؛ نظرا لتوفر مياه الرى والصرف الحقلى بما يسبب جودة التهوية وتوفر حرارة الأرض المناسبة.

ثالثا ـ أراضى الدرجة الثالثة:

تعتبر أراضى هذه الدرجة نقط التحول بين كل من الأراضى المنتجة والأراضى التى لا تجود بها معظم المحاصيل؛ نظرا لوجود اختلافات معنوية فى معظم خواصها الطبيعية؛ فالقطاع الأرضى عميق أو متوسط (أقل من ٩٠ سم) نتيجة سوء الصرف الحقلى؛ مما يسبب ارتفاع مستوى الماء الأرضى الذى يتحدد على أساسه عمق القطاع.

قوام هذه الأراضى إما طينى ثقيل تتراوح نسبة الطين فيه ما بين ٥٥ ـ ٦٥ ٪، وإما طميى تزداد فيه نسبة السلت والرمل.

ففى حالة الأراضى الطينية تتراوح كثافتها الظاهرية مابين ١,١ ـ ١,٤٥ جم / سم^{٣}. ومساميتها الكلية ٤٥ ـ ٥٩ ٪. وتتشابه قيم التوصيل الهيدروليكى مع مثيلاتها بأراضى الدرجة الثانية، فى حين تقع التجمعات الثابتة مائيا فى مدى كبير من ٢٢ ـ ٧٠ ٪ حسب مستوى الملوحة وكفاءة الرى والصرف الحقلى ومستوى الخدمة. ونظرا لارتفاع مستوى الماء الأرضى فى غالبية هذه الأراضى نجد اختلاف قيم التجمعات

الثابتة فى الطبقات تحت السطحية نتيجة تأثير مستوى الماء الأرضى. وتعطى هذه الأراضى إنتاجية متوسطة بتكاليف متوسطة.

أما الأراضى الصفراء الخفيفة.. فإنها تختلف اختلافا كبيرا نظرا لقوامها الخشن؛ فتزداد نسبة السلت والرمل عن نسبة الطين. وتتراوح كثافتها الظاهرية ما بين ١,٤١ ـ ١,٧٤ جم/ سم^{٣}. وتتراوح المسامية الكلية من ٣٤ ـ ٤٧ ٪. وتوصيلها الهيدروليكى متوسط سريع يقع فى المدى من ٥٠ ـ ١٦٠ ملليمتراً / ساعة. وتتراوح التجمعات الثابتة مائيا من ٢٩ ـ ٧٥ ٪. وتنتج هذه الأراضى محصولا متوسطا بتكاليف متوسطة.

رابعا ـ أراضى الدرجة الرابعة:

أراضى ذات قطاع أرضى غير عميق (٥٠ ـ ٩٠ سم): والقوام متوسط إلى خشن، ويرتفع مستوى الملوحة بها. وقد أدى غسيل الأملاح خلال عملية النخل المبتل إلى انخفاض درجة ثبات التجمعات؛ حيث بلغت ١٧ ٪ بقطر متوسط يتراوح من ٠,٢٥، و ٨ ملليمتر للقوام المتوسط والخشن على الترتيب. ويؤدى هذا إلى تقليل المسامية الكلية إلى حوالى ٣٩ ٪، بينما ارتفعت قيم الكثافة الظاهرية إلى ١,٦١ جم / سم^{٣}. وتوصيلها الهيدروليكى متوسط سريع؛ حيث تبلغ نسبة التوصيل الهيدروليكى ٧١ ملليمتراً/ ساعة.

وقد ظهر تأثير خشونة القوام على قيم الكثافة الظاهرية واتساع المسام الكبيرة على حساب المسام الشعرية؛ ومن ثم زيادة معدل نفاذية الماء خلال القطاع الأرضى؛ مما يؤدى إلى كفاءة عالية فى غسيل الأملاح القابلة للذوبان.

خامسا ـ أراضى الدرجة الخامسة:

تشمل الأراضى البور أو تلك التى تحت الاستصلاح، ولاتناسب إنتاج المحاصيل الزراعية إلا بعد تحسين خواصها الكيماوية والطبيعية.

العوامل المؤثرة في القدرة الإنتاجية للأراضي:

لاشك فى أن لأسلوب إدارة الأراضى وإنتاج المحاصيل انعكاساته على خواص الأراضى الطبيعية والكيماوية؛ ومن ثم على قدرتها الإنتاجية. وتسهم نتائج الدراسات ـ التى قام بها قسم حصر الأراضى بمعهد بحوث الأراضى والمياه (١٩٨٨) ـ إسهاماً فعالا فى توصيف وتحديد العوامل المؤثرة فى إنتاجية الأراضى الزراعية المصرية بوجه عام؛ وذلك استرشادا بنتائج دراسات الحصر التصنيفى لأراضى محافظة الفيوم خلال فترتين يفصل بينهما حوالى عشرون عاما؛ حين أجريت الدراسة الأولى مابين (١٩٥٧ ـ ١٩٦١)، فى حين أجريت الدراسة الثانية فيما بين عامى (١٩٧٩ ـ ١٩٨٢).

وقد شملت هذه الدراسات الوصف المورفولوجى للقطاعات الممثلة لأراضى المحافظة، وعمق الماء الأرضى، والنفاذية، والقوام، وتتابع طبقات القطاع، علاوة على مستوى الأملاح، ونوعية الكاتيونات والأنيونات الذائبة، وخصوبة التربة؛ وذلك لتحديد إنتاجية الأراضى كمحصلة لهذه التقديرات التى اتخذت مقياسا لمدى التحسن والتدهور الذى طرأ على أراضى المحافظة خلال هذه الفترة.

وباستعراض البيانات الواردة بجدول (٣) يلاحظ أن أسلوب إدارة الأراضى والظروف المحيطة بالإنتاج الزراعى بالمحافظة ـ من حيث إيجابياتها وسلبياتها ـ أظهرت الاتجاهات التالية فى بيانات الدراسة الثانية إذا ماقورنت بسنة الأساس (الدراسة الأولى).

أولا ـ مستوى الماء الأرضى:

تسود ظاهرة ارتفاع مستوى الماء الأرضى معظم أراضى المحافظة، بالرغم من اختلاف المراكز فيما بينها فى سيادة هذه الظاهرة بأراضيها؛ فقد انخفضت ـ بصفة عامة ـ مساحات الأراضى التى تتميز بعمق مستوى الماء الأرضى فى جميع مراكز المحافظة. ويعزى سيادة هذا العامل بأراضى المحافظة إلى إسراف المزارعين فى الرى، وخاصة بالمساحات الواقعة عند بدايات الترع وانخفاض كفاءة شبكة الصرف

الحقلى بهذه المساحات (عدم وجود مصارف حقلية، وحاجة الشبكة كلها إلى التطهير والتعميق). وتنفرد محافظة الفيوم بظاهرة اختلاف مناسيب الأراضى الزراعية التى تتسبب فى رفع مستوى الماء الأرضى بالمناطق المنخفضة.

ثانيا ـ ملوحة الأراضى:

تشير البيانات الواردة بجدول (٣) إلى حدوث تدهور ملحوظ فى ملوحة بعض الأراضى، خاصة الواقعة بنهايات الترع والتى تعانى قلة مياه الرى؛ ومن ثم احتياجاتها الغسيلية؛ مما أدى إلى تزهر الأملاح، وزيادة ملوحة الأراضى.

وفى الوقت نفسه أدت عمليات رفع كفاءة شبكات الصرف وزيادة معدلات الرى فى بعض المناطق إلى خفض ملوحة هذه الأراضى، وعلى هذا الأساسى انخفضت مساحة الأراضى المتوسطة الملوحة والمرتفعة الملوحة على مستوى المحافظة.

ثالثا ـ قلوية الأراضى:

انخفضت مساحات الأراضى الخالية من القلوية بطول القطاع فى جميع مراكز المحافظة، فى حين إزدادت بشكل ملحوظ مساحات الأراضى التى تعانى القلوية، سواء بطول القطاع، أم تحت التربة (ذات القلوية تحت التربة) زيادة كبيرة فى حالة مركز طامية؛ حيث ارتفعت نسبتها من ٥,٩٪ (الدراسة الأولى) إلى ٥٣,٤٪ (الدراسة الثانية).

رابعا ـ القدرة الإنتاجية للأراضى:

انعدمت تماما مساحات أراضى الدرجة الأولى فى كل من مركزى الفيوم وسنورس، بينما اختفت هذه النوعية تقريبا فى مركز أبشواى. وبوجه عام انخفضت مساحة هذه الأراضى بما يقرب من ١٠ آلاف فدان على مستوى المحافظة.

ومن ناحية أخرى تحسنت النسبة المئوية لكل من أراضى الدرجة الثانية والثالثة؛ نتيجة إجراء عمليات تحسين التربة المختلفة.

ومن خلال هذه الدراسات ظهرت بعض المؤشرات التى أبرزتها بيانات الحصر التصنيفى لمحافظة الفيوم (الأول والثانى)، والعوامل المرتبطة بأسباب التدهور وتلاشى الأراضى ذات القدرة الإنتاجية العالية؛ حيث يمكن الاستعانة باتجاهاتها، وتحديد مستوى إسهاماتها فى خفض الدخل القومى. وفى الوقت نفسه تمثل هذه المؤشرات إحدى الخطوات الأساسية نحو وضع تخطيط مناسب للاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم العائد منها.

مشاكل الأراضي المصرية:

يتناول الكتاب المشاكل التى تواجه الأراضى المصرية والتى تشمل العوامل التى أظهرتها دراسات الحصر التصنيفى لمحافظة الفيوم، بجانب بعض المشاكل الأخرى كما يلى:

١ ـ الفقد فى الأراضى الزراعية.

٢ ـ الأراضى المتأثرة بالملوحة.

٣ ـ الصرف الزراعى.

٤ ـ الإسراف فى مياه الرى.

٥ ـ خصوبة الأراضى الزراعية.

٦ ـ التلوث بالأراضى.

٧ ـ مشاكل الأراضى الجديدة.

وتعالج فصول الكتاب هذه المشاكل، مع إبراز الدراسات والتطبيقات المتعلقة بهذه المشاكل، وما تقوم به الدولة نحو وضع الحلول المثلى لها.

openkandil.com

جدول (٣) : تقسيم أراضي محافظة الفيوم (على أساس النسبة المئوية للمساحة) . حسب عمق مستوى الماء الأرضي، وملوحة التربة، وقلوية التربة بطبقات القطاع، والقدرة الإنتاجية للأراضي خلال الفترة الأولى (١٩٥٧ ـ ١٩٦١) ، والفترة الثانية (١٩٧٩ ـ ١٩٨٢) .

	الفترة الأولى (١٩٥٧ ـ ١٩٦١)				الفترة الثانية (١٩٧٩ ـ ١٩٨٢)				على مستوى المحافظة	
	الفيوم	سنورس	أبشواى	طامية	اطسا	الفيوم	سنورس	أبشواى	طامية	اطسا	الأولى	الثانية
أولا ـ مستوى الماء الأرضي												
عميق) ١٥٠ سم	٪٧٤,١	٪٧٩,٠	٪٦٧,٠	٪٧٩,٨	٪٦٩,٥	٪٥٢,٦	٪٤١,٠	٪٤٩,٨	٪٧١,٠	٪٦٣,١	٪٧٢,٨	٪٥٦,٣
متوسط ٨٠ ـ ١٥٠ سم	٪١٢,٦	٪ ٧,٥	٪ ٨,٤	٪١٢,١	٪١٨,٧	٪٢١,٩	٪٤٣,٥	٪٢٢,٠	٪١٧,٧	٪٢٢,٦	٪١٢,٤	٪٢٤,٤
مرتفع (٨٠ سم	٪ ٠,٩	٪ ٢,١	٪ ٤,٧	٪ ٠,٣	٪ ٢,٠	٪١٢,٣	٪ ٣,٨	٪ ٧,١	٪ ٢,١	٪ ٤,٥	٪ ٢,١	٪ ٦,٠
بور مخمور	—	—	٪ ١,٥	٪٠,١٤	—	—	—	٪ ٢,١	٪ ٠,٧	—	٪٠,٣٨	٪ ٠,٦
ثانيا ـ الملوحة												
عادية (٤ ملليموز/ سم)	٪٥٢,٣	٪٤٧,٤	٪٢٥,٨	٪٢٢,٤	٪٢١,٠	٪٤٣,٠	٪٦٥	٪٤٥,٢	٪٣٣,١	٪٥٨,١	٪٣١,٩	٪٤٨,٩
متوسطة (٤ ـ ٨ ملليموز/سم)	٪١٦,٩	٪٢٨,٤	٪٣١,٠	٪٢١,٩	٪٣٩,٦	٪٢١,٩	٪١٥	٪ ٨,٠	٪٢٥,٧	٪١١,٦	٪٢٨,٧	٪١٥,٦
مرتفعة (٨ ـ ١٦ ملليموز/سم)	٪١٢,٥	٪١٤,٢	٪١٥,٦	٪٤٨,٠	٪٢٠,٩	٪١٣,٣	٪١٠	٪١٧,٥	٪١٧,٣	٪١٥,٥	٪٢١,٩	٪١٥,١
مرتفعة جدا (١٦ ملليموز/سم)	٪ ٧,٢	٪ ٤,٧	٪ ٧,٨	—	٪ ٨,٠	٪٨,٠٧	٪ ٤	٪١٠,٣	٪١٥,٥	٪ ٤,٢	٪ ٥,٩	٪ ٨,٤
ثالثا ـ القلوية												
خالية من القلوية	٪٦٠,٩	٪٨٥,٤	٪٧٥,٠	٪٧٥,٢	—	٪٢٩,٨	٪٧٢,٨	٪٤٤,٣	٪٢٢,٤	—	..	—
الطبقة السطحية خالية)وقلوية تحت التربة	٪ ٥,٦	٪ ٤,٠	٪ ٣,٨	٪ ٥,٩	—	٪٣١,٥	٪ ٩,٢	٪٢٩,٨	٪٥٣,٤	—	—	—
قلوية بطول القطاع	٪٢١,٠	٪ ٥,٣	٪ ١,٤	٪١١,٢	—	٪٢٦,٣	٪١٢,٤	٪ ٧,٠	٪١٥,٨	—	—	—
رابعا ـ القدرة الإنتاجية :												
الدرجة الأولى	٪١,٢٦	٪ ٥,٣	٪ ٦,٣	—	—	—	—	٪٠,٦	—	—	٪ ٢,٥	٪٠,١٤
الدرجة الثانية	٪٣٤,٥	٪٢٢,٤	٪١٧,٠	٪ ٢,٥	٪ ٣,٣	٪٢٦,١	٪٢٨,٤	٪١٥,٥	٪١١,٧	٪٢١,٤	٪١٤,٩	٪٢٠,٢
الدرجة الثالثة	٪٣٧,١	٪٤٦,٦	٪٣٥,٨	٪٥٤,٣	٪٥٣,٤	٪٤١,٤	٪٤٦,٥	٪٣٨,٩	٪٥١,١	٪٤١,٤	٪٤٥,٤	٪٤٢,٩
الدرجة الرابعة	٪ ٧,٤	٪ ٩,٥	٪١٠,٧	٪٢٠,٥	٪١٦,٦	٪١١,٩	٪ ٩,٨	٪١٨,٦	٪١٧,٦	٪١٢,٥	٪١٣,٢	٪١٤,٤
بور صالحة للزراعة	٪ ٨,٢	٪ ٨,٣	٪١٠,٣	٪١٤,٢	٪١٦,٢	٪ ٨,١	٪ ٦,٢	٪ ٥,٢	٪١١,٢	٪١٤,٦	٪١١,٩	٪ ٩,٢
بور مخمور	٪ ,٣٦	٪ ١,٨	٪ ١,٧	٪ ,١٤	٪ ,١٦	٪ ٠,١	٪ ٢,٤	٪ ٢,٠	٪ ٠,٢	٪ ,٣١	٪ ٠,٨	٪ ١,٠
السادسة	٪١١,٢	٪ ٥,٩	٪١٨,١	٪ ٧,٦	٪١٠,٥	٪١٢,٤	٪ ٦,٥	٪١٩,٨	٪ ٨,٢	٪ ٩,٨	٪١١,٣	٪١١,٩

الفصل الثالث

الفقد فى الأراضى الزراعية

obeikandl.com

obeikandl.com

مقدمة:

مصر هبة النيل. ويشغل الوادى والدلتا حوالى ٣,٥٪ فقط من المساحة الكلية لجمهورية مصر، والتى تبلغ ١,٠٠١,٤٥٠ كيلو متر مربع. وتنحصر الأراضى الزراعية فى الشريط الضيق المتاخم لنهر النيل فى الوجه القبلى، والدلتا فى الوجه البحرى كما يلى:

- ٣,٦٠ مليون فدان فى الدلتا.
- ١,٢٤ مليون فدان فى مصر الوسطى.
- ١,١٥ مليون فدان فى مصر العليا.

وقد تناقص نصيب الفرد من الأراضى الزراعية من ٠,٤٨ فداناً فى عام ١٩٠٧ إلى ما يقرب من ٠,١٥ فداناً فى عام ١٩٧٥ . وسوف يصل هذا المعدل إلى حوالى ٠,٠٧ فداناً بحلول عام ٢٠٠٠ برغم البرامج الطموحة الخاصة بالأراضى الجديدة. وتسهم المعدلات العالية للزيادة فى عدد السكان ـ بالإضافة إلى العوامل المختلفة المسببة لتناقص الرقعة الزراعية ـ فى زيادة حدة مشكلة الفجوة الغذائية.

وقد تناولت عدة دراسات موضوع تناقص الأراضى الزراعية والمساحات التى تفقد سنويا؛ حيث تباينت المعدلات السنوية طبقا لكل دراسة؛ فعلى سبيل المثال تشير بيانات وزارة الزراعة (١٩٧٨) إلى أن هذا المعدل يتراوح بين ١٠ ـ ١٥ ألف فدان سنويا خلال الفترة (١٩٦٥ ـ ١٩٧٥)، فى حين تشير بيانات وزارة التخطيط إلى هذا المعدل يصل إلى ٢٠,٠٠٠ فدان سنويا خلال هذه الفترة أيضا.

وفى هذا الخصوص يرى الدكتور الطوبجى (١٩٧٦) أن النقص الحادث فى الرقعة الزراعية ـ نتيجة التوسعات الحادثة فى القوى والمدن وعواصم المحافظات، إلى جانب التجمعات الصناعية ـ يصل إلى معدل ٤٠,٠٠٠ فدان سنويا، بينما يرى الدكتور خالد علام (١٩٧٠) والدكتور مصطفى الجبلى (١٩٧٥) أن هذا المعدل يصل إلى ٥٠,٠٠٠ فدان سنويا؛ حيث فقد ما يقرب من ١/٢ مليون فدان خلال عشر سنوات حتى عام (١٩٧٦).

وتشير دراسات التنمية الحضرية (١٩٨٢) إلى أنه خلال الفترة ما بين (١٩٦٠ ـ ١٩٧٦) تفوقت مدن الدلتا التى يزيد تعدادها على ٥٠,٠٠٠ نسمة فى معدل نموها على القاهرة الكبرى من حيث الزحف العمرانى.

وتجدر الإشارة إلى أن التوسع بمنطقة الدلتا يتم على حساب الأراضى الزراعية المجاورة؛ حيث لا يوجد بديل آخر لمواجهة التوسع الأفقى للمدن. ومما يزيد من خطورة هذا التوسع بالذات أن معظمه يتم أساسا فى المساحات المجاورة للمدن، وهى الأراضى ذات القدرة الإنتاجية العالية والمصنفة كأراضٍ من الدرجة الأولى من حيث خواصهاوإنتاجيتها.

وعلى سبيل المثال فقد أشارت هذه الدراسة إلى أن معدل الفقد فى الأراضى الزراعية فى مدن الدلتا يصل إلى ١٠,٧٠ فداناً لكل ١٠٠٠ نسمة جديدة، فى حين تصل هذه النسبة إلى ٧,٢٠ فداناً بالقاهرة الكبرى. وتوصى هذه الدراسة بضرورة قيام مراكز صناعية فى الأراضى الصحراوية بحيث تكون عامل جذب للأيدى العاملة.

ومن ناحية أخرى فقد أوضحت الدراسة الخاصة بالتنمية الزراعية فى مصر (SAAD ١٩٨٢) أن حوالى ٠,٥ ـ ١,٠ ٪ من الأراضى الزراعية تستقطع سنويا لأغراض غير زراعية. وقد أوصت هذه الدراسة فى هذا الشأن بما يلى:

أولا ـ ضرورة الحفاظ على الأراضى الزراعية واستبعاد إقامة المبانى الحكومية عليها، مع وضع القوانين التى تحرم استخدامها فى أغراض غير زراعية.

ثانيا ـ ضرورة تنشيط الدراسات الخاصة ببدائل الطوب حفاظا على التربة الزراعية المستخدمة فى صناعته.

دراسات المخطط الرئيسي لتنمية المياه:

قام مشروع المخطط الرئيسى لتنمية الموارد المائية فى مصر (محمد الزناتى وآخرون ١٩٨٤) بدراسة ظاهرة فقدان الأراضى الزراعية وأثرها فى الإنتاج الزراعى، علاوة على تقدير مساحات الأراضى الجديدة الواجب إضافتها إلى الرقعة الزراعية تعويضا للنقص الحادث فى الإنتاج الزراعى، بالإضافة إلى أسلوب تخطيط المياه وتكلفتها. وللقيام بهذه الدراسة فقد أخذت فى الحسبان المصادر المختلفة للبيانات الخاصة بالرقعة الزراعية، ومعدلات الفقد السنوية فى هذه الأراضى كما يلى:

مصادر البيانات الخاصة بالرقعة الزراعية:

١ ـ بيانات التعداد الزراعى لأعوام ١٩٢٩، ١٩٣٩، ١٩٥٠، ١٩٦١.

٢ ـ بيانات استخدامات الأراضى لأعوام ١٩٦٤ حتى ١٩٨٠ (منظمة الأغذية والزراعة FAO).

٣ ـ بيانات حصر الأراضى (١٩٧٣) ـ معهد بحوث الأراضى والمياه.

٤ ـ بيانات معهد الاقتصاد الزراعى.

(أ) الأرض الزراعية على مستوى المركز (١٩٧٢ ـ ١٩٨٢).

(ب) استخدام بيانات التركيب المحصولى للموسم الشتوى والصيفى للفترة (١٩٦٠ ـ ١٩٧٩) فى تحديد مساحة الأرض الزراعية.

٥ ـ بيانات مركز الاستشعار عن بعد (فبراير ١٩٧٨) ـ أكاديمية البحث العلمى.

٦ ـ بيانات دراسة التنمية الحضرية (١٩٧٢ ـ ١٩٧٨) ـ وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية:

(أ) بيانات الأراضى على مستوى المحافظة.

(ب) البيانات الخاصة بالمدن.

كما استخدمت البيانات الخاصة باستصلاح الأراضى والمساحات المضافة إلى الرقعة الزراعية خلال الفترة من (١٩٦٠ ـ ١٩٨٠)؛ وذلك لحساب معدل الفقد الحادث فى الأراضى.

ومن خلال البيانات المتحصل عليها من المصادر السابقة (جدول٤) ظهرت بعض الاتجاهات كما يلى:

١ ـ بيانات التعداد الزراعى تشير إلى ثبات المساحة تقريبا منذ (١٩٩٢) حتى عام (١٩٥٠)؛ حيث بلغت المساحة الكلية للأراضى الزراعية حوالى ٥,٦٠٠ مليون فدان، ثم زادت إلى حوالى ٥,٩٠٠ مليون طبقا لبيانات تعداد (١٩٦١)؛ نتيجة لأنشطة التوسع الأفقى خلال هذه الفترة.

٢ ـ باستقراء بيانات FAO يلاحظ زيادات سنوية مستمرة فى مساحة الأراضى الزراعية، تتماثل مع الزيادات الحادثة نتيجة برامج التوسع الأفقى منذ عام (١٩٦٤) حتى (١٩٧٣)؛ وعلى هذا الأساس بلغت مساحة الأراضى فى عام (١٩٨٠) حوالى ٦,٧٩٨ مليون فدان. ولم تتعرض هذه البيانات للمساحات التى تتآكل نتيجة عمليات الزحف العمرانى وعوامل الفقد الأخرى.

٣ ـ أجريت عمليات الحصر التصنيفى ـ معهد بحوث الأراضى والمياه ـ مرة واحدة، استكملت دراساتها فى عام (١٩٧٣). وهذه البيانات تساعد فقط على التعرف إلى القدرة الإنتاجية للأراضى المصرية طبقا لأسس التصنيف المتبعة، وفى الوقت نفسه لا يمكن من خلالها تحديد معدلات الفقد فى الأراضى الزراعية.

٤ ـ من واقع بيانات المساحة الفعلية للأراضى الزراعية على مستوى المركز (معهد بحوث الاقتصاد الزراعى (١٩٧٢ ـ ١٩٨٢) لوحظت تغييرات كبيرة فى مساحات بعض المراكز؛ نتيجة لإنشاء مراكز جديدة إدارية ـ تضم أجزاء من زمامات المراكز المجاورة، علاوة على استقطاع بعض الأراضى أو استصلاح أراضٍ جديدة.

جدول (٤) مساحة الأرض الزراعية (بالمليون فدان) تبعا لتقديرات المصادر المختلفة

السنة	التعداد الزراعى	منظمة الاغذية والزراعة	معهد الاقتصاد الزراعى	قسم حصر الاراضى بوزارة الزراعة	التركيب المحصولى		مركز الاستشعار عن البعد	دراسات التنمية الحضرية
					الموسم الشتوى	الموسم الصيفى		
١٩٢٩	٥,٦٠٨	–						
١٩٣٩	٥,٥٨١	–						
١٩٥٠	٥,٦٧١	–						
١٩٦٠	–	–			٥,٦٤٠	٥,٤٤٦		
١٩٦١	٥,٩٧٤	–			٥,٥٩٤	٥,١٥٨		
١٩٦٢	–	–			٥,٤٤٣	٥,٤٠٥		
١٩٦٣	–	–			٥,٣٢٧	٥,٤٩٦		
١٩٦٤		٥,٩٦٧			٥,٣٦٩	٥,٤٥٧		
١٩٦٥		٦,٣٦٢			٥,٦١٦	٥,٤٧٧		
١٩٦٦		٦,٦١٩			٥,٦٢٩	٥,٨٧٠		
١٩٦٧		٦,٦٦٩			٥,٥٠٤	٥,٥٣١		
١٩٦٨		٦,٦٦٩			٥,٥٩٠	٥,٦٣٨		
١٩٦٩		٦,٧٥٠			٥,٥٥٩	٥,٦٩٠		
١٩٧٠		٦,٧٦٩			٥,٦٦٥	٥,٧١٢		
١٩٧١		٦,٧٩١			٥,٦٥٣	٥,٦٧٢		
١٩٧٢		٦,٧٩٨			٥,٦٨١	٥,٧٠٩		٦,٥٥٤
١٩٧٣		٦,٧٩٨	٥,٨٨٤	٥,٧٨٧	٥,٧١٨	٥,٧٤٤		
١٩٧٤		٦,٧٦٩	٥,٨٩٠		٥,٧٣٧	٥,٨٠٩		
١٩٧٥		–	٥,٨٧٥		٥,٧٩٧	٥,٨٢٩		
١٩٧٦		٦,٧٠٠	٥,٨٧٠		٥,٨٩٤	٥,٦٥١		
١٩٧٧		٦,٧٤١	٥,٨٦٩		٥,٧٩٢	٥,٦٥٤		
١٩٧٨		٦,٧٥٨	٥,٨٥٥		٥,٨٠٣	٥,٦١٤	٦,٠٩٢	٦,٥٢٣
١٩٧٩		٦,٧٨١	٥,٨٦٠		٥,٩٢٠	٥,٦٢٨١		
١٩٨٠		٦,٧٩٨	٥,٨٧٨					
١٩٨١			٥,٨٨٩					
			٥,٩٢١					
المتوسط	٥,٧٠٨	٦,٦٧١	٥,٨٧٩	٥,٧٨٧	٥,٦٤٢	٥,٥٩٥	٦,٠٩٢	٦,٥٣٩

المصدر: مشروع الأمم المتحدة لتنمية الموارد المائية واستخداماتها ـ التقرير الفنى رقم ٢٨ ـ ديسمبر ١٩٨٤.

أما من حيث استخدم بيانات التركيب المحصولى للمحاصيل الصيفية والشتوية فى تحديد مساحة الأراضى الزراعية خلال الفترة (١٩٦٠ ـ ١٩٧٩) فتشير التحليلات إلى أن المساحة الكلية للأراضى الزراعية لم تتجاوز ٦ ملايين فدان باستخدام هذه البيانات. وهذه الأرقام تتماثل مع بيانات كل من الحصر التصنيفى للأراضى، وفى الوقت نفسه تقل كثيرا عن بيانات FAO.

٥ ـ اقتصرت بيانات مركز الاستشعار عن بعد على البيانات المأخوذة خلال شهر فبراير (١٩٧٨) فقط لتحديد مساحة الأرض الزراعية، وهذه تحتاج إلى إجراء الدراسة ذاتها على بيانات أخرى خلال شهور الصيف لاستكمال دقة البيانات والتحقق منها. وقد بلغت المساحة الكلية ٦,٠٩١ مليون فدان.

٦ ـ تعتبر البيانات الخاصة بدراسات التنمية الحضرية (١٩٧٢ ـ ١٩٧٨) أساسا هاما فى تقرير كل من المساحة الكلية، علاوة على معدل الفقد فى الأراضى؛ حيث استخدم نفس أسلوب التقرير خلال أعوام (١٩٧٢، ١٩٧٨). وقد بلغت المساحة الكلية للأراضى ٦,٥٥٤، و٦,٥٢٢ مليون فدان على الترتيب.

التباين في تقديرات المساحة الكلية للأراضي الزراعية:

تشير البيانات الواردة بجدول (٤) إلى أن هناك تباينا واضحا فى تقرير المساحة الكلية للأراضى طبقا للمصدر المختلفة، حيث تختلف فيما بينها فى أسلوب وطرق التقدير، والأعوام التى أجريت فيها هذه الدراسات. وبرغم هذا كله نجد أن معظم هذه المصادر تتفق فى تقديراتها للمساحة الكلية والتى تقل عن ٦ ملايين فدان. وتقع هذه التقديرات فى المدى ٥,٥٩٥ حتى ٦,٥٣٩ مليون فدان.

ووفقا للحصر الذى قامت به الهيئة المصرية العامة للمساحة عام (١٩٨٨) باستخدام التصوير الجوى والرفع الأرضى للمحافظات فيما عدا شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد بلغت المساحة الزراعية ٧,١٩٣ مليون فدان. ومن ناحية أخرى تقوم وحدة الاستشعار عن بعد ـ بمعهد بحوث الأراضى

والمياه ـ بإجراء دراسات على التغيرات التى حدثت فى مجرى النيل بفرع دمياط ابتداء من القناطر الخيرية حتى مصب فرع دمياط، وقد شملت هذه الدراسات تغيرات المجرى، علاوة على وضع الجزر الموجودة بفرع دمياط سواء ما ظهر منها حديثا أم اختفى أم تآكل جزء منها.

كما تناولت الوحدة كذلك موضوع تآكل شواطىء مصبات فرع دمياط ورشيد، وتتبع التغيرات التى طرأت عليهما. وتحظى مساحة الأرض الزراعية المصرية بجهد وافر بالإضافة إلى تتبع الامتداد العمرانى على فترات مختلفة فى بعض المدن كالمنيا وكفر الشيخ.

التباين في تقديرات معدل الفقد السنوي للأراضي الزراعية:

باستقراء البيانات الخاصة بالأراضى يتضح وجود اختلافات كبيرة فى تقدير معدل الفقد السنوى للأراضى الزراعية؛ ففى حالة استخدام بيانات معهد الاقتصاد الخاصة بمساحات المراكز نجد أن هذا المعدل يصل إلى ٢٥,٥٠٧ ألف فدان سنويا خلال الفترة (١٩٧٢ ـ ١٩٧٨)، بينما يصل هذا المعدل إلى ٤٥,٠، ٣٠,٠ ألف فدان باستخدام بيانات التركيب المحصولى للموسم الشتوى والصيفى على الترتيب.

وقد بلغ هذا المعدل ٤٤,٠ ألف فدان سنويا باستخدام بيانات دراسات التنمية الحضرية (١٩٨٢)؛ حيث تتساوى تقريبا المساحة الكلية للأراضى فى أعوام (١٩٧٢)، (١٩٧٨)، والتى بلغت ٦,٥٥٤، و٦,٥٢٣ مليون فداناً فى عامى (١٩٧٢)، (١٩٧٨) على الترتيب بفارق حوالى ٣٠,٨٨ ألف فدان. وقد تم تقدير معدل الفقد فى الأراضى على أساس إضافة هذا النقص فى المساحة إلى مجموع ما استصلح خلال هذه الفترة والذى بلغ ٢٣٨,٠ ألف فدان؛ وبذلك يكون مجموع الفقد الكلى فى الأراضى الزراعية خلال فترة الدراسة هو: ٢٣٨,٠٠ + ٣٠,٨٨= ٢٦٨,٨٨ ألف فدان؛ أى بمعدل سنوى قدره ٤٤,٠ ألف فدان.

واستكمالا لهذه المصادر فقد أوضحت رجاء رزق (١٩٨٠) أن عدد القرى فى مصر بلغ ٤٠٦٦ قرية، وأن مجموع ما يفقد من الأراضى حول هذه القرى لأغراض غير زراعية يبلغ حوالى ٥١,٨٣٠ ألف فدان سنويا. وقد اعتمدت الباحثة فى تقديراتها على المعدلات السائدة فى قرى محافظة الشرقية مستخدمة إياها على مستوى الجمهورية؛ حيث بلغ هذا المعدل ٧٥,٠ ألف فدان سنويا خلال الفترة ما بين (١٩٧٠ ـ ١٩٧٩).

وفيما يلى ملخص لتقدير المعدلات المختلفة للفقد فى الأراضى الزراعية طبقا للمصادر المستخدمة:

	معدل الفقد السنوى		المصـــــــدر
١ـ	١٠٠٠٠ ـ ١٥٠٠٠	فدان	وزارة الزراعة (١٩٦٥ ـ ١٩٧٥)
٢ـ	٢٠٠٠٠	فدان	وزارة التخطيط (١٩٦٥ ـ ١٩٧٥)
٣ـ	٢٥٠٠٠	فدان	المساحة المزروعة على مستوى المركز (١٩٧٢ ـ ١٩٨٢) — معهد بحوث الاقتصاد الزراعى
٤ـ	٣٠٠٠٠	فدان	بيانات التركيب المحصولى الصيفى (١٩٦٠ ـ ١٩٦٩) — معهد بحوث الاقتصاد الزراعى
٥ـ	٤٠٠٠٠	فدان	الدكتور حسن الطوبجى (١٩٧٦)
٦ـ	٤٤٠٠٠	فدان	دراسات التنمية الحضرية (١٩٨٢)
٧ـ	٤٥٠٠٠	فدان	دراسات التنمية الزراعية (١٩٨٢)
٨ـ	٤٥٠٠٠	فدان	بيانات التركيب المحصولى الشتوى (١٩٦٠ ـ ١٩٧٩)
٩ـ	٥٠٠٠٠	فدان	الدكتور مصطفى الجبلى (١٩٧٥)
١٠ـ	٥٠٠٠٠	فدان	الدكتور خالد علام (١٩٧٠)
١١ـ	٧٥٠٠٠	فدان	الباحثة رجاء رزق (١٩٨٠)

وقد تناولت تقارير الهيئة الهامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى موضوع حماية الأراضى الزراعية وما تتعرض له من أساليب مختلفة لتبويرها؛ حيث

أوضحت أن المعدل السنوى لتناقص المساحة المزروعة بلغ ٢٠ ـ ٤٠ ألف فدان اعتبارا من عام (١٩٥٠). ومن ناحية أخرى تشير التقارير إلى ارتفاع معدل استنزاف الأراضى خلال الفترة من (١٩٧٣ حتى ١٩٨٣)؛ حيث وصل إلى قرابة ٧٠ ألف فدان سنويا؛ نتيجة خروج العمالة المصرية لدول النفط، وما تبعه من عوائد مادية كبيرة انعكست آثارها فى تغيير أنماط الحياة بالريف المصرى، فضلا على الزيادة العشوائية فى تعداد السكان؛ مما كان له أثره البالغ فى استقطاع مساحات كبيرة من الأراضى لمواجهة الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية.

وسنتناول بشيء من التفصيل منهاج الدراسة التى قامت بها رجاء رزق (١٩٨٠) فى معالجتها لموضوع الفقد السنوى فى الأرضى الزراعية، والذى يعتبر أعلى معدلات الفقد، وقد اعتمدت فى تقديراتها على اتجاهين هما:

الاتجاه الأول:

يقوم هذا الاتجاه على أساس محاولة لحصر المنشآت المقامة على الأرض الزراعية عن طريق نزع ملكيتها بغرض المنفعة العامة بالدولة فى الفترة (١٩٧٥ ـ ١٩٧٩)، وكذلك المبانى والمنشآت المقامة فى الأرض الزراعية وفقا لأحكام (تراخيص ومخالفات) القوانين والتشريعات المنظمة لعملية تجريف الأرض الزراعية والبناء عليها فى الفترة من بدء العمل بهذه التشريعات حتى نهاية (١٩٧٩) كما هو موضح بجدول (٥)؛ حيث تشير البيانات الواردة بهذا الجدول إلى أن إجمالى المساحات المستقطعة لمختلف الأغراض الحضرية والتجريف حوالى ١٠٥٦٠ فداناً خلال الفترة (١٩٧٥ ـ ١٩٧٩)؛ بمتوسط سنوى حوالى ٢١١٢ فداناً.

جدول (٥) : إجمالى المساحات المستقطعة بنزع الملكية والتشريعات الزراعية على أساس التراخيص المستخرجة فى الفترة ١٩٧٥ ـ ١٩٧٩ .

الأغراض المختلفة	المساحة بالفدان	المتوسط السنوى	٪ من الإجمالى
مشروعات نزع الملكية	٢٠٠٠	٤٠٠,٠	١٨,٩
تراخيص مبانى مستخرجة	١٥٨٠	٣١٦,٠	١٤,٩
تراخيص تجريف مستخرجة	٤٤٢	٨٨,٤	٤,٢
مخالفات المبانى	٢٦٢٧	٥٢٥,٤	٢٤,٩
مخالفات التجريف	٣٩١١	٧٨٢,٢	٣٧,٠
الإجمالى	١٠٥٦٠	٢١١٢	١٠٠

وهذا الرقم لا يمثل إطلاقا ما يجرى للرقعة الزراعية بالقرى والمدن؛ حيث تطغى ظاهرة زحف المبانى والتجريف برغم القوانين الحاكمة لها؛ مما يوحى بصعوبة توقفها فى ظل غياب البديل اللازم لمواجهة الطلب المتزايد على هذه الأراضى للاستخدام الحضرى.

الاتجاه الثانى:

يعتمد هذا الاتجاه على المشاهدات الميدانية لبعض القرى وزحف مبانيها على الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى الخطة القومية للإسكان الحضرى (١٩٨١ ـ ٢٠٠٠) وتقديراتها لاحتياجات الفرد من الأراضى.

وقد تبين من المشاهدات اختلاف متوسط الاستقطاع السنوى من الأرض الزراعية باختلاف مساحة القرية أو المدينة وعدد سكانها؛ حيث بلغت نحو ٥ أفدنة فى القرية الصغيرة ونحو ٣٠ فداناً فى القرية الكبيرة فى الفترة (١٩٧٠ ـ ١٩٧٩)؛ وعلى هذا فإن متوسط ما يستقطع من الأراضى بلغ ١٤,٠٣٠ ألف فدان سنويا بالقرى الصغيرة على مستوى الجمهورية (٢٨٠٦ قرية صغيرة)، إلى جانب ٣٧,٨٠٠ ألف فدان للقرى الكبيرة (١٢٦٠ قرية كبيرة). ويبين جدول (٦)

متوسط الاستقطاع السنوى من الأراضى الزراعية لمختلف الأغراض الحضرية على مستوى الجمهورية (١٩٧٠ ـ ١٩٧٩)؛ حيث شمل بيانات المشاهدات الميدانية لتوسعات القرى والتجريف وصناعة الطوب الأحمر، علاوة على توسعات المدن التى اعتمدت على قروض الخطة القومية المقترحة لمواجهة مشكلة الإسكان الحضرى. وقد بلغ متوسط ما استولى عليه الزحف الحضرى بجميع قرى ومدن مصر خلال هذه الفترة حوالى ٧٥,٠ ألف فدان سنويا.

وبمقارنة نتائج كل من الاتجاهين يتضح عدم فعالية التشريعات الصادرة لإيقاف الزحف العمرانى على الرقعة الزراعية فى وادى ودلتا النيل.

جدول (٦): متوسط الاستقطاع الحضرى من الأراضى الزراعية للأغراض الحضرية المختلفة على مستوى الجمهورية (١٩٧٠ ـ ١٩٧٩).

	الأغراض غير الزراعية	المتوسط السنوى للاستقطاع	
		بالفدان	٪
١	مبانٍ ومنشآت بالقرى	٤٠٩٤٦	٥٤,٥٪
٢	تجريف صناعة الطوب بالقرى	١٠٨٨٤	١٤,٥٪
٣	مبانٍ ومنشآت بالمدن	١٠١٨٨	١٣,٦٪
٤	عملية التجريف بالمدن	٢٥٤٧	٣,٤٪
٥	طرق مرصوفة	٤٢٦٨	٥,٧٪
٦	طرق غير مرصوفة	٦١٧٩	٨,٢٪
		٧٥.١٢	

عوامل فقد الأراضي الزراعية:

أولا ـ التوسع العمرانى:

شملت دراسة التنمية الحضرية (١٩٨٢) البيانات الخاصة بالتغيرات فى كل من المساحة الزراعية والمساحات الحضرية فى حين لم تشملها المصادر الأخرى للبيانات؛

مما أدى إلى الاعتماد عليها بصفة أساسية فى تتبع التغيرات الحادثة بالرقعة الزراعية، نتيجة التوسع العمرانى التى قام بها مشروع المخطط الرئيسى لتنمية مصادر المياه (١٩٨٤). ويشير تقرير المشروع إلى صعوبة تحديد مناطق التوسع العمرانى من حيث كونها تمت على أراضٍ زراعية أو أراضٍ بور، علاوة على صعوبة التفريق بين الزحف العمرانى من حيث حدوثه على الأراضى القديمة أو الجديدة طبقا للبيانات الواردة بجدولى (٧ ، ٨).

وتشير البيانات السابقة أيضا إلى أن من بين ١١ محافظة حدثت بها فقد فى الأراضى الزراعية خلال فترة الدراسة (١٩٧٢ ـ ١٩٧٨) نجد أن محافظات سوهاج والمنيا وأسيوط وأسوان كانت أعلاها فى هذا الأمر، برغم أن الفقد فى الأراضى الزراعية بها يفوق الزيادات الحادثة فى مساحات الزحف العمرانى؛ وبناء على هذا لايمكن إرجاع الفقد فى الأراضى الزراعية إلى عمليات الزحف العمرانى فقط بل يتعداها إلى عوامل أخرى.

ومن ناحية أخرى نجد أن مساحات الزحف العمرانى بمحافظات الدلتا تتساوى مع الفقد الحادث فى الأراضى الزراعية فى بعضها، فى حين تزيد عليها بمقدار٤ ـ ٥ مرات فى أخرى.

وقدبينت هذه الدراسة أيضا أن مساحة الزحف العمرانى خلال فترة الدراسة بلغت ٨٣,٤٦٩ ألف فدان، فى حين كان الفقد فى الأراضى الزراعية ٢٦٨,٨٨٠ ألف فدان؛ فلو فرض أن الزحف العمرانى حدث كله على الأرض الزراعية، فطبقا لهذا يكون إسهام عامل الزحف العمرانى لا يتجاوز ما مقداره ٣١٪ من الفقد الكلى بالأراضى الزراعية. وإذا نظرنا إلى الزيادة فى مساحة الزحف العمرانى الخاص بالمدن الكبيرة (٢٥مدينة) ـ كما يتضح فى جدول (٨) ـ والتى بلغت ٢١,٤٢٦ ألف فدان نجد أنها تمثل فقط ٢٦٪ من مجموع الزحف العمرانى على مستوى الجمهورية، وتمثل أيضا حوالى ٨٪ من مجموع الفقد فى الأراضى الزراعية إذا افترضنا حدوث كل هذا الزحف على الأرض الزراعية.

وبناء على ما سبق ذكره يمكن استخلاص المؤشرات التالية:

١ ـ مجموع مساحات الزحف العمرانى على الأرض الزراعية يساوى حوالى ثلث الفقد الكلى فى الأرض الزراعية. وإذا ما أخذت بعض التحفظات الخاصة بالتمييز بين مساحات الزحف العمرانى والأراضى البور.. فإن هذه النسبة يمكن أن تصل إلى حوالى النصف بدلا من الثلث.

٢ ـ وعلى المستوى القومى فإن حوالى ٥٠ ـ ٦٠٪ من مجموع الفقد الكلى فى الأرض الزراعية يمكن إرجاعه إلى عوامل أخرى غير الزحف العمرانى؛ مثل :

(أ) التوسعات العمرانية ذات المساحات الصغيرة نسبيا؛ كالعزب والنجوع والمنشآت الصناعية المتناثرة بالأرض الزراعية (وهذه يصعب تمييزها ـ إلى حد ما ـ فى تحليل بيانات الصور الفضائية).

(ب) الفقد الحادث نتيجة نحر الأراضى الواقعة على ضفاف النيل (كما سيرد فيما بعد).

(جـ) الفقد الحادث نتيجة الإدارة غير السليمة للأراضى؛ من حيث ارتفاع مستوى الماء الأرض، وزيادة الملوحة بالأراضى الزراعية.

(د) تجريف الأراضى لصناعة الطوب الأحمر (كما سيرد فيما بعد).

جدول (٧) : مساحة الأراضى الزراعية والحضرية (بالفدان) فى عامى (١٩٧٢، ١٩٧٨) (على مستوى المحافظات)

المحافظة	المساحة الحضرية		التغير ٧٢ - ٧٨	المساحة الزراعية		التغير ٧٢ - ٧٨
	١٩٧٢	١٩٧٨		١٩٧٢	١٩٧٨	
القاهرة	٣٥٥٤٦	٤٢٦٣٢	٧٠٨٦	١٤١٧٤	١٢٦٣٨	(١١٥٣٦)
الجيزة	٢٠٩١٩	٢٧٠٥٨	٦١٣٩	١٧٨٣٦٠	١٧٢٠٥٣	(٦٣٠٧)
القليوبية	١٥٩٨١	١٩٠١٩	٣٠٣٨	٧٦٦١٩٩	١٤٤١٩٩	(٦٢٢)
الاسكندرية	١٥١٧٩	١٩٦٩٨	٤٥١٩	٣١٠٥٦	٣٣٥٣٢	٢٤٧٦
السويس	٣٠٥٥	٤٧١٧	١٦٦٢	١٨٧١٢	١٩٢٧٤	٥٦٢
بورسعيد	٤٧٤٥	٤٩٠٠	١٥٥	٣٠٥	٣٥٢	٤٧
الإسماعيلية	٧٥٠٣	١١٢٦٠	٣٧٥٧	٦٥٩٠٦	٦٠٥٦١	٤٦٥٥
المنوفية	١٨١١٠	٢٤٤٧٧	٦٣٦٧	٣٤٧١٧٦	٣٤١٦٧٦	(٥٥٠٠)
البحيرة	٤٤٦٧٠	٤٤٧٦٠	٩٠	٨٦٩٨٣٤	٩١٣٩٨٥	٤٤١٥١
كفر الشيخ	١٥١٥٥	٢٠٠٣١	٤٨٧٦	٥٢٤٤٣٧	٥٧٨٤٦٤	٥٤٠٢٧
الغربية	١٨٢١٧	٢٢٨٤٣	٤٦٢٦	٤٣٩٩٥٨	٤٣٥٢٩٤	(٤٦٦٤)
الدقهلية	٣٠٠٣٤	٣٧٣٨٩	٧٣٤٦	٧٢٧٥٩٦	٧٥٧٢١٣	٢٩٦١٧
دمياط	٥٧٩١	٧٥٥٥	١٧٦٤	١٠٥٩٠٠	١٢٠٤٩٣	١٤٥٩٣
الشرقية	١٦٦٢١	١٩٩٦٢	٣٣٤١	٧٧٥٧٤٩	٧٧٤٥٦٨	(١١٨١)
الفيوم	١٤٥٧٩	١٥٦٧٤	١٠٩٥	٣٥٧٤١٤	٣٤٤٣٢٨	١٣٠٨٦
بنى سويف	١٧٠٥٠	١٨٤٩٣	١٤٤٣	٢٧٢١٠١	٢٧٣٦٧٢	١٥٧١
المنيا	٣٨٣١	٤٩٧٩	١١٤٨	٤٧٧٠٨١	٤٤١٤٣٠	(٣٥٦٥١)
أسيوط	٢٠٣٨٩	٣١٥٤٨	١١١٦٠	٣٣٨٦٥٩	٣١٦١٧٣	(٢٢٤٨٦)
سوهاج	١٤١٥٥	٢٢٦٠٠	٨٤٤٥	٣٣٦٣٦٦	٢٤٠٩٠٥	(٩٥٤٦١)
قنا	١٨٢٣٦	٢٠٧٥٥	٢٥١٩	٣٦٣٤١٩	٢٨٣٠٦٢	١٩٦٤٣
أسوان	٤٥٤٥	٧٤٣٨	٢٨٩٣	١٠٩٨٣١	٩٤١٠٢	(١٥٧٢٩)
المجموع	٣٤٤٣١٩	٤٢٧٧٨٨	٨٣٤٦٩	٦٥٥٣٨٠٠	٦٥٢٢٩٢٠	٣٠٨٨٠

المصدر: بيانات دراسات التنمية الحضرية (١٩٨٢).

ملحوظة: أرقام التغير الموجودة بين قوسين تعنى النقص فى المساحة.

جدول (٨) : مساحة الأراضى الزراعية والحضرية (بالفدان) فى عامى (١٩٧٢ ، ١٩٧٨) (بالنسبة للمدن الكبرى).

المدينة	المساحة الحضرية		التغير ٧٢ - ٧٨	المساحة الزراعية		التغير ٧٢ - ٧٨
	١٩٧٢	١٩٧٨		١٩٧٢	١٩٧٨	
القاهرة	٢٦٧٨٤	٣٢٢١٧	٥٤٣٣	٥٦٧١	٥٤٥٢	(٢١٩)
الاسكندرية	١٥١٧٩	١٩٦٩٨	٤٥١٩	٣١٠٥٦	٣٣٥٣٢	٢٤٧٦
بورسعيد	٤٧٤٥	٤٩٠٠	١٥٥	٣٠٤	٣٥٢	٤٨
الإسماعيلية	١٠٠٤	١٩٠٢	٨٩٨	٣١٥٠	٢٤٥٢	(٦٩٨)
السويس	١٤١٩	٢٢٨٣	٨٦٤	٢٧٧٩	١٩٨١	(٧٩٨)
شبرا الخيمة	٢٠١٢	٢٦٧٤	٦٦٢	٦٠٨٦	٥٤٧٤	(٦١٢)
بنها	١٢٢٢	١٤٨٦	٢٦٤	٥٧٥٢	٢٦٣٣	(١١٩)
قليوب	٤٩٨	٥٨٦	٨٨	١٨٧٦	١٧٨٣	(٩٣)
الزقازيق	١٣٢٦	٢٠٣١	٧٠٥	١٠٥٣٣	٩٨٣٨	(٦٩٥)
بلبيس	٤٣١	٤٥٥	٢٤	١٨١٢	١٨٠٠	(١٢)
المنصورة	٣١٣٣	٣٧٨٨	٦٥٥	١٢٠٢٤	١١٤١٩	(٦٠٥)
المطرية	٥٠٩	٧٥٩	٢٥٠	٥٤٥	٨٦٤	٣١٩
دمياط	١١٥٥	١٥١٧	٣٦٢	٢٤٥٠	٢٠٩١	(٣٥٩)
شبين الكوم	٩٣١	١٥٠٧	٥٧٦	٥٣٢٦	٤٧٣٦	(٥٩٠)
طنطا	٢٥٠٢	٣٠٧١	٥٦٩	١٠٠٦٧	٩٤٩٣	(٥٧٤)
المحلة الكبرى	٢٣٢١	٢٦١٤	٢٩٣	٦٧٥٧	٦٤٦٠	(٢٩٧)
كفر الشيخ	٨١٧	١٠٥٠	٢٣٣	٢٠٥٧	١٨٢٤	(٢٣٣)
دمنهور	١١٥٥	١٢١٢	٥٧	٣٠٤٣	٣٠٢١	(٢٢)
الجيزة	٨١٢٢	١٠٤٧٤	٢٣٥٢	١٩٩٧٤	١٧٦٥٣	(٢٣٢١)
الفيوم	٧٤٨	٨٩٦	١٤٨	٣٣٥٠	٣١٥٧	(١٩٣)
بنى سويف	٧٩٢	٨٤١	٤٨	٢٧٥٥	٢٦٨٦	(٦٩)
المنيا	١٥١٠	٢١٥٥	٦٤٥	٢٨٦٨٦	٢٨١١٧	(٥٦٩)
ملوى	٣٩٣	٥٠٥	١١٢	٢٩٥٠	٢٨٠٢	(١٤٨)
أسيوط	٥٥٣	٢٠٣٦	١٤٨٣	٦٣٠٠	٤٥٧٤	(١٧٢٦)
أسوان	٣٤٠	٣٧١	٣١	٣١٠	٥٦٦	٢٥٦
المجموع	٧٩٦٠٢	١٠١٠٢٨	٢١٤٢٦	١٧٥٦١٤	١٦٧٧٥٩	٧٨٥٥

المصدر: بيانات دراسات التنمية الحضرية (١٩٨٢).

ملحوظة: أرقام التغير الموجودة بين قوسين تعنى النقص فى المساحة.

ثانيا ـ التجريف وصناعة الطوب:

يقصد بعملية تجريف الأراضى إزالة الطبقة السطحية للأراضى الزراعية التى تعتبر أغنى طبقات قطاع التربة من حيث محتواها من العناصر الغذائية والمادة العضوية بالإضافة إلى ما تحتويه من كائنات دقيقة لها إسهاماتها فى تحديد الخواص الحيوية للأراضى.

وينعكس أثر التجريف على عدم ملاءمة طبقات تحت التربة للإنبات، وانخفاض معدل نمو المحاصيل نتيجة سوء تهويتها، بالإضافة إلى صعوبة خدمة هذه الأراضى؛ إذ يؤدى انخفاض منسوب هذه الأراضى إلى تسرب المياه إليها من الأراضى المجاورة الأعلى منسوبا؛ ومن ثم ارتفاع مستوى الماء بها، وسيادة عوامل تكوين الملوحة والقلوية، وصعوبة التخلص منها، حيث لا تسمح مناسيب الصرف بإقامة شبكات الصرف الحقلى الضرورية للإصلاح. كما تؤدى عمليات التجريف الجائرة التى تصل إلى أكثر من ثلاثة أمتار إلى انتشار ظاهرة الأراضى المعلقة المحاطة بأراضٍ مجرفة؛ حيث يصعب إجراء عمليات الخدمة بها وزراعتها وإمدادها بمياه الرى.

وقد أوضح عبد الوهاب (١٩٩٢) تدهور خواص الأراضى المجرفة بصفة عامة مقارنة بالأراضى الغير مجرفة من خلال دراسته لبعض القطاعات التى تم عملها ببعض المناطق بالبدرشين والتى تعرضت لعمليات تجريف جائرة بلغت ٢ ، ٢,٥ ، ٣ متر من سطح الأرض.

فقد أوضحت البيانات أن إزالة الطبقة السطحية للأراضى أدى إلى:

١ ـ زيادة محتوى الطين بالقطاع وانخفاض قيمة التوصيل الهيدروليكى.

٢ ـ انخفاض قيمة المسامية الكلية .

٣ ـ انخفاض قيمة المادة العضوية مع زيادة هذا الانخفاض بزيادة عمق التجريف.

٤ ـ ارتفاع قيمة الصوديوم المتبادل وظهور بوادر القلوية خاصة فى الأراضى التى جرفت لعمق ٣ متر.

٥ ـ ارتفاع قيمة الأملاح الذائبة وسيادة الصوديوم نظرا لقرب مستوى الماء الأرضى بالأراضى المجرفة بالإضافة الى تراكم مياه صرف الأراضى الغير مجرفة.

٦ ـ انخفاض مستويات العناصر الكبرى والصغرى ماعدا عناصر الحديد والمنجنيز والنحاس.

وعملية تجريف الأراضى عملية غير عكسية من الصعب تصحيح آثارها، كما أن نجاح عملية تجديد الأرض المجرفة وإعادة خصوبتها ترتبط بالتكلفة والجهد والوقت اللازم للقيام بها.

ونظرا لمحدودية الموارد الأرضية فإن الحفاظ عليها يأتى فى المرتبة الأولى لوزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة لتحسين الأراضى؛ وذلك لوقف نزيف التعدى على الأراضى الزراعية، وحماية الرقعة الزراعية من أساليب التبوير المختلفة وما لها من خطورة على الإنتاج الزراعى الذى يمثل حوالى ٣٤٪ من الدخل القومى، وما تعكسه من آثار سيئة اقتصادية واجتماعية على المجتمع بصفة عامة. وللقيام بهذا العمل استصدرت القوانين التالية:

١ ـ إضافة قانون (عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها) لقانون الزراعة رقم ٥٣ لعام ١٩٦٦.

٢ ـ القانون رقم ١١٦ لعام ١٩٨٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٣ لعام ١٩٦٦؛ حيث شمل المواد التى تحظر إقامة المبانى أو المنشآت على الأرض الزراعية والعقوبات المترتبة على ذلك.

٣ ـ القانون رقم ٦٠ لعام ١٩٨٤ الخاص بتنظيم الترخيص بتجريف الأراضى الزراعية لأغراض تحسينها زراعيا والمحافظة عليها. كما يشمل المواد التى تحظر وتنظيم التجريف، وكذلك العلاقة بين أجهزة وزارة الزراعة وأصحاب الأراضى ومصانع الطوب، والعقوبات التى يلزم تطبيقها على المخالفين.

٤ ـ القانون ١٩٥ لعام ١٩٨٥ «قانون» ينظم ويحدد خطوات تطوير مصانع الطوب الأحمر لإنتاج الطوب الطفلى والإسمنتى بالنسبة لأصحاب ومستغلى مصانع وقمائن الطوب القائمة قبل العمل بأحكام القانون ١١٦ لعام ١٩٨٣.

ويوضح جدول (٩) عدد مخالفات البناء على الأرض الزراعية خلال فترة (١٩٧٣ ـ ١٩٨٦)؛ حيث يلاحظ ارتفاع أعدادها بمحافظات الدقهلية والقليوبية والجيزة والفيوم والمنيا وسوهاج إذا قورنت ببقية محافظات الجمهورية. وقد بلغ إجمالى المخالفات ٢٤٠٢٦٧ مخالفة على مستوى الجمهورية؛ مما يعكس خطورة هذا الوضع على الاقتصاد القومى.

جدول (٩): عدد مخالفات البناء على الأرض الزراعية (قدمت للمحاكم للفصل فيها) منذ عام (١٩٧٣ حتى يوليو ١٩٨٦).

	المحافظة	عدد المخالفات		المحافظة	عدد المخالفات
١	الاسكندرية	٤٢٩	١١	القليوبية	٢٦٤٦٦
٢	البحيرة	٥٦٤٤	١٢	القاهرة	١٢١٨
٣	الغربية	١٤٤١٠	١٣	الجيزة	١٧٢٩٢
٤	كفر الشيخ	١٢٣٤٠	١٤	الفيوم	١٧٨٩٤
٥	الدقهلية	٥٠٦٦٨	١٥	بنى سويف	١٣٧٦٥
٦	دمياط	٩٥٧٠	١٦	المنيا	١٨١٣٩
٧	الشرقية	٣٦٣٩	١٧	أسيوط	١٠٦٩٦
٨	الإسماعلية	٨٨	١٨	سوهاج	١٧٤٣٠
٩	السويس	١١٠	١٩	قنا	٩٩٠٦
١٠	المنوفية	٩٧٢٨	٢٠	أسوان	٨٣٥

المصدر: بيانات الهيئة العامة لتحسين الأراضى.

كما يشير جدول (١٠) إلى التطور الحادث فى أعداد القضايا الخاصة بالتجريف وتبوير الأراضى ومصانع الطوب المخالفة، بالإضافة إلى قضايا إقامة قمائن الطوب؛ وذلك فى أعوام (١٩٨٤ حتى عام ١٩٩٠).

ومن جهة أخرى تقوم الهيئة العامة لتحسين الأراضى بدور فعال فى إعادة خصوبة الأراضى المجرفة باستخدام الطمى والأتربة الناتجة من تطهير المجارى المائية. وتلعب الأسمدة العضوية دورا هاما فى هذا المجال، إلى جانب التسويات اللازمة للأراضى

ورفع منسوبها. وتقدر مساحة الأراضى المجرفة لعمق ٥٠ ـ ١٥٠ سم بنحو ٧٠٪ من إجمالى مساحات التجريف تقريبا.

وتقوم أجهزة الهيئة أيضا بمعالجة المشاكل المتعلقة بالأراضى التى تترك بهدف تبويرها وتحويلها إلى أراضٍ للبناء، والعمل على إعادتها إلى حالتها الأولى.

وتنفيذا لأحكام القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ قامت الهيئة بتنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية باستخدام الآلات والمعدات الثقيلة ووسائل النقل. وفى خلال الفترة من عام (١٩٨٥ ـ ١٩٩٠) تم تنفيذ ما يلى:

جدول (١٠) الأنشطة المختلفة لجهاز تحسين الأراضى خلال (١٩٨٥ ـ ١٩٩٠)

حملات التجريف		حملات تبوير		حملات بناء على أرض زراعية		حملات إزالة		عدد الآلات والمعدات ووسائل النقل المضبوطة
المساحة ف	عدد القضايا	المساحة ف	عدد القضايا	المساحة ف	عدد القضايا	المساحة ف	عدد القضايا	
١٦٣٩	٣٨٦٤	١٢٠٠٩	٧٤٤٤	٣٧١٤	٢٣٣٦٠	٧٨٠٦٨	١٣٦٥٤	٣٨٤٢

فقد الأراضي الزراعية بالنحر المائي:

مقدمة:

يتجه نهر النيل من أسوان شمالا حتى مصبه بالبحر المتوسط مخترقا السهل الفيضى الضيق المحدود بالصحراء. وترتفع مياه الفيضان عن مستوى السهل الفيضى فى فترة ما قبل بناء السد العالى، بينما يصل حالياً أقصى منسوب للمياه إلى حوالى ٣ ـ ٥ متر تحت مستوى السهل الفيضى بعد إنشاء السد.

وخلال المسافة بين أسوان والبحر المتوسط ينخفض منسوب نهر النيل حوالى ٨٠ مترا فقط؛ حيث يوصف بالنهر ذى الانحدار البسيط، ويرتبط حجم الحبيبات المترسبة بسرعة مياه النهر.

ويلاحظ ـ بصفة عامة ـ استقامة النهر بطول المجرى ماعدا بعض الأحباس التى تحدث بها بعض الانحناءات لمسافات قصيرة؛ حيث ترتبط الزيادة فى الانحناء بمستوى الانحدار؛ مما يزيد من احتمالات نحر جوانب النهر فى هذه المناطق.

وقد أدى إنشاء السد العالى إلى إحداث تغيرات جوهرية فى سلوك نهر النيل؛ من حيث اختلاف الظروف الهيدرولوجية بالمجرى خلف السد؛ فقد تناقصت تصرفات النهر العالية فى فترة الفيضان وفى كميات الطمى المحمولة التى تحتجز أغلبها أمام السد بالبحيرة.

وقد وصل الاختلاف فى منسوب المياه بالمجرى خلف السد إلى حوالى خمسة أمتار إذا قورن مستواه أيام الفيضان بمستواه الحالى. وطبيعى أن تؤدى هذه الظروف إلى حدوث تغيرات حادة فى نحر جسور النيل.

وقد قام معهد بحوث الآثار الجانبية للسد العالى بمركز البحوث المائية فى عام (١٩٨١) بتسجيل النحر المائى لجسور النيل. وقد تم تحديث هذه البيانات فى عام (١٩٨٨). وتشير هذه البيانات إلى أن طول الجسور المتهايلة بلغ ٥٠٠ كيلو متر قبل إنشاء السد العالى، تناقص إلى حوالى ٣٥١ كيلو متر فى عام (١٩٨٠)، فى حين كان طولها ٢٤٢ كيلو متر فى عام (١٩٨٨)، وهذا الطول حوالى ١٢٪ من الأطوال الكلية لجسور النيل.

ويعزى هذا التناقص فى أطوال الجسور المتهايلة إلى الأعمال الجارية والخاصة بحماية هذه الجسور، والتى تؤدى إلى ضيق المجرى واستقراره، وزيادة نمو الحشائش الطبيعية وبطء سرعته.

ويوضح جدول (١١) أطوال جسور النيل بحالاتها المختلفة بما فيها أطوال الجزر الواقعة بالنيل (خلال الفترة ١٩٥٠ ـ ١٩٨٨).

	١٩٥٠	١٩٨١	١٩٨٨
	بالكيلو متر		
جسور متهايلة Eroded	٥٠٠	٣٥١	٢٤٢
جسور غير متهايلة Non - eroded	١٦٥٢	١٢٤١	١٢٢٤
رؤوس حجرية	١١٣	٢٦٧	٣٠٧
تكسيات	١٤٤	١٨٨	٢٦٠
المجموع	٢٤٠٩	٢٠٤٧	٢٠٣٣

ويلاحظ تناقص أطوال الجسور بعد إنشاء السد العالى؛ نظرا لإطماء المجارى الجانبية والتحامها كليا أو جزئيا بجوانب النهر.

كيفية حدوث النحر المائى للجسور:

النحر المائى للجسور هو إزالة أو انفصال حبيبات التربة المكونة للجسر نتيجة التيارات المائية بالمجرى؛ فاذا زادت قيمة القوى الهيدروليكية للمياه على قيم مقاومة التربة أدى ذلك إلى تحرك الحبيبات وانفصالها. وقد يحدث التهايل أو النحر نتيجة إزالة الحبيبات الغروية للتربة، أو نتيجة تساقط كتل كبيرة من الجسر دفعة واحدة، أو نتيجة ظروف جيوتكنيكية وهيدروليكية أخرى.

وتتحكم فى ميكانيكيا النحر أو التهايل عوامل مختلفة؛ منها ارتفاع الجسر، ودرجة ميله، وخواص التربة المكونة له، وسرعة جريان الماء بالنهر بجوار الجسر، وتتابع الأحداث المتعلقة بها، كما تؤثر فيها كذلك حركة المياه الأرضية، والظروف البيئية.

ومن ناحية أخرى يساعد التذبذب ـ الذى يحدث فى مناسيب المياه خلال شهور السنة ـ على زيادة عمليات النحر المائى ـ كما أن لأسلوب إدارة مياه الرى بالأراضى الزراعية المكونة لجسور النيل دخلا كبيرا فى تحديد حجم هذا النحر.

وتؤدى معرفة عمليات جريان المياه بالأنهار وكيفية تأثيرها فى اتزان المجرى إلى المساعدة فى توصيف العوامل المؤثرة فى ثبات الجسور أو تهايلها.

ونتيجة لتوالى التهايلات بالجسور تفقد مساحات كبيرة من الأراضى ذات قدرة إنتاجية عالية؛ نظرا لخواص تربتها المتكونة من ترسيبات طمى النيل. وتختلف حدة هذه التهايلات من حبس لآخر بالوجه القبلى تبعا للعوامل السابقة الذكر.

ويشترك معهد بحوث الآثار الجانبية للسد العالى مع هيئة المعونة الكندية فى توصيف وتعريف وتنفيذ بعض المشروعات الرائدة لاختبار جدوى حماية جسور النيل؛ وذلك بتطبيق بعض الحلول وتقييمها واختيار الحلول المناسبة لكل منطقة.

وتشير دراسات المخطط الرئيسى لتنمية المياه (١٩٨٤) إلى أن فقد الأراضى الزراعية من خلال أسبابه المختلفة له تأثيراته الاقتصادية الحادة على الدخل القومى لمصر كما يلى:

أولا: يؤثر عامل فقد الأراضى الزراعية بآثاره السلبية فى مدى إسهام برامج الدولة التى تهدف إلى تقليل الفجوة الغذائية؛ فعلى سبيل المثال وبناء على المعدل السنوى للفقد (٤٥ ألف فدان سنويا) تستدعى الحاجة ضرورة استصلاح مايوازى هذه المساحة على الأقل سنويا؛ لتعويض الفقد السنوى الحادث قبل الدخول فى برامج تنمية هذه الأراضى الجديدة. هذا بافتراض تساوى كل من الأراضى الجديدة والقديمة فى مدى إسهامها فى تكوين الدخل القومى برغم الفارق الكبير فى قدرتهما الإنتاجية.

ثانيا: ومن وجهة النظر الاقتصادية فإن فقد ٤٥ ألف فدان سنويا يؤدى إلى تقليل إسهام القطاع الزراعى فى حماية الدخل القومى بما يوازى ١٦,٢٤٥ مليون جنيه سنويا.

ثالثا: يحتاج الأمر إلى تكاليف عالية لتعويض الأراضى المفقودة من حيث التكاليف السنوية لتوفير مياه الرى وتنمية الأراضى الجديدة، بالإضافة إلى التكاليف الواجب توجيهها لتزويد مناطق التوسع العمرانى والصناعى بشبكات مياه الشرب.

الفصل الرابع

الأراضى المتأثرة بالأملاح

obeikandl.com

obeikandl.com

مقدمة:

تعتبر الموارد الأرضية الصالحة للزراعة فى مصر محدودة ـ نسبيا ـ وتعتمد برامج إضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية على الإمكانات المتاحة من المصادر المائية. وبرغم محدودية الأراضى الزراعية فإنها تواجه مشكلة الأراضى المتأثرة بالأملاح والتى تنعكس على قدرتها الإنتاجية وحجم إسهامها فى الدخل القومى.

وقد استأثرت الأراضى المتأثرة بالأملاح بالجانب الأكبر من اهتمامات ودراسات الباحثين بمصر منذ زمن بعيد؛ حيث تناولتها هذه الدراسات تحت الظروف المصرية ذات المناخ الجاف من زوايا عديدة، استهدفت فى مجملها عيوب هذه الأراضى والعوامل المسببة لها. كما تطرقت أيضا تحديد التطبيقات المناسبة لمواجهة هذه المشكلة، والأساليب العملية لرفع إنتاجية هذه الأراضى، والحد من تراكم الأملاح بالقطاع الأرضى.

وباستعراض برامج استصلاح الأراضى فى مصر يلاحظ أن المناطق التى تسودها الأراضى المتأثرة بالأملاح قد حظيت بنسبة عالية نسبيا من استثمارات هذه البرامج مقارنة بمشاكل الأراضى الأخرى.

خواص الأراضي المتأثرة بالأملاح:

فيما يلى أهم الخواص التى تميز هذه الأراضى:

أولا ـ الخواص المورفولوجية :

١ـ **الأراضى الملحية :** تتكون قشرة ملحية على السطح ذات لون داكن، وتكون رطبة فى حالة ارتفاع تركيز كلوريد الكالسيوم والمغنسيوم، وتكون بيضاء أو ذات لون فاتح فى حالة تجمع أملاح كلوريد وكبريتات المغنسيوم. ويتكون مسحوق ناعم فى حالة التركيزات العالية من كلوريد وكبريتات الصوديوم مع الجبس وكربونات الكالسيوم.

٢ـ **الأراضى القلوية :** لون غامق على سطح التربة بسبب ترسيب الدبال والغرويات العضوية. ويشير لون قطاع الأرض الداكن إلى احتمال قرب مستوى الماء الأرضى من السطح.

ثانيا ـ الخواص الطبيعية :

١ـ **الأراضى الملحية :** تتميز بجودة مساميتها. وتنخفض نفاذيتها العالية بمجرد إزالة أملاح التربة بالغسيل، خاصة فى حالة سيادة أيون الصوديوم وغياب الكالسيوم.

٢ـ **الأراضى القلوية :** يؤدى انخفاض الأملاح الكلية مع زيادة الصوديوم المتبادل إلى تفرق حبيباتها وزيادة مرونتها ودرجة التصاقها عندما تكون رطبة، مع تعجنهابشدة وتصلبها عند الجفاف.

ثالثا ـ الخواص الكيماوية :

١ـ **الأراضى الملحية :** يسود فيها الكلوريد، ثم الكبريتات والبيكربونات مع الكالسيوم والمغنسيوم، ثم الصوديوم. ويتواجد البوتاسيوم بكميات قليلة ـ نسبيا ـ ودرجة التوصيل الكهربى لمستخلص عجينة التربة المشبعة أكبر من ٤ ملليموز / سم، ويقل الصوديوم المتبادل عن ١٥ ٪ من مجموع القواعد المتبادلة. قيمة PH أقل من ٨,٥.

٢ـ **الأراضى القلوية :** تتواجد الأيونات السابقة مع زيادة نسبة الصوديوم / مجموع الكالسيوم والمغنسيوم إلى ٢ : ١ . والكربونات الذائبة موجودة فى معظم الأحوال.

وتصل نسبة الصوديوم المتبادل إلى أكثر من ١٥ ٪ من مجموع القواعد المتبادلة، فى حين تزداد قيم PH لى ٨,٥.

وبصفة عامة تعرف الأراضى الملحية غير الصودية بالأراضى القلوية البيضاء؛ نظرا لاحتوائها على الأملاح المتعادلة (أملاح الكلوريدات والكبريتات). كما تعرف الأراضى القلوية غير الملحية بالأراضى القلوية السوداء؛ نظرا لتسميتها باللون الغامق الناتج من ذوبان المادة العضوية وبطء نفاذية الماء بها.

رابعا ـ الخواص الحيوية:

تتمثل الخواص الحيوية للأراضى المتأثرة بالأملاح فى مدى تأثير التركيز العكسى للأملاح، وكذلك نسبة الصوديوم المتبادل بالنسبة لمجموع القواعد المتبادلة على الغطاء النباتى؛ من حيث حالة النباتات النامية وإنتاجيتها. وقد وضعت عدة معايير قسمت على أساسها المحاصيل من حيث مدى تحملها للخواص الكيماوية، والتى تتمثل بصفة أساسية فى تأثير الضغط الآسموزى الناشىء عن تواجد الأملاح الذائبة فى المحلول الأرضى، وما يتبعها من عجز النبات فى مدى القدرة على امتصاص الماء الكافى لعمليات النتح والبخر، فضلا على التأثير السام للأملاح؛ بزيادة تركيزها الكمى والنوعى وعدم التوازن الغذائى للمحاصيل.

وفى الوقت نفسه تؤثر الخواص الكيماوية والطبيعية للأراضى المتأثرة بالأملاح على الجزء الحيوى بالتربة؛ من حيث أعدادها ونوعيتها؛ ومن ثم على مدى كفاءتها فى استكمال العمليات الحيوية المختلفة بالأراضى.

وبصفة عامة تؤثر الخواص السابقة مجتمعة على المحاصيل المنزرعة بهذه الأراضى كما ونوعا؛ وذلك نتيجة الأثر غير المباشر للأملاح، بالإضافة إلى أثرها المباشر الذى يتمثل فى ارتفاع الضغط الآسموزى والتأثير النوعى للأيونات بالمحلول، وسمية بعض العناصر الذى يؤدى إلى ظهور أعراض خاصة على النباتات النامية.

وتتميز هذه الأراضى بانخفاض إنتاجيتها بشكل عام تحت ظروف الزراعة المصرية؛

حيث يقل مدى إسهامها فى الدخل القومى؛ إذ تحتاج إلى معاملات خاصة عند زراعتها، وتزداد تكاليف إنتاج المحاصيل بها مع انخفاض العائد منها.

الأراضي المتأثرة بالأملاح تحت ظروف الزراعة المصرية:

تظهر مشكلة الأراضى المتأثرة بالأملاح كمحصلة لعديد من العوامل السائدة بالزراعة المصرية تختلف تأثيراتها تبعا لمدى سيادتها بالأراضى. وتنحصر معظم هذه العوامل فى مدى كفاءة استخدام مياه الرى، سواء من حيث فواقد النقل بالمجارى المائية، أم على مستوى الحقل وارتباطها بمستوى كفاءة شبكات الصرف، وما يترتب عليه من رفع مستوى الماء الأرض واقترابه من سطح الأرض.

ويرتبط تجمع الأملاح بالأراضى ارتباطا وثيقا بعمق الماء الأرضى وتركيز الأملاح به؛ حيث تتجمع الأملاح بقطاع التربة عن طريق صعود الماء الأرضى إلى السطح بالخاصة الشعرية، يعقبه فقد الماء بالبخر، تاركا محتواه من الأملاح.

وقد تناولت دراسات الباحثين تحديد كل من العمق والتركيز الحرج للماء الأرضى، وكذلك العلاقة بين تركيز الماء الأرضى والأراضى المتكونة؛ من حيث كونها ملحية أو ملحية قلوية.

وتتحول الأراضى الجيدة بصفة عامة إلى أراضٍ ملحية؛ نتيجة الإسراف فى الرى، وغياب الصرف الحقلى؛ ومن ثم ارتفاع مستوى الماء الأرضى، أو استخدام مياه رديئة النوعية فى الرى؛ وهو ما يعبر عنه بالتمليح الثانوى؛ حيث يرتبط ذلك بعدة عوامل منها:

١ ـ تركيز الأملاح فى ماء الرى.

٢ ـ خواص الأراضى الطبيعية والكيميائية.

٣ ـ المناخ السائد (حرارة/ أمطار).

٤ ـ حالة الصرف السائدة بالمنطقة.

ويمارس حاليا تحت الظروف المصرية أسلوب إعادة استخدام مياه الصرف فى توفير الاحتياجات المائية لبعض المناطق، ضمن استراتيجية وزارة الأشغال والموارد المائية، وهذا يستوجب تطبيق نظام التبادل فى استخدام مياه ملحية وأخرى عذبة؛ لتفادى تراكم الأملاح وإزاحتها وخاصة فى منطقة نمو الجذور. وفى تلك الحالة يجب زيادة عدد مرات الرى بالمياه العذبة كلما زاد تركيز الأملاح، ويمثل مشروع ترعة السلام أيضا أحد التطبيقات التى تقوم على أساس خلط المياه العذبة بمياه الصرف فى توفير الاحتياجات المائية للزراعة.

وبالرغم من خلو معظم أراضى الوجه القبلى من الملوحة تتواجد بعض المساحات المتفرقة بهذه المحافظات، تتفاوت تقديراتها تبعا لسيادة العوامل التى تسهم فى وجودها كما سيذكر فيما بعد.

ومن ناحية أخرى تظهر القلوية ببعض المساحات التى تناولتها أعمال الحصر على مستوى الجمهورية؛ حيث أسهمت فى ظهورها عديد من العوامل؛ منها زيادة تركيز أملاح الصوديوم بالتربة، وسيادتها على أملاح الكالسيوم الذائبة، علاوة على وجود الماء الأرضى على أعماق أقل من ١٥٠ سم من السطح؛ نتيجة عدم كفاءة نظام الصرف الحقلى إلى جانب ارتفاع محتواه من أملاح الصوديوم وسيادتها.

وقد ارتبط بناء السد العالى بعدة تغيرات جذرية فى أسلوب الزراعة المصرية، كان أبرزها تحويل نظام الرى الحوضى إلى نظام الرى المستديم؛ وبذلك فقدت أراضى الحياض فرصة الغسيل السنوى للأملاح التى تتراكم بقطاع التربة. وفى الوقت نفسه أدى اتباع أسلوب الرى المستديم فى هذه المناطق والإسراف فى استخدام المياه وعدم مواكبة هذا التحول الجذرى فى أسلوب الرى بالاسراع فى إنشاء شبكات الصرف الحقلى إلى ارتفاع مستوى الماء الأرضى، وظهور مشكلة التمليح الثانوى بهذه الأراضى.

ومن ناحية أخرى تعتبر البحيرات الشمالية مصدرا للأملاح بالأراضى المجاورة لها، سواء عن طريق الغمر خلال بعض الفترات، أم زحف مياهها الملحية ورفع المحتوى الملحى ومنسوب الماء الأرضى.

وقد أشار التقرير (الخاص بالمشكلات الرئيسية التى تواجه زيادة الإنتاجية الزراعية بمصر ـ (١٩٧٦) إلى أن مساحة الأراضى الزراعية المتأثرة بالأملاح فى مصر تبلغ حوالى مليونى فدان فى عام (١٩٦٠)، مع التنبيه إلى خطورة التزايد المستمر فى مساحات هذه الأراضى، وكذلك ارتفاع مستوى الماء الأرضى خلال السنوات العشر التى أعقبت تشغيل السد العالى، وذلك بكل من الأراضى القديمة والجديدة على السواء.

ويرى التقرير أن حوالى ٨٠٪ من الأراضى الزراعية فى مصر ستواجه هذه المشاكل إذا استمرت سيادة هذه الظروف؛ مما يدعو إلى ضرورة وضع بعض المعايير والضوابط لإدارة هذه المياه. وفى هذا الموضوع دعا الفريق المعد لهذا التقرير إلى برنامج شامل لإدارة استخدام المياه فى مصر، يتناول توصيف المشاكل المرتبطة بالأسلوب المتبع حاليا، ووضع الحلول المناسبة وتقييمها.

الأراضي المتأثرة بالمغنسيوم في مصر:

مقدمة:

تنتشر هذه الأراضى بالمناطق الشمالية من غرب الدلتا وشرقها ووسطها، وهى الأراضى المتأثرة بمياه البحر والبحيرات الشمالية. وتأتى أهمية هذه الأراضى نتيجة للجدل الحادث بين الباحثين من حيث تأثير عنصر المغنسيوم فى خواص هذه الأراضى ومدى استجابتها للأساليب المتبعة فى إصلاح الأراضى.

وفى هذا المجال تشير بعض الدراسات إلى أن أيونات كل من المغنسيوم والكالسيوم تتشابه فى فاعليتها من حيث تحسين خواص الأراضى. وعلى العكس من ذلك يشير بعض الباحثين إلى أن أيون المغنسيوم يعمل على تدهور خواص الأراضى؛ حيث يتماثل فى تأثيره مع تأثير الصوديوم.

وتتميز هذه الأراضى ـ بصفة عامة ـ بسيادة عنصر المغنسيوم مجموع القواعد المتبادلة على الطين. ويرى Van and Schylenbergh (١٩٦٧) أن أيونات الكالسيوم

تتحرك من الطبقات السطحية بكثافة تفوق عنصر المغنسيوم الذى يزداد تركيزه فى المحلول الأرضى؛ ومن ثم احتلاله لمواضع التبادل وارتفاع نسبته فى معقد الامتصاص. أما فى حالة تواجد العناصر الثنائية فى المحلول.. فإن المغنسيوم تقل قدرته على التبادل على معدن المونتموريللونيت، بالمقارنة بكل من الكالسيوم والباريوم؛ وعلى هذا فإنه يعتبر ـ من حيث الإحلال ـ أسهل من الكالسيوم المتبادل فى الأراضى القلوية. ويحدد هذا السلوك أسلوب إصلاح الأراضى المتأثرة بالمغنسيوم. وفيما يلى بعض الخصائص التى تسود هذه الأراضى.

أولا ـ مستوى المغنسيوم:

تختلف مستويات عنصر المغنسيوم بالأراضى حسب قربها من المناطق الشمالية للدلتا؛ حيث يصل المغنسيوم الذائب إلى ٥٣,٩ ـ ٦١٥,٢ ملليمكافئ / لتر بالأراضى المحيطة ببحيرة المنزلة، و ١٦٣,٤ ـ ٦٣٠,٤ حول بحيرة البرلس، بينما تصل إلى ٣٨٤,٨ ـ ٥١٠,٣ بالأراضى المجاورة لبحيرة مريوط عند أبيس (حويلة ١٩٧٥).

ويتناقص هذا المستوى بالأراضى المجاورة لمنوف / دمنهور / كفر الدوار / أبيس / إدكو؛ حيث تقع فى مدى ١,١ ـ ٢٤ ملليمكافئ / لتر (بلبع وآخرون) (١٩٧٠). ويتماثل هذا تقريبا مع ماوجده مراد (١٩٧٧) بأراضى كفر الشيخ.

ومن ناحية أخرى بلغت قيم المغنسيوم المتبادل ٢١ ـ ٢٨ ٪ بالأراضى الرسوبية بكفر الشيخ، وترتفع هذه القيم إلى حوالى ٢٨,٤ ـ ٤٩,٦ ٪ بالأراضى القريبة من الحامول وبلطيم ورشيد والمنزلة ومريوط (عبد المجيد) (١٩٧٨).

ويرى خضر والجبلى (١٩٥٥) أن محتوى الأراضى من المغنسيوم المتبادل يتأثر بعدة عوامل؛ منها قوام التربة؛ حيث ينخفض هذا المحتوى بزيادة خشونة التربة، كما يقل أيضا مستواه بزيادة الحموضة.

ثانيا ـ الخواص الطبيعية :

تشير معظم الدراسات إلى أن لعنصر المغنسيوم تأثيره الواضح فى تشجيع البناء الأرض وثباته ؛ حيث يتماثل فى ذلك مع عنصر الكالسيوم. ويتحكم مستوى المغنسيوم فى مدى تأثيره على هذه الخاصية؛ حيث أوضح ميلاد وآخرون (١٩٧٤) أن التركيزات المنخفضة من هذا العنصر تسبب هدم البناء الأرضى، فى حين تؤدى زيادة التركيز إلى زيادة قيم معامل البناء.

وتوضح الدراسات وجود ارتباط معنوى بين كل من الكالسيوم والمغنسيوم المتبادلين والتجمعات الأرضية الثابتة (أحمد وآخرون ١٩٦٩)، فى حين يقرر الهادى (١٩٧٣) أن الكالسيوم المتبادل يشجع تكوين وتطوير التجمعات الأرضية بدرجة أكبر من كل من المغنسيوم والأيدروجين.

وترتبط النفاذية بالبناء الأرضى؛ ومن ثم تتأثر قيمها بنفس العوامل المؤثرة على البناء الأرضى. ويتشابه كل من عنصرى الكالسيوم والمغنسيوم فى تحسين معدل النفاذية، مع اختلافهما النسبى فى حجم هذا التأثير.

وعلى العكس من ذلك توضح دراسات Antipov & Hamaeva(١٩٥٨) أن زيادة المغنسيوم المتبادل يزيد من تفرقة حبيبات الطين وخاصية التمدد والانكماش، بالمقارنة بعنصر الكالسيوم.

كما أشار Thorne & Peterson(١٩٥٤) إلى أن المغنسيوم المتبادل يعمل على تدهور النفاذية، خاصة فى أراضى المناطق الجافة المحتوية على مستويات عالية من المغنسيوم المتبادل.

ويعمل عنصر الكالسيوم على تجميع الدبال، فى حين يساعد على تفرقته كل من عنصرى المغنسيوم والصوديوم. هذا بالإضافة إلى أن إحلال الكالسيوم محل الصوديوم المتبادل يحسن خاصية النفاذية بالمقارنة بعنصر المغنسيوم.

ومما يجدر ذكره أن الخواص الطبيعية للأراضى المتأثرة بالمغنسيوم تناولتها بشيء من التفصيل دراسات حويلة (١٩٨٢)؛ حيث أوضح أن تأثير المغنسيوم المتبادل على كل من النفاذية فى المعمل والتجمعات الكلية الثابتة فى الماء تكون معقدة جدا تحت الظروف الحقلية؛ وذلك لتداخل أكثر من عامل خلاف المغنسيوم المتبادل.

وقد أشارت الدراسة إلى أن نسبة تأثير كل من الطين، والأملاح الكلية الذائبة على النفاذية تبلغ (١٤,٢١ ٪، ٣٧,٤٢ ٪ على الترتيب. فى حين يشكل إسهام كل من الكالسيوم والمغنسيوم والصوديوم المتبادل وبعض العوامل الأخرى حوالى ٤٨ ٪. وعلى هذا الأساس تزداد قيم النفاذية والنسبة المئوية للتجمعات الكلية الثابتة فى الماء فى حالة الأراضى غير المتأثرة بالمغنسيوم عند مقاونتها بالأراضى المتأثرة بهذا العنصر.

ثالثا ـ الخواص المنرالوجية للأراضى:

يتشابه كل من الطين الناعم والخشن بكل من الأراضى المتأثرة وغير المتأثرة بعنصر المغنسيوم؛ من حيث وجود معادن طين المونتموريللونيت والفيرميكوليت والميكا والكلوريت والكاؤولينيت، بجانب بعض معادن السليكات غير الطبقية كالكوارتز والفلسبارات. ومن جهة أخرى ترتفع نسب الكاؤولينيت والميكا والفيرميكوليت والفلسبارات والكوارتز فى الطين الخشن إذا ما قورنت بمحتوى الطين الناعم منها، وذلك فى كل من الأراضى المتأثرة وغير المتأثرة بعنصر المغنسيوم.

وجدير بالذكر أن معدن المونتموريللونيت يأخذ اتجاها معينا؛ من حيث ارتفاع محتوى الطين الناعم منه فى الأراضى المتأثرة بالمغنسيوم عنه فى الأراضى غير المتأثرة.

رابعا ـ إصلاح الأراضى القلوية المغنسية:

تؤدى إضافة الجبس إلى خفض المغنسيوم المتبادل. كما أن إضافة المادة العضوية تزيد من فاعلية الكالسيوم، مع العناية بتوفير أسلوب الصرف المناسب الفعال.

وبصفة عامة تعرضت الزراعة المصرية لعديد من العوامل أسهمت فى تحديد مدى انتشار الأراضى المتأثرة بالأملاح، وهى:

١ ـ انتهاء العمر الافتراضى لشبكات الصرف المغطى فى بعض المناطق وانعدام أو انخفاض كفاءة أعمال صيانتها.

٢ ـ اشتراك مساحات الأرز مع المحاصيل الصيفية فى نظام صرف واحد.

٣ ـ الإسراف فى مياه الرى، وانخفاض كفاءة استخدامها.

٤ ـ تكوين طبقات صماء تحت التربة على أعماق ١٥ ـ ٢٥ سم من سطح الأرض.

٥ ـ اتباع أسلوب التكثيف الزراعى؛ ومن ثم زيادة كميات مياه الرى المضافة إلى وحدة المساحة.

٦ ـ اتباع أسلوب الرى السطحى بالأراضى الجديدة.

٧ ـ انعدام أو إهمال العمليات الزراعية التى تسهم فى تحسين خواص الأراضى.

٨ ـ سوء توزيع مياه الرى وظهور مشاكل الرى بنهايات الترع.

٩ ـ إعادة استخدام المياه الرديئة النوعية؛ طبقا لاستراتيجية وزارة الرى وضرورة وضع ضوابط استخدامها.

١٠ ـ الاتجاه الحالى نحو استخدام معدلات عالية من الأسمدة الكيماوية؛ نتيجة استخدام الأصناف العالية الإنتاج، وزيادة المساحة المحصولية.

الحصر التصنيفي للأراضي (١٩٥٧ ـ ١٩٧٣) والأراضي المتأثرة بالإملاح في مصر.

تعتبر دراسات الحصر التصنيفى للأراضى (معهد بحوث الأراضى والمياه) القاعدة الرئيسية للبيانات الخاصة بمشاكل الأراضى المصرية، وتتخذ ـ حاليا ـ مرجعا أساسيا لتتبع التغيرات فى خواصها وقدرتها الإنتاجية؛ من خلال الاتجاهات التى تظهرها نتائج دراسات الحصر لبعض المناطق فى الوقت الحاضر. وفى الوقت نفسه أوضحت بيانات هذه القاعدة حجم مشكلة تدهور الأراضى المصرية التى أُرجعت بصفة أساسية إلى مدى تأثرها بالأملاح نتيجة الظروف السائدة؛ فقد وجد أن حوالى ٦٠٪ من

جملة الأراضى المزروعة بالوجه البحرى فقط تندرج تحت الأراضى المتوسطة الإنتاج والضعيفة الإنتاج من درجتى القدرة الإنتاجية الثالثة والرابعة، والتى على أساسها تم التخطيط لمشروعات تحسين هذه الأراضى على المستوى القومى.

وقد تضمنت دراسات الحصر التصنيفى تقدير الخواص الطبيعية والكيميائية لأراضى كل محافظة، وتصنيفها حسب درجات الملوحة والقلوية بطول القطاع أو الطبقات المكونة له، وكذلك العوامل المسببة لمشاكل الأراضى المتأثرة بالأملاح.

وباستعراض نتائج الحصر التصنيفى يمكن ـ بصفة عامة ـ القول بأن معظم الأراضى الواقعة جنوب الدلتا تعتبر أراضى عادية الملوحة؛ حيث تنخفض درجة التوصيل الكهربى فى مستخلص عجينة التربة المشبعة عن ٤ ملليموز / سم على درجة ٢٥°م بطول القطاع. وتتخلل هذه الأراضى قطع متناثرة ذات درجات ملوحة متوسطة ومرتفعة؛ نتيجة سيادة العوامل المسببة لها.

وتزداد مشكلة الأراضى المتأثرة بالأملاح حدة بالاقتراب شمالا من ساحل البحر المتوسط والبحيرات، وانخفاض مستوى الأراضى الزراعية بالنسبة لمستوى سطح البحر، وتداخل مياه البحر؛ مما يتسبب فى وجود الماء الأرضى بالقرب من السطح مع شدة ملوحته. وفى الوقت نفسه يلاحظ خلو معظم أراضى الوجه القبلى من الملوحة، مع وجود مساحات متفرقة بمحافظات الوجه القبلى؛ حيث تختلف فيما بينها فى مدى سيادة العوامل المسببة لها كما سيذكر فيما بعد فى حالة كل محافظة.

أما من حيث قلوية الأراضى فيلاحظ انتشارها فى بعض المساحات نتيجة العوامل التالية:

١ ـ زيادة تركيز أملاح الصوديوم بالتربة وسيادتها على أملاح الكالسيوم الذائبة.

٢ ـ وجود مستوى الماء الأرضى على عمق أقل من ١٥٠ سم من السطح؛ نتيجة عدم كفاءة نظام الصرف الحقلى، واحتواء الماء الأرضى على أملاح الصوديوم السائدة، وكذلك كربونات الصوديوم المتبقية.

٣ ـ الإسراف فى الرى مع عدم كفاية الصرف فى حالة الأراضى التى تروى بالراحة.

٤ ـ سيادة حبيبات الطين ووجودها فى حالة بناء منشورى أو كتلى كبير الحجم متلاحم قليل المسامية؛ مما يسبب سوء نفاذية التربة.

وتوضح بيانات الحصر التصنيفى الوضع السائد بالمحافظات المختلفة خلال الفترة التى أجريت خلالها دراسات الحصر؛ حيث تختلف المحافظات فيما بينها فى مدى انتشار الأراضى المتأثرة بالأملاح، وارتباطها بالظروف التى تسهم فى ظهورها كما يلى:

أولا ـ محافظات الدلتا:

محافظة القليوبية:

غالبية أراضى المحافظة بها نسبة عادية من الملوحة، مع وجود مساحات متفرقة ذات ملوحة متوسطة وعالية. ويسود كاتيون الصوديوم الكاتيونات الأخرى، ولا تقل قيم الكالسيوم عن $\frac{1}{4}$ قيم الصوديوم، فى حين تزداد أرقام الكلور عن الصوديوم؛ مما يسهل التخلص منه بالغسيل والصرف الجيد.

وتخلو معظم أراضى المحافظة من القلوية بطول قطاع التربة ما عدا بعض المساحات المتفرقة. وتتواجد الأراضى المتأثرة بالأملاح بأراضى المحافظة فى المناطق التى تقل بها كفاءة الصرف الحقلى، كما أن ارتفاع منسوب بعض الترع والمصارف العمومية عن منسوب الأراضى يؤدى إلى رفع مستوى الماء الأرضى، وزيادة المحتوى الملحى للأراضى.

محافظة المنوفية:

غالبية أراضى المحافظة عادية الملوحة بطول قطاع التربة، مع وجود مساحات صغيرة متفرقة ترتفع بها الأملاح الذائبة بدرجة متوسطة أو مرتفعةأو شديدة الملوحة. وتقع هذه الأراضى المتأثرة بالأملاح بالمناطق المحرومة من شبكات الصرف الحقلى.

obeikandl.com

ويسود الصوديوم الذائب باقى الكاتيونات الأخرى فى معظم أراضى المحافظة، فى حين تصل قيم الكالسيوم الذائب إلى حوالى ٢٥ ٪ من نسبة كاتيون الصوديوم أو تزيد قليلا؛ مما يشير إلى توفر عنصر الكالسيوم الذى يسهم فى عدم تدهور خواص التربة، ويمنع ظهور القلوية، وتقل قيم المغنسيوم الذائب نوعا ما أو تقترب من قيم الكالسيوم.

وتشير التحليلات إلى خلو معظم أراضى محافظة المنوفية من القلوية بالطبقة السطحية أو بطول قطاع التربة، فى حين تظهر القلوية فى بعض المساحات المتفرقة وخاصة فى الطبقة السطحية. ونظرا لاحتواء بعض الأراضى التى ظهرت بها القلوية على قيم عالية من الكالسيوم الذائب.. فإنها لاتحتاج إلى جبس زراعى فى عمليات إصلاحها؛ حيث يكتفى بتوفير نظام صرف كاف، مع العناية بالعمليات الزراعية والتسميد العضوى.

محافظة الغربية:

غالبية أراضى المحافظة تعتبر عادية الملوحة بطول القطاع. وتتواجد مساحات متفرقة بالمحافظة متوسطة الملوحة وعالية الملوحة، ترجع أساسا إلى عدم كفاية الصرف الحقلى على أبعاد وأعماق مناسبة، علاوة على انخفاض مستوى هذه الأراضى عن الأراضى المجاورة. ويؤدى رشح مياه الترع الرئيسية إلى ارتفاع مستوى الماء الأرضى بها.

وتشير تحليلات الأراضى إلى أنه فى حالةالأراضى المرتفعة الملوحة يزداد تركيز الأملاح بالطبقة السطحية عن باقى القطاع. ويلاحظ سيادة عنصر الصوديوم بمستخلصات التربة بصفة عامة، كما تزداد قيم الكلور فى المناطق المرتفعة الملوحة.

أما من حيث انتشار ظاهرة القلوية بأراضى المحافظة.. فنجد أن معظم أراضيها خالية من القلوية بطول قطاع التربة، فى حين نجد أن مساحات كبيرة من الأراضى المتأثرة بالقلوية تتميز بخلو الطبقة السطحية منها، مع ظهورها فى الطبقات التحتية فقط.

وتتماثل عوامل تكوين القلوية فى أراضى المحافظة مع العوامل التى ذكرت سابقا، مع الإشارة إلى أن الإسراف فى الرى وانخفاض كفاءة كل من الرى الحقلى ونظام الصرف من العوامل التى تسرع فى ظهور القلوية بالأراضى الطينية.

محافظة كفر الشيخ:

تسود أراضى محافظة كفر الشيخ عديد من العوامل تسهم بدرجة كبيرة فى زيادة المحتوى الملحى للأراضى. وتتلخص هذه العوامل فيما يلى:

١ ـ غالبية الأراضى المتأثرة بالملوحة كانت مغمورة بمياه بحيرة البرلس؛ حيث تم ترسيب وتزهر الأملاح بعد انحسار المياه.

٢ ـ ارتفاع مستوى الماء الأرضى الشديد الملوحة بمساحات كبيرة من الأراضى، وتعرض الأراضى للجفاف وتزهر الأملاح.

٣ ـ عدم توفر الصرف الحقلى الكافى العميق خاصة فى الأراضى المجاورة لبحيرة البرلس.

٤ ـ قلة مياه الرى اللازمة للغسيل فى المناطق الحديثة الاستصلاح الواقعة بالمناطق الشمالية.

ويسود عنصر الصوديوم الذائب بقية العناصر، فى حين ترتفع قيم المغنسيوم الذائب بالنسبة لعنصر الكالسيوم فى الأراضى المجاورة للبحيرة.

وتتواجد الأراضى العادية الملوحة بالأجزاء الجنوبية بالمحافظة. وتزداد المساحات المتأثرة بالملوحة كلما اتجهنا شمالا. وتقع الأراضى الشديدة الملوحة شمالى مصرف المحيط، وكذلك الأراضى الواقعة فى نهايات الترع الرئيسية التى لا تتوافر بها مياه الرى اللازمة للغسيل.

أما من حيث القلوية فيلاحظ خلو الجزء الجنوبى بالمحافظة منها؛ نظرا لكفاءة نظام الرى والصرف بها، فى حين تتواجد المساحات المتأثرة بالقلوية على جانبى مصرف المحيط ومصرف ١١، علاوة على مساحات كبيرة متفرقة بمراكز بيلا وسيدى سالم وفوة.

محافظة دمياط:

تتماثل ظروف أراضى محافظة دمياط مع ما سبق ذكره فى محافظة كفر الشيخ بخصوص تعرض المناطق الشمالية للغمر بمياه البحيرات الشمالية، وكذلك ارتفاع مستوى الماء الأرضى الشديد الملوحة فى معظم أراضى المحافظة. هذا بالإضافة إلى عدم توفر الصرف الحقلى الكافى والعميق، وقلة مياه الرى اللازمة لعمليات الغسيل. وهذه الظروف مجتمعة أدت إلى سيادة الأراضى المتأثرة بالأملاح بها.

ومن جهة أخرى فقد أظهرت التحليلات ظهور القلوية فى معظم أراضى المحافظة، فيما عدا مساحات كبيرة من الأراضى الواقعة بالجزء الجنوبى من مركز دمياط والأراضى المجاورة لنهر النيل بمركز فارسكور. وتتدرج القلوية من متوسطة بطول قطاع التربة إلى قلوية شديدة. ويرجع ظهورها إلى مستوى الماء الأرضى المرتفع، وعدم كفاية الصرف الحقلى، وانخفاض منسوب الأراضى وسيادة عنصر الصوديوم، بالإضافة إلى أحد العوامل الهامة؛ وهو عدم عناية الزراع بالخدمة الزراعية السليمة؛ من حيث الحرث العميق، والرى، والتسميد العضوى.

محافظة الدقهلية:

توجد مساحات كبيرة نسبيا ذات ملوحة مرتفعة جدا مجاورة لبحيرة المنزلة، وكذلك فى الأراضى الواقعة فى الشمال الغربى من المحافظة بمركز بلقاس. كما تنتشر مساحات متفرقة من الأراضى العادية الملوحة والمتوسطة الملوحة.

وقد أوضحت تحليلات قطاعات التربة تزايد الملوحة كلما زاد العمق فى حالة الأراضى العادية الملوحة والمتوسطة الملوحة، فى حين يزداد تركيز الأملاح بالطبقة السطحية للأراضى المرتفعة الملوحة.

ويسود عنصر الصوديوم محاليل التربة، مع تواجد عنصر الكالسيوم فى معظم الأراضى بالمحافظة بنسبة مقبولة تسهم فى عدم تدهور خواص التربة. وفى الوقت نفسه تشير التحليلات إلى أن غالبية أملاح الصوديوم تتواجد فى صورة كلوريد؛ مما يسهل التخلص منه بالغسيل.

وتقترب قيم عنصر المغنسيوم فى معظم أراضى المحافظة من قيم عنصر الكالسيوم، وتزداد فى حالة الأراضى المجاورة لبحيرة المنزلة.

ويعزى ارتفاع تركيز الأملاح بالأراضى إلى سوء الصرف الحقلى، وارتفاع مستوى الماء الأرضى، قلة نفاذية التربة. كما تشكل بحيرة المنزلة أحد العوامل الهامة فى زيادة الأملاح.

ومن حيث القلوية نجد أن معظم أراضى المحافظة يخلو قطاع تربتها من القلوية، فى حين تحتاج بعض المساحات المتأثرة إلى إضافات جبسية؛ وذلك لوجود قلوية بالطبقات السطحية فى حالة بعض الأراضى أو بطول القطاع. وتتركز هذه الأراضى بمساحات كبيرة فى مركزى المنزلة والسنبلاوين.

محافظة الشرقية:

غالبية أراضى المحافظة عادية الملوحة بالطبقة السطحية وبطول القطاع، ويمكن صيانتها بزيادة كفاءة الصرف الحقلى من حيث مسافاتها وأعماقها، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الغسيلية. ومن ناحية أخرى تتركز الأراضى المتوسطة الملوحة فى شمال المحافظة؛ نظرا لسوء حالة الصرف الحقلى بها. كما توجد مساحات متفرقة بالجهة الشمالية والشمالية الشرقية من زمام المحافظة ترتفع بها درجة الملوحة.

وتشير تحليلات الأراضى إلى سيادة كاتيون الصوديوم، فى حين تقل قيم الكلور عن قيم الصوديوم فى كثير من الأراضى العادية الملوحة والمتوسطة الملوحة؛ مما يشير إلى أن الصوديوم يتواجد بعضه فى صورة كبريتات. ويتواجد عنصر الكالسيوم الذائب بكميات أكبر من ربع قيم الصوديوم الذائب؛ مما يشير إلى احتمال وجود كبريتات الكالسيوم.

وتتماثل العوامل المسببة للملوحة مع ما سبق ذكره فى المحافظات الأخرى، مع ضرورة الإشارة إلى أن الإهمال فى خدمة الأراضى وعدم إتمام استصلاح الأراضى الحديثة من العوامل الهامة فى انتشار الأراضى المتأثرة بالأملاح.

وتخلو معظم أراضى المحافظة من القلوية، سواء بطول قطاع التربة أم فى الطبقة السطحية، فى حين أوضحت نتائج التحليل الكيماوى ظهور القلوية بالطبقات السفلى، وكذلك بطول القطاع فى بعض الأراضى المنتشرة بمراكز فاقوس والحسينية ومنيا القمح.

محافظة البحيرة:

يسود عنصر الصوديوم الذائب بقية العناصر الأخرى؛ حيث يتواجد على صورة كلوريد فى غالبية أراضى المحافظة ماعدا الأراضى الجيرية التى يسود بها عنصر الكالسيوم، فى حين يرتفع نسبة المغنسيوم الذائب فى المناطق الشمالية والقريبة من ساحل البحر المتوسط.

وتعزى أسباب ملوحة أراضى المحافظة إلى غمرها بمياه البحر والبحيرات حتى وقت قريب. هذا إلى جانب ارتفاع مستوى الماء الأرضى الشديد الملوحة، وعدم كفاية الصرف الحقلى، وارتفاع منسوب المياه بالمصارف العمومية، وانخفاض مستوى الأراضى الزراعية فى بعض المناطق.

وتتواجد الأراضى العادية الملوحة بالقرب من فرع رشيد وعلى امتداده من الجنوب إلى الشمال. أما الأراضى المتوسطة الملوحة فتقع غالبيتها فى الجزء الشمالى من المحافظة. وتتواجد الأراضى الشديدة الملوحة فى المناطق البور والحديثة الاستصلاح بشمالى المحافظة.

ولا تظهر القلوية بالأراضى التى يتوافر بها الكالسيوم الذائب كما فى غالبية أراضى مركز أبو المطامير وكفر الدوار وحوش عيسى. فى حين تتواجد القلوية ببعض الأراضى فى طبقاتها السفلى من القطاع، وهذه تحتاج إلى عمليات الغسيل دون إضافة جبس زراعى نتيجة توفر عنصر الكالسيوم الذائب.

وهناك مساحات متفرقة بها قلوية شديدة تقع غالبيتها فى أراضى مركز دمنهور ورشيد وكوم حمادة، تعزى إلى سيادة عنصر الصوديوم، وانخفاض الكالسيوم الذائب تحت ظروف عدم كفاءة الصرف الحقلى وإهمال العمليات الزراعية.

ثانيا ـ محافظات الوجه القبلى:

١ـ محافظة الجيزة:

أدى عدم كفاية مياه الرى وسوء توزيعها ومشاكل نهايات الترع ـ إلى جانب سوء الصرف الحقلى، وارتفاع مستوى الماء الأرضى ـ إلى ظهور الملوحة فى مناطق بسيطة متفرقة بالمحافظة بمستويات متوسطة ومرتفعة، فى حين أظهرت نتائج الحصر التصنيفى أن غالبية أراضى المحافظة ذات ملوحة عادية بطول القطاع.

ويسود عنصر الصوديوم الذائب بقية الكاتيونات فى حالة زيادة ملوحة التربة، مع تواجد الكالسيوم الذائب بنسبة لا تقل عن ٢٥ ٪ من قيم الصوديوم الذائب، فى حين يقترب محتوى الأراضى من عنصر المغنسيوم الذائب من قيم الكالسيوم فى الأراضى العادية الملوحة، ويقل عنه كلما زادت درجة ملوحة التربة. وتخلو غالبية أراضى المحافظة من القلوية بطول قطاع التربة، مع تواجد مساحات متفرقة قلوية بالطبقة السفلى أو بطول قطاع التربة؛ نظرا لسوء الصرف الحقلى، وارتفاع مستوى الماء الأرض، وسيادة عنصر الصوديوم.

٢ ـ محافظة بني سويف:

أدت عوامل انخفاض كفاءة الصرف الحقلى وارتفاع مستوى الماء الأرضى الشديد الملوحة إلى تراكم الأملاح بالطبقات السطحية. ويسهم رشح المياه من الترع والمصارف (المرتفعة المنسوب عن الأراضى الزراعية المجاورة) فى رفع مستوى الماء الأرض وزيادة ملوحته؛ ومن ثم تأثر الأراضى بالأملاح (كما هو حادث بالأراضى المجاورة لمصارف محيط بنى سويف ومصرف المحيط الغربى). كما يؤدى ترك الأراضى بورا دون زراعة إلى تمليحها.

وتشير نتائج الحصر إلى أن غالبية أراضى المحافظة عادية الملوحة. ويجب العناية بالصرف الحقلى من حيث المسافات والأعماق؛ وذلك لصيانة هذه الأراضى وعدم تدهورها. ومن ناحية أخرى تنتشر مساحات بسيطة من الأراضى المتوسطة والمرتفعة

الملوحة بالطبقة السطحية أو بطول قطاع التربة. وتتواجد الأراضى ذات النسبة المرتفعة جدا من الأملاح فى مساحات بسيطة ضعيفة ومحدودة القدرة الإنتاجية.

وتشير التحليلات الكيماوية إلى سيادة عنصر الصوديوم الذائب. كما يوجد عنصر الكالسيوم بوفرة فى مستخلص التربة خاصة فى المناطق المجاورة للصحراء. وبصفة عامة تعتبر أراضى المحافظة غنية بأملاح الكالسيوم؛ حيث لا تقل عن ٢٥٪ من قيم الصوديوم الذائب.

وتخلو أراضى المحافظة تقريبا من القلوية بطول قطاع التربة، فى حين تتواجد قلوية متوسطة فى بعض المناطق، يمكن الاقتصار فى علاجها على تحسين حالة الصرف الحقلى دون الحاجة إلى إضافات جبسية. وفى الوقت نفسه توجد بعض المساحات المتناثرة ذات القلوية الشديدة بطول القطاع تحتاج إلى إضافات جبسية لعلاجها.

٣ـ محافظة الفيوم:

يسود ظاهرة ارتفاع مستوى الماء الأرضى معظم أراضى المحافظة وإن اختلفت مراكز المحافظة فيما بينها فى مدى سيادة هذه الظاهرة. وتشير بيانات الحصر إلى انخفاض مساحات الأراضى التى يكون مستوى الماء الأرضى فيها بعيداً. ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى الإسراف فى استخدام المياه بالنسبة للمزارعين عند بدايات الترع وانخفاض كفاءة شبكة الصرف، علاوة على التفاوت الكبير فى مناسيب هذه الأراضى. وينعكس هذا كله على مساحات الأراضى المتأثرة بالملوحة.

٤ـ محافظة المنيا:

غالبية أراضى المحافظة ذات ملوحة عادية، مع وجود مساحات بسيطة متفرقة متوسطة الملوحة، تتركز بين ترعة الإبراهيمية وبحر يوسف فى مراكز مغاغة وبنى مزار وملوى ودير مواس. وهذه المساحات محرومة من نظم الصرف أو انخفاض كفاءته.

كما تتواجد بعض الأراضى المرتفعة الملوحة بالمناطق السابقة، وكذلك فى بعض المساحات الواقعة غربى بحر يوسف.

ويتواجدعنصر الكالسيوم الذائب فى غالبية أراضى المحافظة بنسب كافية تزيد على ٢٥ ٪ من قيم الصوديوم الذائب؛ مما يقلل من احتمالات تكون القلوية، وخاصة بالأراضى المنخفضة الملوحة.

ويعتبر أغلب زمام المحافظة خالياً من القلوية، فى حين تظهر فى الطبقات التحتية فى مساحات متناثرة بمراكز سمالوط وأبو قرقاص ودير مواس.

وتتواجد بعض المساحات القلوية التى تحتاج فقط إلى عمليات تحسين ورفع كفاءة الصرف دون إضافات جبسية، وذلك فى المناطق المحصورة بين ترعة الإبراهيمية وبحر يوسف بمراكز ملوى ودير مواس. أما الأراضى القلوية التى تحتاج إلى إضافات جبسية فتتواجد بمساحات متناثرة بين ترعة الإبراهيمية وبحر يوسف بمراكز ملوى وديرمواس، وكذلك بين ترعة الإبراهيمية ومصرف المحيط بالنصف الجنوبى من مركز المنيا.

٥ ـ محافظة اسيوط:

معظم أراضى المحافظة عادية الملوحة بطول قطاع التربة، مع وجود مساحات متوسطة ومرتفعة الملوحة فى مراكز ديروط والقوصية وأبنوب وصدفا. أما الأراضى المرتفعة الملوحة جدا.. فتتركز فى مساحات متناثرة بالجزء الشرقى من مركز أبنوب والجزء الغربى من مركزى ديروط والقوصية.

ويتواجد عنصر الصوديوم فى صورة كلوريد وكبريتات بغالبية أراضى المحافظة؛ نظرا لانخفاض قيم الكلور عن قيم الصوديوم. أما فى الأراضى المرتفعة الملوحة فيتواجد فى صورة كلوريد؛ إذ تتساوى تقريبا قيم الصوديوم والكلور.

وتتماثل عوامل تكوين الملوحة بأراضى المحافظة مع المحافظات الأخرى. وهذه العوامل تنحصر فى عدم كفاءة الصرف الحقلى، والرشح من المجارى المائية، وعدم كفاية الرى خاصة فى نهايات الترع. وغالبية أراضى المحافظة خالية من القلوية، مع وجود مساحات متناثرة ومتفرقة متأثرة بالقلوية فى طبقاتها التحتية فى مراكز ديروط والقوصية وأبنوب.

وجميع مراكز المحافظة ـ ماعدا مركز صدفا ـ تتواجد بها مساحات متناثرة ذات قلوية بالطبقة السطحية أو بطول القطاع تحتاج فى إصلاحها إلى إضافات جبسية.

٦ ـ محافظة سوهاج:

معظم أراضى المحافظة عادية الملوحة، مع وجود مساحات متناثرة من الأراضى متوسطة الملوحة فى مركزى المنشأة وجرجا، ولا توجد إطلاقا فى مركز المراغة.

أما الأراضى المرتفعة الملوحة فتتركز معظمها فى مساحات بسيطة بالأراضى الضعيفة الإنتاجية بمركزى جرجا والمنشأة، علاوة على الأراضى الموجودة بالحدود الغربية الملاصقة للصحراء الغربية.

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من عوامل تكوين الملوحة بالأراضى نجد أن بعض المساحات بالمحافظة يتم ريها بمياه ارتوازية ذات نسبة مرتفعة من الأملاح، مع غياب نظام الصرف الكافى؛ مما يسبب تراكم الأملاح بالتربة.

أما من حيث القلوية فتشير تحليلات الأراضى إلى عدم وجود القلوية بغالبية أراضى المحافظة؛ حيث ترتفع بها قيم عنصر الكالسيوم، مع عدم سيادة الصوديوم الذائب فى محلول التربة.

وتتواجد بعض المساحات البسيطة بمركزى جرجا والمنشأة بها قلوية بالطبقات التحتية فقط، فى حين تنتشر القلوية بطول قطاع التربة بمساحات متفرقة بسيطة بمراكز اخميم وأولاد طوق وطما وساقلته.

٧ ـ محافظة قنا:

غالبية أراضى المحافظة عادية الملوحة بطول القطاع، مع تواجد مساحات بسيطة متفرقة عادية الملوحة بالطبقة السطحية، ومتوسطة الملوحة أو مرتفعة الملوحة بالطبقات التحتية بمراكز المحافظة بالمناطق المنخفضة الإنتاجية. وتخلو أراضى المحافظة تقريبا من القلوية، فيما عدا مساحات بسيطة تظهر بها القلوية بالطبقات التحتية أو بطول القطاع فى مراكز: إسنا ـ نجع حمادى ـ دشنا ـ قنا ـ قوص ـ أبو طشت ـ الأقصر.

٨ ـ محافظة أسوان:

غالبية أراضى المحافظة عادية الملوحة بطول القطاع، مع ظهور ملوحة متوسطة بالطبقات التحتية فقط فى مساحات بسيطة ومتفرقة، تتركز فى الأراضى المتاخمة للجبل الشرقى والغربى، وكذلك فى مساحات متفرقة بوسط الوادى الغربى.

ومن ضمن العوامل التى أسهمت فى تكوين الملوحة بالأراضى خشونة قوام بعض المساحات نتيجة تجريف السيول من الجبال المحيطة بها.

وقد قسمت أراضى المحافظة ـ حسب حالة القلوية ـ إلى أراضٍ خالية من القلوية بطول قطاع التربة، وتشمل غالبية أراضى المحافظة، فى حين تظهر القلوية بالطبقات التحتية أو بطول القطاع فى مساحات متناثرة ومتفرقة من زمام مراكز المحافظة، وخاصة مركز كوم أمبو.

التغيرات الحادثة في حالة الأراضي المتأثرة بالأملاح تحت الظروف المصرية:

تحت ظروف الزراعة المصرية يتدخل أسلوب إدارة الأراضى وما يتضمنه من معاملات زراعية فى تحديد مدى انتشار المساحات المتأثرة بالملوحة. وكما هو معروف فإن اتباع أسلوب الزراعة المروية يؤدى إلى توالى إضافة كميات من الأملاح تحددها كمية ونوعية مياه الرى المستخدمة؛ مما يستدعى ضرورة تزويد هذه الأراضى بنظام للصرف ذى كفاءة عالية لتفادى تراكم الأملاح بقطاع التربة.

وقد قام منصور وآخرون (١٩٩٢) بإجراء دراسة استكشافية للتعرف على تغيرات الملوحة بأراضى محافظة كفر الشيخ فى الفترة من (١٩٦٠ حتى ١٩٩١). وقد اعتمدت الدراسة على خريطة الملوحة للمحافظة لعام (١٩٦٠)، والتى أعدت بناء على بيانات الحصر التصنيفى عام (١٩٦٠).

وقد استخدمت هذه الخريطة فى تحديد مساحات الأراضى الخالية من الملوحة، والمتوسطة الملوحة، والمرتفعة الملوحة، والمرتفعة الملوحة جدا بمراكز محافظة كفر

الشيخ؛ حيث استهدفت الدراسة الحالية عمل قطاعات بهذه المناطق بلغت ١٣٨ قطاعاً وأخذ عينات الأراضى، وتقدير قيم التوصيل الكهربى بها؛ كدلالة للتغير الحادث فى هذه الأراضى، ومدى التحسين والتدهور بها.

وقد أظهرت النتائج على مستوى المراكز والمستوى العام لأراضى المحافظة (جدول ١٢) تغيرات واسعة على مستوى درجات الملوحة المختلفة؛ حيث زادت النسبة العددية والمئوية للقطاعات غير الملحية التى كانت تمثل ٣١,١٦٪ من مجموع القطاعات عام (١٩٦٠) إلى ٨١,٨٨٪ عام (١٩٩١). وتناقصت النسبة المئوية للقطاعات الممثلة للأراضى المتوسطة الملوحة من ٣٤,٠٦٪ عام (١٩٦٠) إلى ١٣,٠٥٪ عام (١٩٩١)، ولم تتواجد فى مركز فوة.

أما بالنسبة للأراضى الشديدة الملوحة فقد تناقصت النسبة المئوية حتى وصلت إلى ٢,١٧٪ فى عام (١٩٩١) بعد أن كانت تبلغ ١١,٥٩٪ عام (١٩٦٠). وجدير بالذكر أن هذه الأراضى انعدم وجودها فى جميع المراكز ماعدا مركز كفر الشيخ.

وتشير النتائج ـ أيضا ـ إلى ارتفاع درجة تحسين الأراضى الشديدة الملوحة جدا بعد بلوغها ٢٣,١٩٪ عام (١٩٦٠)؛ إذ تناقصت إلى ٢,٩٪ عام (١٩٩١).

كما تشير الدراسة إلى أنه يمكن القول بأن مدلول التحسن قد لوحظ بصفة عامة وبدرجة عالية على مستوى المحافظة؛ وذلك يرجع إلى المجهودات المبذولة فى مشاريع تحسين التربة والصرف، علاوة على تطوير استخدام مياه الرى. وفى الوقت نفسه.. فإن الحاجة ماسة إلى إعادة الحصر التصنيفى للأراضى؛ بهدف تحديد مدى انتشار المساحات المتأثرة بالملوحة، واعتباره هدفاً قومياً يمكن من خلال نتائجه وضع التخطيط الأمثل لاستخدام الموارد الأرضية وتعظيم العائد منها.

ومما يؤكد ضرورة إعادة الحصر التصنيفى للأراضى المصرية ما تشير إليه الاتجاهات المتحصل عليها من حصر بعض المساحات، والتى يجب وضعها فى الاعتبار عند وضع أولويات برامج التحسين والصرف.

جدول (١٢) : الاختلاف فى انتشار الأراضى المتأثرة بالملوحة (محافظة كفر الشيخ) بدلالة عدد القطاعات فى أعوام ١٩٦٠، ١٩٩٢.

	أراضٍ خالية من الملوحة أقل من ٤ ملليموز/ سم				أراضٍ متوسطة الملوحة ٤ ـ ٨ ملليموز / سم				أراضٍ عالية الملوحة ٨ ـ ١٦ ملليموز / سم				أراضٍ عالية الملوحة جدا أكثر من ١٦ ملليموز/ سم				مجموع القطاعات المدروسة (١٩٩٢)
	حصر ١٩٦٠		حصر ١٩٩٢		حصر ١٩٦٠		حصر ١٩٩٢		حصر ١٩٦٠		حصر ١٩٩٢		حصر ١٩٦٠		حصر ١٩٩٢		
	عدد قطاعات	٪	عدد قطاعات	٪	عدد قطاعات	٪	عدد قطاعات	٪	عدد قطاعات	٪	عدد قطاعات	٪	عدد قطاعات	٪	عدد قطاعات	٪	
مركز بيلا	٩	٢٥,٧١	٢٥	٧١,٤٣	١٠	٢٨,٥٧	٨	٢٥,٨٦	١	٢,٨٦	—	—	١٥	٤٢,٨٦	٢	٥,٧١	٣٥
مركز كفر الشيخ	١٠	٣٢,٢٦	٢٥	٨٠,٦٤	١٤	٤٥,١٦	٢	٦,٤٥	٧	٢٢,٥٨	٣	٩,٦٨	—	—	١	٣,٢٣	٣١
مركز قلين	١١	٧٣,٣٣	١٤	٩٣,٣٣	٣	٢٠,٠٠	١	٦,٦٧			—	—	١	٦,٦٧	—	—	١٥
مركز سيدى سالم	٢	١٠,٠٠	١٥	٧٥,٠٠	٩	٤٥,٠٠	٥	٦,٦٧			—	—	٩	٤٥,٠٠	—	—	٢٠
مركز دسوق	٧	٣٥,٠٠	١٨	٩٠,٠٠	٤	٢٠,٠٠	٢	٢٥,٠٠	٦	٣٠,٠٠	—	—	٣	١٥,٠٠	—	—	٢٠
مركز فوه	٤	٢٣,٥٣	١٦	٩٤,١٢	٧	٤١,١٨	—	١٠,٠٠	٢	١١,٧٦	—	—	٤	٢٣,٥٣	١	٥,٨٨	١٧
إجمالى المحافظة	٤٣	٣١,١٦	١١٣	٨١,٨٨	٤٧	٣٤,٠٦	١٨	١٣,٠٥	١٦	١١,٥٩	٣	٢,١٧	٣٢	٢٣,١٩	٤	٢,٩٠	١٣٨

obeikandl.com

الفصل الخامس

الصرف الزراعى

obeikandl.com

obeikandl.com

مقدمة:

تمثل الأراضى الزراعية المصرية العامل الأساسى فى إنتاج الغذاء والمواد الخام اللازمة لقطاع الصناعة والتجارة الخارجية؛ مما يحتم ضرورة وضع البرامج، وإجراء الدراسات اللازمة لصيانة هذه الأراضى، والعمل على رفع إنتاجيتها.

وقد تناولت برامج الدولة وسائل الرى وتحسينها وتوفير المياه اللازمة؛ من خلال إقامة السدود والقناطر، دون توجيه الاهتمام الكافى إلى مشروعات الصرف الزراعى؛ مما انعكس على الخواص الكيميائية والطبيعية للأراضى، وأدى إلى تدهورها، وظهور مشاكل الملوحة والقلوية؛ ومن ثم انخفاض إنتاجيتها بدرجة ملحوظة.

وتمثل برامج صيانة وحفظ إنتاجية الأراضى أحد المحاور الهامة فى أسلوب السياسة الزراعية الخاص بمواجهة مشاكل الزيادة السكانية إلى جانب برامج التوسع الأفقى بالأراضى الجديدة.

وقد برزت مشكلة الصرف الحقلى فى مصر نتيجة إدخال نظام الرى الدائم فى الزراعة المصرية، وإخضاع الأراضى لإنتاج المحاصيل طوال العام، بدلا من نظام الرى الحوضى؛ الذى كان يسمح للماء الأرضى بالتذبذب فى حدود تسمح بتهوية التربة بين الزراعات دون ظهور أعراض التدهور.

وقد زاد حجم مشكلة الصرف الحقلى والعام بزيادة نسبة التكثيف المحصولى، والإسراف فى مياه الرى، وعدم الاهتمام بصيانة المصارف الرئيسية، وغياب التخطيط السليم لصيانة أراضى المشروعات الزراعية الكبرى.

وتزود الأراضى الزراعية بشبكات الصرف الحقلى للأغراض التالية التى تختلف حسب ظروف التربة ومستوى الماء الأرض:

أولا: المحافظة على مستوى الإنتاج بالأراضى التى تتميز بخواص طبيعية وكيماوية ومستوى ماء أرضى يناسب الإنتاج العالى. ويعتبر تزويد هذه الأراضى بنظام صرف حقلى كاف من أهم العوامل التى من شأنها المحافظة على مستوى إنتاجية هذه الأراضى.

ثانيا: تحسين التربة بالأراضى ذات مستوى الماء الأرضى المرتفع، حتى تتفادى تدهور صفات التربة الطبيعية والكيميائية. ويقوم نظام الصرف الحقلى فى هذه الحالة بالعمل على تخفيض مستوى الماء الأرضى.

ثالثا: تعتمد برامج استصلاح واستزراع الأراضى الملحية والقلوية ـ فى المقام الأول ـ على توفير نظام صرف حقلى ذى كفاءة عالية؛ للإسراع من عمليات الاستصلاح، بالإضافة إلى العناية بهذه الأراضى بعد إتمام استصلاحها؛ لمنع إعادة تمليح التربة والإضرار بالمحاصيل المنزرعة بالأرض.

وبصفة عامة نجد أن هناك عوامل عدة لها إسهامها فى تحديد إنتاجية الأراضى؛ مثل خواص التربة، ونوعية مياه الرى المستخدمة، وتوافر العناصر السمادية، بالإضافة إلى المعاملات الزراعية المناسبة. ويتدخل عامل الصرف الحقلى كعنصر محدد للإنتاجية، برغم توافر العوامل الأخرى.

وتسلك مياه الرى سلوكا معينا بالأراضى؛ حيث تحكمه مجموعة من ثوابت الرطوبة الخاصة بالتربة، وحالة نمو المحاصيل. ويتحرك الماء الحر غير الممسوك بحبيبات التربة تحت تأثير الجاذبية الأرضية إلى أسفل حتى يصل إلى طبقة صماء، يتجمع فوقها مالئا المسافات البينية لطبقات التربة. ويعتبر السطح العلوى لهذا الماء هو مستوى الماء الأرض، وعنده تكون كل الضغوط الهيدروستاتيكية صفرا.

ويؤدى ارتفاع منسوب الماء الأرضى بالتربة إلى ما يلى:

أولا: ارتفاع الأملاح الذائبة بالماء الأرضى بالخاصة الشعرية وتزهرها على سطح الأرض بعد تبخر المياه.

ثانيا: سوء التهوية بالتربة؛ مما ينعكس على انخفاض النشاط الحيوى للجذور وتعرضها للأمراض المختلفة.

ثالثا: سيادة نشاط البكتيريا غير الهوائية.

رابعا: عدم إمكان استخدام الميكنة الزراعية بكفاءة عالية؛ نظرا لعدم ملاءمة الخواص الطبيعية للأراضى (مثل السعة الحقلية والليونة) لإجرائها.

خامسا: تدهور خواص التربة الطبيعية والكيميائية.

مشكلة الصرف بالأراضي المصرية:

تتحكم كفاءة الصرف الحقلى ـ بدرجة كبيرة ـ فى تحديد التغيرات التى تطرأ على الخواص الطبيعية والكيميائية للأراضى، وكذلك قدرتها الإنتاجية. وقد أوضحت دراسات الحصر التصنيفى للأراضى المصرية (معهد بحوث الأراضى والمياه ١٩٥٧ ـ ١٩٧٣) عدة اتجاهات أسهمت ـ بدرجة كبيرة ـ فى وضع برامج التخطيط الزراعى والوسائل التى تهدف إلى الحفاظ على إنتاجية الأراضى المصرية وتنميتها. وقد أبرزت هذه الدراسات تأثير كفاءة الصرف الحقلى على مدى انتشار الأراضى المتأثرة بالملوحة والمنخفضة الإنتاجية بالمحافظات المختلفة كما يلى:

١ـ الدلتا:

محافظات القليوبية والمنوفية والغربية:

غالبية أراضى هذه المحافظات عادية الملوحة، فى حين تتواجد بعض المساحات المتفرقة من الأراضى المتأثرة بالأملاح فى المناطق التى تنخفض بها كفاءة الصرف أو المحرومة نهائيا من نظم الصرف.

محافظات كفر الشيخ ودمياط:

ترتفع بها نسبة الأراضى المتأثرة بالملوحة؛ نظرا لظروف موقعها ومجاورتها للبحيرات الشمالية، بالإضافة إلى عدم توفر الصرف الحقلى الكافى العميق.

محافظات الدقهلية والشرقية:

ترتفع بها نسبة الأراضى المتأثرة بالأملاح؛ لتواجدها بالقرب من بحيرة المنزلة، وسوء حالة الصرف فى شمالى محافظة الشرقية.

محافظة البحيرة:

ترتفع بها نسبة الأراضى المتأثرة بالملوحة؛ نظرا لانخفاض كفاءة الصرف الحقلى، علاوة على انخفاض مستوى الأراضى الزراعية فى بعض المناطق.

٢- مصر الوسطى:

معظم أراضى محافظة الجيزة عادية الملوحة ماعدا بعض المناطق المتفرقة التى تنخفض بها كفاءة الصرف الحقلى. كما يؤدى سوء الصرف وارتفاع مستوى المياه بالمصارف (مصرف محيط بنى سويف ومصرف المحيط الغربى) إلى انتشار الأراضى المتأثرة بالملوحة فى محافظة بنى سويف.

وتنفرد محافظة الفيوم بوضع خاص من حيث طبوغرافية الأراضى وأسلوب الرى والصرف بها انعكس على توزيع الأراضى المتأثرة بالملوحة بالنسبة لمراكز المحافظة؛ تبعا لفاعلية نظم الصرف الحقلى بها.

أما فى محافظة المنيا.. فيظهر تأثير الصرف الحقلى واضحا بالأراضى المحصورة بين ترعة الإبراهيمية وبحر يوسف. وهذه الأراضى تعد محرومة من نظم الصرف تقريبا، علاوة على انخفاض كفاءة الموجود منها.

٣ ـ مصر العليا:

تتواجد بعض المساحات المتفرقة من الأراضى المتأثرة بالملوحة فى محافظة أسيوط، ترجع إلى انخفاض كفاءة الصرف الحقلى، وزيادة الرشح من المجارى المائية. وتتماثل محافظة أسيوط مع كل من محافظتى سوهاج وقنا فى تواجد هذه المساحات المتفرقة.

أما فى محافظة أسوان فأراضيها عادية الملوحة بطول القطاع الأرضى مع ملوحة متوسطة بالطبقات التحتية؛ نتيجة سوء الصرف الحقلى.

ومما لا شك فيه أن نتائج دراسات الحصر التصنيفى للأراضى المصرية (الذى تم تنفيذه منذ حوالى عشرين عاما) يسهم بنتائجه المثيرة فى تحديد المشاكل التى تواجه الأراضى المصرية وعلى رأسها الصرف الحقلى لأهميته فى تحديد الإنتاج الزراعى.

وعلى هذا الأساس تدعو الحاجة إلى ضرورة إعادة هذه الدراسات حاليا؛ وذلك لتتبع التغيرات الحادثة فى الأراضى على مدى السنوات الماضية التى شهدت تحولات جذرية فى أسلوب الزراعة المصرية؛ من تكثيف زراعى، واستخدام معدلات عالية من الأسمدة الكيماوية، علاوة على الأسلوب المتبع فى إدارة مياه الرى وتوزيعها، بالإضافة إلى ذلك الآثار السلبية لكيفية تعامل المزارعين مع شبكات الصرف الحقلى.

وبصفة عامة يمكن القول إن كفاءة الصرف الحقلى تتباين فى مستواها من محافظة لأخرى. كما أن هناك بعض المناطق تتميز أراضيها بخواص طبيعية وهيدرولوجية وطبوغرافية، تحتم اتباع أسلوب معين وإجراء دراسات تكفل علاج مشاكل الصرف بها. وفى هذا المجال يستعرض أبو زيد (١٩٩٠) الظروف السائدة بهذه المناطق كما يلى:

الأراضى ذات مشاكل الصرف الخاصة:

١ـ الأراضى الثقيلة:

تتواجد هذه الأراضى فى المناطق الشمالية للدلتا جنوبى بحيرات البرلس والمنزلة وشرقى بورسعيد، وتبلغ مساحتها الكلية حوالى نصف مليون فدان.

وهذه الأراضى تنعدم بها النفاذية كما أنها ذات خواص صرف رديئة، شديدة الملوحة، بالإضافة إلى سيادة الصوديوم المتبادل.

وتحتاج برامج إصلاح هذه الأراضى إلى تكاليف عالية ومجهودات كبيرة؛ وذلك لتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية؛ بإضافة الجبس والغسيل وحرث تحت التربة. ولا شك فى أن هذه العمليات تكون عديمة الجدوى إذا لم يتوافر نظام صرف حقلى ذو كفاءة عالية.

وحاليا.. تقوم بعض المشروعات بدراسة الأساليب المثلى لإصلاح هذه المناطق طبقا لخواصها السائدة.

٢ ـ الأراضى غير الثابتة:

تشمل الخطة المستقبلية للصرف المغطى تزويد حوالى ١٥٠ ألف فدان من الأراضى الواقعة على جانبى الوادى والدلتا بشبكات الصرف المغطى. وتختلف هذه الأراضى عن أراضى كل من الوادى والدلتا؛ حيث إن الطبقة تحت السطحية فى الأولى عديمة الثبات، وهذه الطبقة غير الثابتة ينهار تماسكها فى وجود الماء؛ مما يستحيل معه وضع مواسير الصرف، وعمل الوصلات دون نزح المياه من هذه الطبقات، وإقامة شبكة الصرف الحقلى. وتحت هذه الظروف تحتاج إلى دراسة أنسب الأغلفة للوصلات؛ حتى نتفادى حدوث مشاكل من جراء انسداد الحقليات.

٣ ـ الأراضى الواقعة تحت تأثير ضغط ارتوازى:

كما ذكر سابقا بالفصل الأول.. فإن قطاع التربة بالأراضى النهرية الرسوبية تتكون من ترسيبات الطمى بسمك يختلف من منطقة لأخرى، وتوجد أسفلها الطبقة الرملية شبه المحددة والحاملة للماء الجوفى.

وتشير الدراسات إلى أنه فى منطقة شمال الدلتا وكذلك بالقرب من ترعة الإسماعيلية يكون الضغط البيزومترى للماء الجوفى بالطبقات الحاملة له عالية،

بمقارنتها بضغوط الماء الأرضى؛ مما يؤدى إلى تحرك المياه ذات الضغوط البيزومترية العالية تجاه سطح التربة. ويتوقف مستوى هذا التحرك على كل من الفروق بين هذه الضغوط، علاوة على سمك الطبقة الرسوبية ونفاذيتها.

ونظرا لملوحة الماء الجوفى فإن تبخره من سطح الأرض يؤدى إلى تمليح السطح؛ مما يستدعى تطبيق بعض المعاملات؛ لاحتواء الآثار الضارة لتحرك هذه المياه.

ويجب الأخذ فى الحسبان أنه يجب مراعاة تدفق الماء لأعلى بهذه المناطق إذا طبقت أساليب ترشيد الرى بها. كما يؤدى تزويد هذه المناطق بشبكات الصرف المغطى إلى زيادة تدفق المياه إلى أعلى؛ مما يستدعى ضرورة إيقافه بطرق مناسبة. ولاشك فى أن تنفيذ الصرف المغطى بهذه الأراضى يحتاج إلى حقليات على مسافات ضيقة نسبيا؛ ومن ثم تزداد تكلفة الفدان.

٤ ـ أراضى الوادى المتداخلة بالأراضى الصحراوية:

شملت برامج التوسع الأفقى بعض المناطق الصحراوية المتاخمة للوادى والدلتا فى سمالوط والفشن وكوم أمبو بالوجه القبلى؛ وهى أراضٍ ذات مناسيب عالية نسبيا بمقارنتها بالأراضى القديمة المجاورة.

ونظرا لاستخدام طريقة الرى السطحى فى رى هذه المناطق الجديدة فقد نتج من ذلك تسرب المياه إلى الأراضى القديمة المجاورة المنخفضة المنسوب؛ مما أدى إلى ارتفاع مستوى الماء الأرضى بها، وصل فى بعض الأحيان إلى سطح التربة. وتبلغ مساحة الأراضى المتأثرة بارتفاع مستوى الماء الأرضى حوالى ٣٠٠ ألف فدان من الأراضى العالية الإنتاجية.

وقد وضعت بعض الحلول لمواجهة المشكلة القائمة؛ تتمثل فى ترشيد الرى بالمناطق عالية المنسوب، بالإضافة إلى عمل مصارف قاطعة لمنع تسرب المياه من المناطق العالية. وجدير بالذكر أن إدخال الصرف الرأسى فى هذه المناطق مع استخدام مياه الصرف فى الرى يعتبر من الحلول المثالية.

٥ ـ أراضى الأرز:

يشغل محصول الأرز حوالى مليون فدان سنويا، ويليه ـ فى المساحة نفسها ـ المحاصيل الشتوية، ثم الذرة. وقد يعقبه محصول القطن بعد البرسيم التحريش، وتغمر حقول الأرز بالمياه طوال موسم النمو؛ حيث تختلف احتياجاته المائية وظروف نموه عن بقية المحاصيل التى تليه فى الدورة الزراعية، والتى تحتاج إلى توازن بين الماء والهواء بالتربة؛ وعلى هذا فإن تزويد هذه المساحة بالمصارف المغطاة يجعل من الصعب الاحتفاظ بالماء الكافى لغمر نباتات الأرز طوال موسم النمو.

وقد وضعت بعض التصميمات المناسبة للصرف المغطى بحيث تتلاءم مع الاحتياجات المائية لكل من الأرز والمحاصيل الأخرى، وهى تعتمد على فتحات محكمة للمجمعات لخدمة كل محصول. وهذا التصميم يساعد على توفير المياه بصفة عامة، مع زيادة الإنتاجية. وفى الوقت نفسه لا يلجأ المزارع إلى إغلاق فتحات المصارف بطريقة بدائية تؤدى إلى تعطيل عملها بعد ذلك وتقليل كفاءتها.

٦ـ الأراضى ذات القطاع الأرضى الضحل:

تتميز أراضى محافظة الفيوم عن بقية أراضى الجمهورية بطبوغرافية فريدة من حيث شدة ميولها. وتتم زراعة المحاصيل فيها على مصاطب متدرجة المناسيب. ويتراوح عمق القطاع الأرضى من ٦٠ ـ ٨٠ سم خاصة فى غرب الفيوم. وينتهى القطاع بوجود طبقة الحجر الجيرى؛ وعلى هذا تعانى الأراضى ارتفاع منسوب الماء الأرضى؛ نتيجة سوء استخدام مياه الرى، بما ينعكس على ملوحة الأراضى وتدهور الإنتاجية.

وتحت الظروف السابقة لهذه الأراضى نجد أن استخدام المصارف المكشوفة وترشيد مياه الرى يعتبر حلا معقولا؛ حيث إن تزويدها بالمصارف المغطاة لا يتلاءم مع عمق قطاعها الأرضى. وبرغم هذا فإن هذا الوضع الخاص لهذه الأراضى يتطلب إجراء دراسات تتعلق بأسلوب وطرق الصرف المغطى المناسبة.

٧ ـ أراضى القصب:

تحتل زراعة القصب مساحة تصل إلى حوالى ٣٠٠ ألف فدان فى محافظات جنوب الوادى. ونظرا لارتفاع احتياجاته المائية نجد أن ذلك ينعكس على مستوى الماء الأرضى وتمليح التربة إذا لم يتواجد نظام صرف حقلى كفء. وتعتبر أراضى القصب من المناطق ذات المشاكل الخاصة عند تنفيذ شبكات الصرف المغطى بهذه الأراضى؛ نظرا لما يلى:

(أ) زراعات القصب كثيفة ومتداخلة تؤدى إلى صعوبة إجراء عمليات الحصر المبدئية وعمليات المسح الطبوغرافى.

(ب) تخلو حقول القصب من النباتات بعد كسر المحصول لمدة شهرين فقط؛ مما يستدعى وضع برنامج محكم للتنفيذ.

وبالإضافة إلى ما سبق من العوامل المحيطة بمحصول القصب تعانى بعض المناطق تسرب المياه من أراضى المناطق العالية المنسوب والمجاورة للأراضى القديمة؛ مما يعرضها لزيادة منسوب الماء الأرضى بها وزيادة ملوحتها. ويعتبر الصرف الرأسى أحد البدائل المطروحة تحت هذه الظروف.

برامج الصرف الحقلي في مصر:

أدى استكمال مشروع السد العالى وممارسة الرى المستديم طوال العام إلى زيادة نسبة التكثيف المحصولى التى بلغت حوالى ٢٠٠ ٪. وأظهر هذا التغيير فى أسلوب الزراعة المصرية عدة مشاكل جديدة؛ مثل ارتفاع مستوى الماء الأرضى، وزيادة ملوحة الأراضى؛ مما قلل من قدرتها الإنتاجية.

وأصبح من الضرورى مواجهة هذه المشاكل بإنشاء شبكات الصرف الرئيسية والفرعية المكشوفة، بالإضافة إلى تطبيق أسلوب الصرف المغطى. ويحظى هذا الأسلوب المتكامل للصرف بأولوية مطلقة فى برامج الدولة المتعلقة برفع إنتاجية الأراضى المصرية.

وقد قامت الدولة فى عام ١٩٥٦ بإعداد البرامج التى تهدف إلى تزويد أراضى الوادى والدلتا بالصرف المغطى خلال ثلاثين عاما؛ حيث اختبر أسلوب التصميم المناسب وكذلك جدوى ميكنة عمليات التنفيذ ضمن أهداف المشروع التجريبى الممول من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية فى الفترة من (١٩٦١ ـ ١٩٦٤).

وبناء على هذه الدراسات قام البنك الدولى بتمويل تنفيذ عمليات الصرف المغطى فى مساحة ٩٥٠ ألف فدان خلال الفترة (١٩٧١ ـ ١٩٨٠)، تبعتها برامج أخرى مولها البنك الدولى ودول أخرى مانحة؛ حيث بلغت جملة المساحة المزودة بالصرف المغطى أكثر من ٣,٤ مليون فدان بنهاية (١٩٨٩). وهذه المساحة تمثل حوالى نصف المساحة الزراعية تقريبا.

وقد أوضح عامر (١٩٩٠) أن تخطيط ودراسة مشروعات الصرف المغطى يتم على عدة مراحل، تختص الأولى بتوصيف وتقييم مشاكل الصرف السائدة والتدرج بها، وصولا إلى الخطط التفصيلية للتنفيذ، وما يتبعها من تصميم شبكة المجمعات والحقليات والأعمال الإنشائية.

ويعتمد اختيار المناطق المختلفة ـ لتزويدها بالصرف المغطى ـ على مستوى الماء الأرضى وقربه من سطح الأرض؛ حيث تكون الأولوية للمناطق التى يقترب منها هذا المستوى إلى أقل من متر من سطح الأرض فى حوالى ٧٥٪ من مساحتها الكلية. كما أن الأولوية أيضا تكون للأراضى التى ترتفع ملوحتها عن ٤ ملليموز / سم.

ومن ناحية أخرى يرى أبو زيد (١٩٩٠) أن الحاجة إلى تجديد وإحلال شبكات الصرف القديمة يجب إدراجها ضمن الخطط البحثية؛ وذلك اعتمادا على ماتقدمه العلوم البحتة والتطبيقية من حلول يمكن من خلالها الوصول إلى تحسين خواص هذه المناطق.

وجدير بالذكر أن وضع أولويات التنفيذ لمشروعات الصرف تتوقف على مستوى الماء الأرضى وملوحة التربة. وبالرغم من هذا فإن تنفيذها لا يجب أن يقتصر على

حاجة برامج استصلاح الأراضى التى تعانى العوامل السابقة، بل نجد أنها تمثل أهمية كبرى أيضا فى صيانة الأراضى الجيدة من حيث خواصها الطبيعية والكيميائية التى تنعكس على قدرتها الإنتاجية.

ويخلص أبو زيد (١٩٩٠) إلى وضع مفهوم جديد لأسلوب وضع الأولويات الخاصة بمشروعات الصرف يعتمد على ظروف المنطقة، واقتصاديات المشروع، والوضع الخاص بمستلزمات التنفيذ. كما أن السياسات القومية والتسهيلات المتاحة للتنفيذ تحدد ـ إلى درجة كبيرة ـ أسلوب الأولويات. برغم هذا يجب أن تقترن هذه الأساليب بالمرونة بما لا يتعارض مع هذه العوامل.

وفى هذا المجال نجد أن بعض العوامل التى كانت تسهم بدرجة بسيطة فى تحديد الأسلوب فى الماضى زادت أهميتها فى الوقت الحالى؛ مثل الظروف البيئية المرتبطة بمشروعات الصرف التى تؤخذ حاليا ـ فى الحسبان ـ وتؤكد عليها الدول المانحة للقروض.

الصرف الحقلي:

تتدخل عدة عوامل فى تحديد حركة المياه بالتربة وتدفعها إلى مواسير الصرف المغطى. وهذه العوامل لها إسهاماتها فى تصميم شبكة الصرف الحقلى؛ وهى كالتالى:

١ ـ نفاذية ومسامية التربة وخواصها الكيميائية.

٢ ـ العمق حتى الطبقات الضعيفة النفاذية أو الصماء، وانحدار الأرض واتجاهاتها.

٣ ـ نوعية مياه الرى المستخدمة.

٤ ـ الخواص الهيدرولوجية للمنطقة.

٥ ـ أنواع المحاصيل بالمنطقة والمعاملات الزراعية الخاصة بها.

وترتبط معايير تصميم الصرف الحقلى ارتباطا وثيقا بالظروف السائدة بالمنطقة؛ حتى يتحقق الوصول إلى المنسوب الأمثل الذى يتناسب مع الزراعات الموجودة. وتعتمد هذه المعايير على عاملين أساسيين؛ هما معدل إزالة الماء الأرضى الزائد، وعمقه المناسب. وفيما يلى العوامل المرتبطة بمعايير تصميم الصرف الحقلى:

١ ـ عمق الماء الأرضى:

تعطى معظم المحاصيل أفضل نمولها عند تواجد مستوى الماء الأرضى تحت منطقة نمو الجذور، فى حين تتأثر بعضها عند ارتفاع مستواه لفترة قصيرة. ويرتبط عمق الماء الأرضى بنوعية التربة، والمناخ السائد، والمحاصيل المزروعة، وكثافتها، وكذلك الخدمة المائية للأراضى.

٢ ـ عمق المصارف:

العمق المناسب للمصارف هو ماينتج منه مستوى ماء أرضى مناسب يتيح التحكم فى ملوحة التربة، مع الأخذ فى الحسبان اقتصاديات التنفيذ.

٣ ـ معدل تصميم الصرف:

يندرج تحتها نوعان من المعدلات، يختص أولها بتصميم المسافات بين المصارف، يختص ثانيها بالتصميم الخاص بقطر المصارف. ويرتبط كلاهما بالآخر ارتباطا وثيقا.

ويحسب المعدل الخاص بتصميم المسافات باستخدام معادلة الاتزان المائى التى تشمل الماء المراد خروجه من المصارف، والماء المغذى للماء الأرضى بأسبابه المختلفة، والتسرب من قنوات الرى، وتدفق الماء الأرضى للمنطقة المدروسة مشتملا على الماء الارتوازى، وأخيرا الصرف الطبيعى بالمنطقة. أما معدل التصميم الخاص بقطر المواسير.. فيمكن إيجاده من المعادلات الخاصة بالتدفق.

٤ ـ الارتفاع الهيدروليكى:

ويتمثل الفرق بين العمق التصميمى للمصارف وعمق المصارف.

٥ ـ معادلات تصميم المصارف:

تستخدم كل من معادلات التدفق المنتظم وغير المنتظم فى تقدير المسافة بين الحقليات؛ حيث تعطى قيما متقاربة، ومع ذلك تتبع معادلة التدفق المنتظم بشكل أوسع فى مشروعات الصرف. وتعتبر مدخلات معادلة التدفق غير المنتظم مناسبة تماما عند حساب المسافة بين الحقليات للأراضى التى يتذبذب بها مستوى الماء الأرضى تحت ظروف الزراعة المروية صناعيا. وتعتمد هذه المعادلة على متوسط قيم التوصيل الهيدروليكى لطبقات التربة، فى حين تستخدم معادلة التدفق المنتظم عدة قيم للتوصيل الهيدروليكى لطبقات التربة المختلفة.

ويرى الدكتور عامر (١٩٩٠) ضرورة الأخذ بمعادلة التدفق غير المستمر فى التصميم، مع تتبع مدى فاعليتها تحت ظروف بعض مناطق شمال الدلتا ذات ظاهرة تدفق المياه إلى أعلى تحت ضغط. كما أشار إلى أن الدراسات يجب أن تتناول طرق تقدير مدخلات هذه المعادلة بطرق مبسطة ودقيقة بما يسهم فى استخدامها فى المستقبل.

استخدام أسلوب الأنفاق في رفع كفاءة الصرف الحقلي:

يعتبر استخدام أسلوب الصرف المكشوف أو المغطى فى التخلص من ملوحة الأراضى الطينية الثقيلة ذات قيم التوصيل الهيدروليكى المنخفضة غير مجزى اقتصاديا؛ وذلك نظرا لما تحتاج إليه هذه الأراضى من وضع الحقليات على مسافات ضيقة نسبيا، بالإضافة إلى عامل الوقت اللازم للوصول إلى مستوى الملوحة المناسبة لزراعة المحاصيل.

ويسهم أسلوب الأنفاق moling فى عملية استصلاح هذه الأراضى، فى حالة تنفيذهاطبقا للأسس التى تضمن ثباتها وعدم انهيارها، وفاعليتها فى التخلص من الأملاح من قطاع التربة. ولا شك فى أن تنفيذ شبكة الصرف المغطى ـ إلى جانب الأنفاق ـ يسهم بفعالية كبيرة فى التخلص من الأملاح بهذه الأراضى.

وللقيام بتطبيق أسلوب الأنفاق يجب الأخذ فى الحسبان مايلى:

أولا: يؤدى استخدام mole plough إلى إحداث شقوق فوق قناة الأنفاق؛ مما يؤدى إلى زيادة نفاذية التربة، وعدم وجود تجانس فى سرعة المياه داخل قطاع التربة. وتؤدى هذه الشقوق إلى وجود اتصال من سطح التربة وقناة النفق؛ مما يتيح تدفق مياه الرى المنخفضة الملوحة؛ ومن ثم.. تقليل مقاومة الأنفاق للانهيار.

ثانيا: تؤثر حالة الأرض ـ عند عمل moling ـ فى مدى ثبات الأنفاق، بالإضافة إلى تقليل الشقوق الناتجة من mole leg slot، ومنع اتصالها بقناة النفق؛ فعلى سبيل المثال يؤدى نقص المحتوى الرطوبى للتربة عن الحد الأدنى للبلاستيكية إلى تعرض قناة النفق للانهيار؛ وعلى هذا فمن الوجهة العملية تروى الأرض، وتترك لتجف، مع إثارة الطبقة السطحية خلال هذه الفترة؛ حتى لا يمتد الجفاف إلى طبقة تحت التربة. وفى هذه الحالة يقل عدد الشقوق الناتجة عند التنفيذ، كما يمنع اتصالها بقناة النفق.

وبصفة عامة فإن إعداد قناة النفق الملساء يعتمد على حجم mole foot وكذلك الموسع expander؛ حيث وجد أنه بزيادة الحجم إلى حد معين يؤدى إلى نتائج مشجعة من حيث الإعداد الجيد للقنوات.

وتحت ظروف الأراضى الثقيلة بمنطقة الزاوية بكفر الشيخ كانت الأقطار المثالية هى ٧٥ ملليمتراً فى حالة mole foot، و١٥٠ ملليمتراً فى حالة expander، وذلك عند تنفيذ الأنفاق على أعماق ٠,٦٥ ـ ٠,٧٥ متراً من سطح الأرض (Spoor وآخرون ١٩٩٠). وبالاضافة إلى ما سبق فقد أوضح Spoor & Ford (١٩٨٧) أن مقاومة الأنفاق للانهيار عند ابتلالها تزداد بزيادة المدة التى تقضيها بعد تنفيذها حتى بداية الابتلال ـ وأعطت فترة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين ـ نتائج مشجعة فى هذا الأمر مع الوضع فى الحسبان وجوب الرى قبل حدوث شقوق ترتبط بقنوات الأنفاق.

وقد تناولت الدراسات ـ التى قام بها معهد بحوث الأراضى والمياه بمحطة البحوث الزراعية بسخا ـ موضوع زيادة كفاءة عمل الأنفاق وزيادة مقاومتها للانهيار؛ حيث اتبعت أساليب متعددة تقوم على أساس ملء قنوات الأنفاق بمواد مختلفة كالرمل الخشن أو الحصى الرفيع أو الجبس الزراعى. وباستقراء النتائج الأولية المتحصل عليها يلاحظ زيادة العمر الفعال للقنوات المحقونة بالمواد السابقة، مقارنة بالقنوات الخالية منها. كما ارتبطت هذه الفعالية بانخفاض ملحوظ فى المحتوى الملحى لقطاع التربة حتى عمق ٦٠ سم وإمكانية زراعة المحاصيل السطحية الجذور خلال الفترات الأولى من عملية الاستصلاح.

الصرف الرأسي:

تتضمن برامج وزارة الأشغال والموارد المائية ـ والخاصة بتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية ـ استخدام أسلوب الصرف الرأسى فى توفير الاحتياجات المائية لبعض المناطق، بالإضافة إلى معالجة مشاكل الصرف فى هذه المناطق.

ويعتبر أسلوب استخدام الصرف الرأسى من أنسب الحلول لمشاكل الصرف فى المناطق التى تتميز بتسرب الماء إلى أعلى من الطبقات التحتية المحصورة تحت الضغط الارتوازى؛ حيث يساعد تخفيض ضغط المياه الجوفية بواسطة الفتح المباشر من طبقة المياه الجوفية على حل مشاكل الصرف بهذه المناطق.

وتنخفض كثيرا تكاليف إنشاء الصرف الرأسى إذا قورنت بالصرف المكشوف أو المغطى، برغم زيادة تكلفة تشغيلها وصيانتها. ومما يزيد من اقتصاديات الصرف الرأسى فى بعض المناطق جودة المياه، ودرجة صلاحيتها للرى. ومن ناحية أخرى فإن إنشاء وتطوير الصرف الرأسى يصبح مشكوكا فيه اقتصاديا فى حالة انخفاض نوعية مياه الضخ.

وتتدخل عدة عوامل فى تحديد أفضلية واقتصاديات الصرف الرأسى؛ حيث يفضل اتباع هذا الأسلوب فى حالة وجود طبقة متجانسة من non artisian aquifer،

بسمك كافٍ فى حدود ١٥ مترا، وبمعدل توصيل حوالى ١٠٠ متر مكعب فى اليوم، علاوة على توفر مسامية كافية للطبقة الحاملة للمياه، كما أن هناك عوامل أخرى لها إسهامها فى تفضيل هذا الأسلوب، تنحصر فى مدى فعالية مسافة تأثير الضخ وكفايتها فى خفض مستوى الماء الأرضى، علاوة على تكاليف الطاقة المستخدمة.

العوامل المؤثرة في كفاءة شبكة الصرف الحقلي:

يمكن الوصول إلى كفاءة عالية لشبكة الصرف وإطالةعمرها الفعال إذا ما اتبعت الأساليب العلمية فى التصميم والإشراف الدقيق عند تنفيذها، مع العناية بأعمال الصيانة الواجب القيام بها.

وتعترض شبكات الصرف المغطى فى مصر بعض السلبيات، التى تؤدى فى النهاية إلى انخفاض كفاءتها، وعدم ملاءمتها لإيجاد علاقة متوازنة بين الأرض والماء والنبات؛ حيث يتأثر نمو المحاصيل نتيجة سوء التهوية فى منطقة الجذور، كما يصعب استخدام الميكنة فى هذه الحالة؛ لعدم ملاءمة خواص التربة لذلك.

وفيما يلى العوامل التى تؤثر فى كفاءة شبكة الصرف المغطى:

١ ـ التدهور التدريجى للشبكة نتيجة تجمع الرواسب داخل أنابيب الصرف. كما قد يحدث هذا التجمع نتيجة بعض الأخطاء فى بداية تنفيذ الشبكة.

٢ ـ وجود خلل فى شبكة الصرف يرجع إلى وضعها، أو تكوين طبقة بالأرض تعوق سريان المياه. وتكون هذه الطبقة على عمق قريب من سطح الأرض.

٣ ـ ارتفاع مستوى المياه بالمصارف المكشوفة؛ مما يعمل على ارتداد مياه الصرف ثانية إلى الحقليات.

٤ ـ إسراف المزارعين فى الرى، وقيامهم بصرف المياه الزائدة سطحيا عن طريق كسر غرف التفتيش؛ مما يؤدى إلى انجراف حبيبات التربة داخلها؛ ومن ثم انسداد الشبكة.

٥ ـ قيام المزارعين بإجراء عمليات خدمة الأراضى ليلا؛ مما يعرض غرف التفتيش للكسر.

٦ ـ قيام زُرّاع الأرز بسد مواسير الصرف عند الزراعة بواسطة بقايا النباتات؛ حتى يمكن جعل حقول الأرز مغمورة طوال موسم النمو؛ مما يؤثر فى كفاءتها؛ ومن ثم إنتاجية المحاصيل بها.

٧ ـ انسداد غرف التفتيش بإلقاء جثث الحيوانات.

أسلوب تقييم برامج الصرف المغطي:

تحتاج عمليات تنفيذ برامج الصرف الزراعى إلى استثمارات عالية توجب دراسة اقتصادياته، بالإضافة إلى تتبع التغيرات الحادثة فى خواص الأراضى. وتتولى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف المغطى مسؤولية تقييم هذه المشروعات من خلال الزيادات الحادثة فى إنتاجية المحاصيل المنزرعة بهذه المناطق. ومنذ عام (١٩٨٥) شملت دراسات التقييم تتبع الاختلافات فى خواص الأراضى الطبيعية والكيميائية والهيدرولوجية.

وعلى هذا الأساس يشمل التقييم المؤشرات التالية:

أولا ـ تقييم إنتاجية المحاصيل:

يعتمد هذا المؤشر على تتبع أثر تنفيذ مشروعات الصرف المغطى على إنتاج المحاصيل الرئيسية (القمح / القطن والذرة الشامية والأرز). وقد أجرى هذا التقييم فى المناطق الأربع التى مولها البنك الدولى، التى تبلغ مساحتها ١,٣٥٠ ألف فدان بالدلتا، و ٨٠٠ ألف فدان بالوجه القبلى. كما شملت هذه الدراسات مساحة ٦٠٠ ألف فدان تمثل المنطقة الخامسة للمشروع.

ويجرى هذا التقييم على أساس تحديد المساحة المزمع تزويدها بشبكات الصرف الحقلى؛ حيث يتم إنتاج المحصول بهذه المساحة لمقارنته بإنتاجية المساحات غير المزودة

بالصرف. ويوخذ فى الحسبان إنتاج المحصول بهذه المساحات قبل تنفيذ عمليات الصرف بها. ويتم تحليل هذه البيانات إحصائيا؛ لتقدير الزيادات الحادثة بالمحصول.

والجدول التالى يوضح متوسط الزيادة المئوية فى المحاصيل الحقلية بكل من الدلتا والوجه القبلى نتيجة تنفيذ برامج الصرف المغطى (مناطق الاتفاقيتين الأولى والثانية).

	الدلتا		الوجه القبلى	
	الاتفاقية الأولى	الاتفاقية الثانية	الاتفاقية الأولى	الاتفاقية الثانية
القمح	٢٨	٤٧	٣٧	٣٨
القطن	٢١	٣٦	٣٨	٢٨
الذرة	٢٣	٤١	٤٤	٤٥
الأرز	٢٣	٤٠	–	–

ويجب الأخذ فى الحسبان أن تنفيذ شبكات الصرف المغطى فى إحدى المناطق لايمكن إتمامها فى مجمل المساحة كلها خلال عام واحد؛ ومن ثم يتفاوت عمر الشبكة من مكان لآخر بالمنطقة؛ وعلى هذا فإن الزيادات الحادثة فى المحصول تكون محصلة للزيادات الحادثة فى الأماكن المختلفة بالمنطقة الواحدة.

ثانيا ـ تقييم خواص الأراضى:

اعتبارا من عام (١٩٨٥) شملت دراسات التقييم ـ التى تقوم بها الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى ـ تتبع التغيرات الطبيعية والكيماوية والهيدرولوجية فى خواص الأراضى التى تتم بها تنفيذ شبكات الصرف المغطى؛ نظرا لكونها أحد المؤشرات الهامة التى تحدد مدى فعالية التطبيق.

ويتم هذا التقييم باختيار حوالى ١٠ ٪ من المساحة التى تم تزويدها بنظم الصرف منذ عام أو أكثر؛ حيث تقارن قيم النفاذية ومستوى الماء الأرضى وملوحته قبل التنفيذ وبعده. وفى الوقت نفسه تؤخذ عينات من قطاع التربة حتى عمق ١٠٠ سم؛ لتقدير ملوحة الطبقات وقيم معامل ادمصاص الصوديوم.

وتوقع هذه البيانات على الخرائط للمقارنة وتتبع التغيرات فى هذه الخواص.

وجدير بالذكر أنه حتى عام (١٩٨٦) قامت وحدة التقييم بالهيئة بتحليل اقتصاديات برامج الصرف المغطى للوصول إلى مدى ما تحققه من زيادة الإنتاج وما يعود على الفلاح. وتستند هذه الدراسات على بيانات الإدارات الزراعية الخاصة بالمدخلات وإنتاجية المحاصيل التى تشملها الدورة الزراعية المطبقة فى المناطق المختلفة.

وتقوم الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى بوضع الأساليب والبرامج الكفيلة بتتبع وتقييم مشروعاتها من خلال زيادة قدرتها فى هذا المجال؛ بوضع أسلوب متواصل للمتابعة والتقييم، والاهتمام بالتدريب فى المجالات المختلفة التى تؤدى إلى رفع مستوى الأداء. كما أن إدخال الوسائل الحديثة لإجراء العمليات المختلفة له تأثيره المباشر فى هذا الأمر.

ولاشك فى أن إيجاد فرص التعاون العلمى مع المعاهد البحثية المختلفة له انعكاساته الفعالة على رفع مستوى عمليات التتبع والتقييم لمشروعات الصرف.

الفصل السادس

الإسراف فى مياه الرى

obeikandl.com

obeikandl.com

مقدمة:

تستأثر الدول النامية بحوالى ٨٠٪ من مساحات الزراعة المروية بالعالم. وبرغم قدرات هذا الأسلوب على تحقيق معدلات عالية من الإنتاج وإمكاناته فى رفع مستوى معيشة مجتمعات هذه الدول إلا أنه يواجه بعديد من المعوقات تحول دون إظهارفعالياته.

وقد أخفقت معظم مشروعات الرى فى هذه الدول فى تحقيق الأغراض التى أقيمت من أجلها والتى تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعى؛ حيث عزى ذلك إلى التركيز ـ بصفة أساسية ـ على الاستثمارات العالية المخصصة لأعمال الرى الكبرى كالسدود والأعمال الصناعية، دون النظر إلى أهمية إدارة مياه الرى وأساليب تطويرها، بما يكفل زيادة العائد من استخدام وحدة المياه، والحفاظ على الموارد المائية المتاحة، وتفادى الآثار الجانبية نتيجة الإسراف فى استخدامها، والتى تتمثل فى ارتفاع مستوى الماء الأرضى، وما يتبعه من تمليح قطاع التربة وإيجاد ظروف غير مناسبة لنمو المحاصيل. وهذه العوامل مجتمعة تؤدى إلى خفض قدرة الأرض الإنتاجية.

الري في مصر:

مارس المصريون أسلوب الرى الحوضى فى توفير الاحتياجات المائية للمحاصيل؛ اعتمادا على مدى ما يحتفظ به قطاع التربة من المياه بعد انحسار فيضان النهر عن هذه الأراضى. وقد اتبع هذا النظام ـ جنبا إلى جنب ـ مع نظام الرى المستديم الذى

اتبع فى بعض المساحات؛ اعتمادا على مدى توفر مصادر المياه؛ حيث تزايدت هذه المساحة بالتدرج فى إنشاء السدود والقناطر وزيادة سعة تخزين المياه.

وبإتمام إنشاء السد العالى. تمكنت مصر من تطبيق الرى المستديم بالرقعة الزراعية كلها، مع استبعاد الرى الحوضى؛ ومن ثم زادت المساحة المحصولية اعتمادا على إنشاء هذا النظام الذى يكفل كافة الاحتياجات المائية لكل من الأراضى القديمة والمساحات المدرجة ببرامج التوسع الأفقى بالأراضى الجديدة. وقد فرضت معدلات الزيادة السكانية ومحدودية الرقعة الزراعية الاتجاه الحتمى نحو هذا التغيير الجذرى فى الزراعة المصرية.

وقد حظيت الأعمال الخاصة بإنشاء الرى المستديم بالأولوية المطلقة، مع عدم الاهتمام النسبى باتباع أساليب تطوير الرى الحقلى بهذه المناطق وزيادة كفاءته، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بضرورة إنشاء الصرف الحقلى بها. وقد نشأ هذا المفهوم من خلال عدم توقع معظم الهيئات بمعدلات ارتفاع مستوى الماء الأرضى وتمليح التربة؛ نتيجة ممارسة نظام الرى الجديد.

ومما لاشك فيه أن تطبيق أساليب معينة لمواجهة المشاكل المرتبطة باستخدامات المياه يختلف باختلاف الظروف السائدة بهذه المناطق. وفى هذا المجال أعطت برامج تحسين الأراضى نتائج مشجعة؛ من خلال رفع كفاءة الصرف الحقلى، وتطبيق معاملات تحسين التربة فى المساحات المتأثرة بالأملاح، وارتفاع مستوى الماء الأرضى، وتكسير الطبقات الصماء بمنطقة سلاح المحراث.

ونظرا لانتشار مشاكل الأراضى ـ نتيجة استخدام مياه الرى فى ظل انخفاض كفاءة استخدامها ـ فقد أوصت عديد من الدراسات وتقرير الهيئات الدولية بضرورة رفع كفاءة نقل المياه وتوزيعها وتطوير الرى الحقلى بما يكفل زيادة العائد لوحدة المياه؛ وذلك من خلال برنامج بحثى متكامل تطبق نتائجه وتوصياته على المستوى القومى فيما بعد.

وتأتى أهمية هذا الاتجاه تحت ظروف الزراعة المصرية؛ حيث تمثل قيم الاستهلاك المائى للمحاصيل حوالى نصف الموارد المائية المتاحة، فى حين يفقد معظم الباقى عن طريق الرشح والنحر من المجارى المائية خلال النقل إلى جانب انخفاض كفاءة الرى الحقلى.

وقد أشار التقرير الخاص بالمشاكل التى تواجه الإنتاج الزراعى فى مصر (١٩٧٦) إلى انخفاض كفاءة استخدام مياه الرى على مستوى الجمهورية؛ حيث تراوحت من ٤٤٪ إلى ٥٨٪؛ وهى قيم منخفضة إلى حد كبير تحت ظروف نظام الرى السائد فى مصر الذى يسترجع ثانية معظم الفواقد.

وعلى هذا الأساس يشير التقرير إلى المصادر المائية التى يجب التركيز عليها والاستفادة منها لمواجهة احتياجات برامج التوسع الأفقى، والتى تتضمن المياه التى توفرها برامج تطوير الرى الحقلى، وتخفيض فواقد النقل، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى. وهذه البنود شملتها استراتيجية وزارة الأشغال والموارد المائية (١٩٨٥).

نظام الري و مشاكل الأراضي:

يؤدى الإسراف فى استخدام مياه الرى إلى تدهور خواص الأراضى؛ نتيجة ارتفاع مستوى الماء الأرضى وما يصحبه من زيادة ملوحة قطاع التربة، وذلك بكل من الأراضى القديمة والأراضى الجديدة. ويمكن ـ من خلال رفع كفاءة نظام الصـرف ـ تقليل الآثار المترتبة على ارتفاع مستوى الماء الأرضى برغم أنه يمكن ـ بزيادة كفاءة الرى الحقلى ـ التوصل إلى حد ما إلى نتيجة مماثلة.

وقد أوضح Jenny (١٩٤١) أن خواص الماء الأرضى تتدخل معنويا فى خواص الأراضى وتكوينها، وأن محتواه الملحى له أثره فى ملوحة الأراضى.

ومن ناحية أخرى يرى زين العابدين (١٩٥٩) أن التأثير الضار لارتفاع مستوى الماء الأرضى على إنتاجية الأراضى يرجع إلى توقف نمو الجذور؛ نظرا لسيادة ظروف سوء التهوية.

وقد أوضح Latunof (١٩٥٥) أن زيادة درجة الحرارة تؤدى إلى زيادة ارتفاع الماء بالخاصية الشعرية، كما يؤثر مستوى الماء الأرضى على معدل الزيادة أيضا.

ومن ناحية أخرى أشار Kovda (١٩٤٦) إلى وجود ارتباط موجب بين مستوى ملوحة الماء الأرضى والمحتوى الملحى للأراضى.

وقد قام مصطفى وآخرون (١٩٦٨) بتحليل بيانات الحصر التصنيفى لأراضى بعض المناطق؛ وذلك لتوضيح مدى الارتباط بين المحتوى الملحى لكل من الماء الأرضى وقطاع التربة، كما هو مبين بجدول (١٣).

وتشير البيانات إلى تزايد المحتوى الملحى بعينات التربة بزيادة تركيز الأملاح بالماء الأرضى؛ حيث ارتبطت معنويا قيم كل من ملوحة الماء الأرضى وملوحة طبقات التربة.

ويحدد مستوى الماء الأرضى عمق قطاع التربة الذى يتوافر فيه التهوية والرطوبة والعناصر الغذائية ومجال انتشار الجذور. وتختلف المحاصيل فيما بينها من حيث عمق القطاع المناسب لها. وقد دلت النتائج التى أوردها معمل الملوحة والقلوية بوزارة الزراعة أن محصول الذرة الشامية يحتاج إلى عمق أكبر من الكتان، كما يقل العمق المناسب كثيرا فى حالة البرسيم الحجازى.

جدول (١٣) : عمق وملوحة الماء الأرضى والمحتوى الملحى بالطبقات المتعاقبة لقطاع التربة فى بعض مناطق شمال الدلتـــا .

المنطقة	عمق القطاع سـم	ملوحة التربة ملليموز/ سم	عمق الماء الأرضى سم	ملوحة الماء الأرضى ملليموز/ سم	المنطقة	عمق القطاع سـم	ملوحة التربة ملليموز/ سم	عمق الماء الأرضى سم	ملوحة الماء الأرضى ملليموز/ سم
كفر سعد					موقع (٢)	٠ ـ ٣٠	١٠,٠٥	٥٠	٧,٥
موقع (١)	٠ ـ ٣٠	١٦,٦٠				٣٠ ـ ٥٠	٧,٠٦		
	٣٠ ـ ٦٠	١٨,٩٠	٦٠	٤٧,٥٠	موقع (٣)	٠ ـ ٣٠	١٠,٤٣		٢٣,٥
موقع (٢)	٠ ـ ٣٠	٢٤,٩٦				٣٠ ـ ٦٠	٤,١٧	٦٠	
	٣٠ ـ ٦٠	٣٠,٢٤			بيـــلا				
	٦٠ ـ ٩٠	٣٨,٩٠	٩٠	١١٥,٠٠	موقع (١)	٠ ـ ٢٠	٢,١٩		
موقع (٣)	٠ ـ ٣٠	٧٢,٣٨				٢٠ ـ ٥٠	٣,٩٦		
	٣٠ ـ ٦٠	٦٠,٧٩				٥٠ ـ ١٠٠	٥,٣٢	١٠٠	٧,٧١
	٦٠ ـ ٩٠	٥١,٧٠			موقع (٢)	٠ ـ ٣٠	٧,٤٧		
	٩٠ ـ ١٢٠	٦٢,٤٠	١٢٠	٢١٢,٥٠		٣٠ ـ ٦٠	٨,٣٧		
المنزلة						٦٠ ـ ١١٠	١٠,٠٠	١١٠	٢٠,٢١
موقع (١)	٠ ـ ٣٠	٣١,٩٠			موقع (٣)	٠ ـ ٣٠	٢٩,١٣		
	٣٠ ـ ٦٠	٢٨,٢٠	٦٠	٨٥,٠٠		٣٠ ـ ٦٠	٥١,٨٠		
موقع (٢)	٠ ـ ٣٠	٢,٣٠				٦٠ ـ ٩٠	٥٨,٤٠	٩٠	١٥٧,٠٠
	٣٠ ـ ٦٠	٢,٦٠	٨٥	٢,٤٠	حوش عيسى				
كفر الشيخ					موقع (١)	٠ ـ ٢٥	٠,٧٠		
موقع (١)	٠ ـ ٣٠	٧,٦٩				٢٥ ـ ٥٠	٠,٩٧		
	٣٠ ـ ٧٠	٩,٠٧	٧٠	١٠,٠		٥٠ ـ ١٠٠	١,٠٠		
موقع (٢)	٠ ـ ٢٥	١٢,١٢				١٠٠ ـ ١٤٠	٠,٩٣	١٤٠	٠,٨٢
	٢٥ ـ ٥٠	٦,٠٣	٥٠	١٦,٦٥	موقع (٢)	٠ ـ ٣٠	١٢٢,٠		
موقع (٣)	٠ ـ ٢٠	٩٢,٥٠				٣٠ ـ ٧٠	٦٩,٠		
	٢٠ ـ ٤٠	٤٦,٣٠	٤٠	١٢٩,٥٠		٧٠ ـ ١٢٠	٦٢,٦	١٢٠	١٤٠,٨
دمياط					موقع (٣)	٠ ـ ٣٠	٦,٨		
موقع (١)	٠ ـ ٣٠	٦,٤				٣٠ ـ ٦٠	٥,٢		
	٣٠ ـ ٦٠	٣,٣				٦٠ ـ ٩٠	٢,٥	٩٠	١٦,٧
	٦٠ ـ ١٠٠	٢,٢	١٠٠	٣,٥	موقع (٤)	٠ ـ ٢٥	١,٤		
						٢٥ ـ ٤٠	٢,٣		
						٤٠ ـ ٧٠	٣,٤		
						٧٠ ـ ١٢٠	١,٧	١٢٠	١,٣

ترشيد الري والصرف الزراعي:

يعتبر الصرف الزراعى عاملا هاما فى المحافظة على إنتاجية الأراضى الزراعية. ويتوقف تصميم هذا النظام على خواص الأراضى، وظروف الموقع، والدورة الزراعية المتبعة، والعوامل المناخية.

وتحت ظروف الأراضى الزراعية يكون لأسلوب الرى المتبع بالمنطقة دوره الكبير فى تصميم شبكة الصرف بها برغم أن ما يحدث حاليا هو تصميم نظامى الرى، الرى والصرف كل على حدة؛ حيث يؤخذ أسلوب الرى كأحد المعطيات التى تتحدد على أساسها أبعاد وأعماق المصارف.

وعلى هذا الأساس يرى Skagge (١٩٩٠) ضرورة تصميم نظامى الرى والصرف معا؛ بهدف الوصول إلى الإدارة المثلى للمياه فى الأراضى المروية. وقد استخدم بعض النماذج لمحاكاة التداخل بين نظام الرى والصرف فى منطقة مشتول بمحافظة الشرقية؛ للتنبؤ بمحصول الذرة تحت ظروف معاملات الرى التى تشمل مدى واسعاً للمحتوى الرطوبى للتربة، مع وجود معاملات للصرف الحقلى تتباين فيها أعماق المصارف والمسافات بينها. وقد أظهرت الدراسة قوة الارتباط والتداخل بين نظام الصرف ومعاملات الرى.

ومما لاشك فيه أن ترشيد استخدام مياه الرى ينعكس على كمية ونوعية مياه الصرف الزراعى التى تشكل ركنا هاما فى حجم الموارد المائية المتاحة؛ طبقا لاستراتيجية وزارة الأشغال والموارد المائية.

وفى هذا المجال أجرى القوصى (١٩٩٠) دراسة بهدف تتبع أثر التحكم فى المياه المنصرفة من السد العالى على كمية ونوعية مياه المصارف خلال الفترة من أعوام (١٩٨٥/٨٤) حتى (١٩٨٩/٨٨)؛ حيث انتهجت وزارة الأشغال والموارد المائية أسلوب التحكم وتقليل المياه المنصرفة من السد العالى. وهذا يتماثل ـ إلى حد كبير ـ مع الهدف النهائى لبرامج تطوير الرى؛ من حيث توفير موارد مائية جديدة. وفى الوقت نفسه فقد فرضت ظروف الجفاف السائدة خلال هذه الفترة اتباع هذا الأسلوب .

وقد أظهرت هذه الدراسة أن النقص السنوى فى مياه الصرف الزراعى ـ الذى يذهب إلى البحر والبحيرات دون استخدام ـ بلغ ١,٨٦ ٪، ٥,٩٨ ٪، ٨,٨٩ ٪، ١٠,٤٦ ٪ بالنسبة لأعوام (٨٦/٨٥)، (٨٧/٨٦)، (٨٨/٨٧)، (١٩٨٩/٨٨) على الترتيب إذا قورن ذلك بعام (١٩٨٥/٨٤).

وقد بلغ الفرق بين مجموع الصرف عامى (١٩٨٥/٨٤)، (١٩٨٩/٨٨) حوالى ٣,٥ مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى، وهى كمية تتماثل تقريبا مع الفرق بين حجم المياه المصروفة من السد العالى خلال هذه الأعوام، والتى بلغت ٣٥,٣ مليار متر مكعب فى عام (١٩٨٥/٨٤)، و ٣١,٨ مليار متر مكعب فى عام (١٩٨٩/٨٨)؛ مما يشير إلى تماثل تأثير أسلوب التحكم على كل من المياه المصروفة من السد العالى وحجم مياه الصرف الزراعى الناتجة. وفى الوقت نفسه يجدر القول بأن إنتاجية المحاصيل لم تتأثر مطلقا بتطبيق أسلوب التحكم فى مياه الرى المصروفة من السد العالى.

ومن ناحية أخرى تزايدت ملوحة مياه الصرف الزراعى نتيجة تطبيق أسلوب التحكم فى المياه المصروفة. وقد عزى ذلك إلى أن مياه الصرف الزراعى تتكون أساسا مما يلى:

١ ـ المياه التى تصل إلى المصارف بعد مرورها بقطاع التربة حاملة الأملاح إلى خارجه.

٢ ـ المياه التى تصرف سطحيا بعد الرى نتيجة عدم تسوية الأراضى وانخفاض كفاءة الرى. وكذلك المياه التى تذهب إلى المصارف طبقا للأسلوب المتبع فى زراعة الأرز. ومياه كلا المصدرين ذات نوعية جيدة نسبيا.

٣ ـ الفقد الحادث بنهايات الترع؛ نظرا لأن نظام الرى فى مصر غير مصمم للتخزين الليلى. ومع غياب الرى الليلى حاليا بالزراعة المصرية تهدر كميات كبيرة من مياه الرى إلى المصارف دون استخدام.

٤ ـ الرشح من قنوات الرى.

وبالإضافة إلى ما سبق توجد مصادر أخرى لمياه الصرف الزراعى تنشأ من كل من مصدر تداخل مياه البحر، وكذلك مصادر الصرف الصناعى والصحى. وينعكس أسلوب التحكم فى المياه المصروفة من السد العالى بصفة أساسية على كميات المياه الجيدة النوعية الناشئة من صرف نهايات الترع، وكذلك الصرف السطحى للمياه الزائدة عند الرى، بالإضافة إلى ما يصرف من زراعات الأرز. ويؤدى خفض هذه المياه الجيدة النوعية إلى زيادة ملوحة مياه المصارف.

وقد تناول القوصى (١٩٩٠) فى دراسته أيضا تأثير التحكم فى حجم المياه المصروفة من السد العالى على كمية الأملاح التى تلقى فى البحر والبحيرات؛ حيث أظهرت الدراسة تزايد ملوحة مياه الصرف الزراعى؛ حيث بلغت ٣,٧١، ٣,٦٨، ٣,٦٤، ٤,١٥، ٤,٤٤ ملليموز / سم على الترتيب بالنسبة لسنوات الدراسة ابتداء من عام (١٩٨٥/٨٤) حتى عام (١٩٨٩/٨٨). وفى الوقت نفسه تناقصت كمية الأملاح التى تلقى سنويا فى البحر؛ حيث بلغت ٣٣,٥٣، ٣٢,٦٤، ٣٠,٣٥، ٣١,٥٣، ٣٠,٢٠ مليون طن للسنوات السابقة على الترتيب.

جدول (١٤): الاختلافات الحادثة فى كل من كمية ونوعية مياه الصرف الزراعى بالدلتا؛ نتيجة سياسة التحكم فى مياه الرى المصروفة من السد العالى

	٨٥/٨٤		٨٦/٨٥		٨٧/٨٦		٨٨/٨٧		٨٩/٨٨	
	كمية	التركيز	كمية	التركيز	كمية	التركيز	كمية	التركيز	كمية	التركيز
شرق الدلتا	٤٥٥٧	٢,١٤	٤٣٨١	٢,٣٧	٣٩٧٨	٢,٥	٣٦٥٠	٢,٦٦	٢٨٥٩	٢,٨٠
وسط الدلتا	٥٠٠٨	٣,٣٨	٤٨٨٣	٣,٧١	٤٨٧٣	٣,٧١	٤١٠٥	٤,٠٠	٣٩٠٢	٤,٠٠
غرب الدلتا	٤٥٥٦	٥,٦٣	٤٥٩٢	٤,٩٠	٤١٧٨	٤,٧٠	٤١١٦	٥,٦٢	٣٨٦٨	٦,٠٨
المجموع / مليون م٣	١٤١٢٠		١٣٨٥٧		١٣٠٢٨		١١٨٧٠		١٠٦٢٩	
متوسط تركيز الأملاح (ملليموز/ سم)		٣,٧١		٣,٦٨		٣,٦٤		٤,١٥		٤,٤٤
كمية الأملاح الكلية (مليون/طن)	٣٣,٥٣		٣٢,٦٤		٣٠,٣٥		٣١,٣٥		٣٠,٢٠	

المصدر: ضياء القوصى (١٩٩٠).

ويبلغ مجموع الأملاح الكلية لكل من مياه الرى ومياه مصارف الوجه القبلى المعاد استخدامها ـ والتى تدخل منطقة الدلتا ـ ١١,٧٥ مليون طن. وهذه الكمية تمثل حوالى ثلث الكمية الكلية التى تلقى سنويا بالبحر، والتى تصل إلى حوالى ٣٢ مليون طن سنويا. ويعزى هذا الفارق الكبير أساسا إلى المحتوى الملحى المرتفع لكل من عوامل زحف مياه البحر ورشح المياه الجوفية بالأراضى الخفيفة القوام.

وقد تناول موضوع إدارة مياه الرى عديداً من الجهات البحثية؛ حيث شملت دراساتها التراكيب المحصولية، ونوعيات الأراضى، والعوامل المرتبطة باستخدامات المياه، وكذلك سلوك الفلاح، ومقدرته على التغيير فى حدود خبراته، والمعطيات الجديدة فى الزراعة المصرية.

وجدير بالذكر أن معظم هذه الدراسات أجريت بالأراضى القديمة ذات المحتوى الطينى المرتفع، فى حين تقوم برامج التوسع الأفقى بالأراضى الجديدة على أساس استخدام الرى بالرش والتنقيط فى توفير الاحتياجات المائية لها، حيث ترتفع كفاءة استخدام المياه بها إلى حوالى ٩٠ ٪ تقريبا.

وفى هذا الخصوص أدت تجاوزات بعض المنتفعين بالأراضى الجديدة ـ باستخدام الرى بالغمر بدلا من الطرق الحديثة الموصى بها ـ إلى ارتفاع مستوى الماء الأرضى بهذه المناطق. وقد أسفرت هذه التجاوزات فى مناطق سمالوط عن رشح مياه الرى من الأراضى الجديدة ذات المنسوب المرتفع إلى الأراضى القديمة المجاورة المنخفضة المنسوب، وغمرها بالمياه، وانخفاض قدرتها الإنتاجية.

وقد تناول مشروع تطوير الرى العوامل المختلفة المرتبطة بأسلوب استخدام المياه فى الأراضى القديمة كما يلى:

أولا ـ مشروع إدارة واستخدام مياه الرى (Ewup):

يمثل الارتباط بين كل من أسلوب نقل وتوزيع مياه الرى والرى الحقلى جوهر

هذا المشروع؛ نظرا لما لمسته وزارة الأشغال والموارد المائية من ضرورة تناول موضوع المياه من جميع زواياه؛ للوصول إلى مستوى عال لكفاءة استخدامها، وذلك بالرغم من تحدد مسؤوليتها بصفة أساسية فى تخطيط وتنفيذ برامج تنمية الاحتياجات المائية.

وبناء على ماسبق فقد استهدفت دراسات المشروع تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لصغار المزارعين بالأراضى القديمة من خلال تحسين استخدام وإدارة مياه الرى والمعاملات الزراعية؛ بما ينعكس على زيادة الإنتاج الزراعى، وكفاءة استخدام مياه الرى، وتقليل مشاكل الصرف.

وبهدف المشروع كذلك إلى دراسة الأساليب والبدائل المختلفة التى تدعم فاعلية التنفيذ لكل من وزارتى الزراعة والأشغال والموارد المائية لبرامج تحسين إدارة المياه على المستوى القومى؛ وذلك بتقييم مدى قابلية البرامج للتطبيق، وتقبل المزارع والهيئات لها.

وقد اعتمد منهاج المشروع على اتباع أسلوب الفريق المتكامل عند معالجة موضوع تطوير الرى؛ حيث يضم هذا الفريق مهندس الرى والزراعيين والاقتصاديين والاجتماعيين لدراسة النواحى الفنية المختلفة. وقد شمل المشروع المراحل التالية:

١ ـ مرحلة توصيف وتقدير حجم المشاكل التى تواجه إدارة المياه واستخداماتها بالمناطق الزراعية المختلفة.

٢ ـ اقتراح الحلول المناسبة للمشاكل القائمة.

٣ ـ اختبار الحلول المقترحة عن طريق تطبيقها بمناطق الدراسة.

٤ ـ اقتراح الوسيلة المناسبة لتطبيق الحلول المختبرة والتى تم تقييمها.

وقد أتاح المنهاج المتبع فى دراسات هذا المشروع الوصول إلى مجموعة من التطبيقات لها فعاليتها فى مواجهة مشكلة انخفاض كفاءة استخدام المياه بالأراضى القديمة. ومما يجدر ذكره أن أسلوب الدراسة يعتمد على ضرورة مشاركة المزارعين للفريق البحثى، ومراعاة وجهات النظر الخاصة بهم ـ كمستخدمين للمياه ـ فى

توصيف مشاكل الرى والبدائل المناسبة للحلول، علاوة على اختبار وتقييم الحلول المقترحة.

وقد استغرقت دراسات المشروع ست سنوات تناولت خلالها العديد من العوامل الهامة فى زيادة الإنتاج الزراعى، مع التركيز بصفة أساسية على موضوع نقل المياه وتوزيعها وإدارتها على مستوى الحقل.

وفيما يلى بعض الاتجاهات التى توصلت إليها دراسات المشروع تلك الاتجاهات التى أسهمت فى وضع برامج الخطة القومية لتطوير الرى بمصر، والتى يجرى تطبيقها حاليا.

١ ـ تحسين نظام توزيع المياه لمنطقة ما تحكمه عديد من العوامل تؤخذ فى الحسبان عند اقتراح حلول معينة لاختبارها تحت هذه الظروف السائدة. وهذه الحلول لايمكن تطبيقها مباشرة فى مناطق أخرى دون توصيف مشاكل هذه المناطق؛ حتى تتلاءم معها هذه الحلول، وتصبح ذات فعالية.

وقد أسهمت دراسات المشروع فى إيجاد الطرق المناسبة لتصميم وتقييم البدائل المقترحة لتحسين نظام التوزيع على مستوى الترع.

٢ ـ يجب الوضع فى الحسبان استمرارية الدراسات عند تطبيق الأساليب المقترحة لتطوير الرى على المستوى القومى؛ حتى يمكن وضع الحلول المناسبة للمشاكل التى تعترض التطبيق؛ مثل ارتفاع مستوى الماء الأرضى، وزيادة ملوحة الأراضى، وكيفية توفير الاحتياجات المائية للمحاصيل. ومن أجل الوصول إلى أداء فعال يجب العناية بالتدريب فى المجالات المختلفة، مع إعطائه أولوية مطلقة.

٣ ـ شملت مجموعة برامج التطبيق تحسين كل من نظام توصيل المياه وإدارتها على مستوى الحقل بجانب تحسين المعاملات الزراعية، حيث وضح حسن تقبل المزارعين لتطبيق هذه البرامج وارتباطها بزيادة الإنتاجية.

٤ ـ ضرورة الاهتمام بإنشاء وصيانة نظم الصرف من أجل خفض مستوى الماء الأرضى؛ حيث لم يتضح عمليا تحت ظروف الرى بالغمر تفادى دوره فى رفع مستوى الماء الأرضى من خلال زيادة كفاءة الرى.

٥ ـ يجب مراعاة إسهام الماء الأرضى فى توفير الاحتياجات المائية للمحاصيل عند تحديد مياه الرى المقررة بنظام التوزيع، بما ينعكس على خفض المياه المستخدمة.

٦ ـ يؤدى حسن إدارة نظام التوزيع بالراحة ـ على مستوى قناة التوزيع والمساقى ـ إلى توفير الطاقة والمياه، مع الوضع فى الحسبان ضرورة إسهام مستخدمى المياه لضمان حسن الإدارة والصيانة.

٧ ـ ضرورة الاهتمام باستخدام مياه الرى والمصرف لتوفير الاحتياجات الزراعية على المستوى القومى.

٨ ـ من أجل زيادة كفاءة الرى الحقلى يجب العناية بتسوية الأرض والتصميم المحكم لكل من الرى بالخطوط أو بالأحواض؛ مما ينعكس على زيادة الإنتاج، وتوفير كل من الوقت والمجهود.

٩ ـ ويوصى المشروع بضرورة تدريب القائمين بأعمال التطوير وزيادة قدراتهم بما يتفق مع مفهوم تطوير الرى.

١٠ ـ غياب الرى الليلى وتكالب الفلاح على الرى طوال النهار فقط يسبب ضغطا على مياه الرى؛ مما يؤدى إلى عدم وجود مستوى للمياه يتيح كفاءة عالية للرى؛ وعلى هذا الأساس يجب تشجيع الرى الليلى أو عمل فتحات تتلاءم مع جدولة الرى، مع الوضع فى الحسبان نظام المناوبات.

١١ ـ للإرشاد المائى أهميته فى تعريف مستخدمى المياه بضرورة مطابقة الاستخدام للاحتياجات الفعلية للمحاصيل، كما يستدعى ضرورة وجود التعاون بين واضعى نظام التركيب المحصولى وتوزيع المياه.

١٢ ـ العناية بعوامل الإنتاج المختلفة (وتشمل خواص الأرض الطبيعية والكيميائية، وخصوبتها، والمعاملات الزراعية المختلفة) من أجل زيادة العائد لوحدة المياه بعد رفع كفاءة استخدامها.

١٣ ـ نظرا للتوسع الحالى والمستقبلى فى استخدام الميكنة لإجراء العمليات الزراعية المختلفة يدعو الأمر إلى ضرورة تطبيق أسلوب الخطوط والشرائح الطويلة، مع إجراء عمليات التسوية بما يزيد من فاعلية ميكنة الزراعة. وفى هذا الخصوص يجب

معالجة موضوع تفتيت الملكيات، وضيق الفترات بين المواسم الزراعية والتى تؤثر على إتمام التسوية فى التوقيتات المناسبة.

١٤ ـ تشجيع رفع مياه المسقى فى نقطة واحدة تسمح لجميع مستخدمى المياه باستخدام هذا المصدر، وتوفير الوقت والمجهود، وفى الوقت نفسه يقوى ذلك من ترابط المزارعين وتعاونهم.

ثانيا ـ مشروع تطوير وتحسين الرى (IIP)

تشمل السياسة المائية لوزارة الأشغال والموارد المائية عدة محاور تهدف من خلالها إلى زيادة الموارد المائية المتاحة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة حتى عام ٢٠٠٠. وتمثل البرامج الخاصة بتطوير الرى أحد المحاور الهامة فى هذا المجال؛ نظرا لفعاليته فى رفع كفاءة استخدام المياه وتوفيرها وتأثيره على الخواص الطبيعية والكيميائية للأراضى وإنتاجية المحاصيل.

فإذا ما استعرضنا السياسة المائية التى وضعتها وزارة الأشغال والموارد المائية وتم عرضها على مجلس الوزراء عام (١٩٨٥) نجد أن الموارد المائية المتاحة فى نهاية الخطة الخمسية الماضية (١٩٨٧/٨٦) وفى نهاية الخطة الخمسية الحالية (١٩٩٣/٩٢) وفى عام (٢٠٠٠) كما يلى:

المـــــــورد	الموارد المائية المتاحة بالمليار متر مكعب		
	١٩٨٧/٨٦	١٩٩٣ /٩٢	٢٠٠٠
حصة مصر من مياه النيل	٥٥,٥	٥٧,٥(١)	٥٧,٥
الخزان الجوفى فى الدلتا والوادى	٢,٣	٤,٠(٢)	٤,٩
إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى	٣,٤(٣)	٦,٣(٤)	٧,٠
الاستفادة من مياه السدة الشتوية	ـــ	١,٥(٥)	٢,٥
الوفر المتاح من المشروع القومى لتطوير الرى)	٠,١	٠,٥(٦)	٢,٠(٧)
جملة الموارد المائية	٦١,٣	٦٩,٨	٧٣,٩

المصدر: وزارة الرى ـ السياسة المائية وعلاقتنا بدول حوض النيل.

ملاحظات:

١ ـ بفرض إنهاء مشروع قناة جونجلى (المرحلة الأولى) قبل عام (١٩٩٣/٩٢).

٢ ـ بفرض إنهاء نحو ٥٠٪ من مشروع المياه الجوفية بالدلتا والوجه القبلى للاستفادة بجزء من المياه المتاحة للتوسع فى مياه الشرب (٠,٧ مليار سنويا).

٣ ـ على أساس الانتهاء من محطة طلمبات المحسمة (٠,٥٧ مليار).

٤ ـ على أساس استخدام ٣,٣٥٥ مليار متر مكعب من مياه الصرف من مصرف العموم والغربية الرئيسى ومصرف البطس، وتغذية بعض ترع شرق ووسط الدلتا بمياه الصرف الزراعى.

٥ ـ الاستفادة الجزئية بمياه السدة الشتوية بعد تخزينها ببحيرة البرلس والمنزلة.

٦ ـ تطوير الرى فى نصف مليون فدان.

٧ ـ تطوير الرى فى مليونى فدان.

وتبرز أهمية مشروع تطوير الرى بصفة خاصة فى إسهامه الفعال فى زيادة إنتاجية الفدان؛ من خلال التحكم الأفضل فى مياه الرى وتوفيرها فى الوقت المناسب لاحتياج النبات. وفى الوقت نفسه تتضح أهميته فى تأثيره على مدى الوفر فى كل من المصادر المائية والأرضية وتكاليف الضخ والصيانة والمجهود. كما تزداد أهمية هذا المشروع نظرا لتناوله للمشكلات البيئية المرتبطة بالرى، بالإضافة إلى تقوية الروابط بين مستخدمى المياه وإدارات الرى.

ويقوم مشروع تطوير الرى باتباع الأساليب العلمية فى علاج المشاكل المصاحبة لتطبيق نظام الرى التقليدى فى مساحة تبلغ ٤٠٠ ألف فدان تقريبا تقع على ١٧ ترعة رئيسية فى محافظات إسنا ـ المنيا ـ الفيوم ـ الشرقية ـ الغربية ـ البحيرة؛ حيث يتم تطوير حوالى ٨٠٠٠ مسقى. ويعتبر هذا المشروع نواة لتطوير جميع مناطق الرى فى مصر، وقد تم تخطيطه بحيث يتم تنفيذه فى ستمبر (١٩٨٥).

وجدير بالذكر أن هذا المشروع القومى يعتمد ـ بصفة أساسية ـ على الأساليب والحلول العلمية التى تم التوصل إليها خلال المراحل المختلفة لمشروع إدارة المياه

obeikandl.com

بمصر Ewup، والتى شملت توصيف وتقنين مشاكل استخدام المياه بالأراضى القديمة، والحلول المقترحة، وتقييمها، ومدى تقبل المزارع لتغيير أسلوبه فى إدارة المياه.

مناطق المشروع:

تبلغ مساحة المشروع حوالى ٤٠٠,٠٠٠ فدان موزعة على المناطق التالية:

الوجه البحرى		مصر الوسطى		مصر العليا	
المساحة بالفدان	المنطقة	المساحة بالفدان	المنطقة	المساحة بالفدان	المنطقة
١٢٨٠٠	القهوجى	٢٠٢٤٥	عقال والشامية	٤٩٦٠	عبادى
٣٠٦٠٠	البحر الصعيدى	٥٠٠٠	بنى عبيد	٨٩٠٠	راديسية
٧٧٣٣٠	السعيدية (١، ٢، ٣)	١١٣٤٠	منتوت	٩٩٦٠	خور الساحل
١٢٠٠٠	بلقط	٤٠٠٠	أشروبة		
٢٣٦٠٠	بهيج	٧١٦٠	قمن العروسة		
		٥٩٠٠٠	سر الغرق		
		٩١٠٠٠	ترعة سرى		

المصدر: نشرات مشروع تطوير الرى (IIP)

وبصفة عامة تنحصر أهداف المشروع فى تقديم عديد من التطبيقات تسهم فى التغلب على مشاكل تشغيل النظام التقليدى؛ وهى كما يلى:

١ ـ الرى المباشر المستمر الذى يتميز بإمكان ضبط الفترات الفاصلة بين الريات بما يتناسب مع حالة المحصول والأراضى، وفى الوقت نفسه يضمن توزيعاً متساوياً للمياه بين المزارعين فى بداية ونهاية كل ترعة، مع العمل على تقليل فواقد المياه.

٢ ـ التحكم فى مناسيب المياه خلف القناطر بما يتناسب مع الاحتياج المائى؛ ومن ثم فإن البوابات تغلق ولا يفيض الماء إلى المصارف.

٣ ـ المساقى المرفوعة مع الرفع من نقطة واحدة، وفيه يتم رفع المياه عند فم المسقى إلى المزرعة، ويتم الرى بالراحة عن طريق بوابات الفتحات أو الصمامات.

٤ ـ ترشيد الرى والتحكم فيه: الموزعات وبوابات الفم تستخدم فى الحد من التدفق فى القنوات الفرعية. ومعدل الارتداد للمساقى يمكن تثبيته عن طريق سعة مضخات الرفع من نقطة واحدة. وتكون المحصلة فى النهاية الحصول على توزيع جيد للمياه.

٥ ـ روابط مستخدمى المياه: تقوم هذه الروابط بمسؤوليتها فى تشغيل وصيانة المساقى المطورة، كما يتضمن أيضا تنسيق أوقات الرى.

٦ ـ جهاز التوجيه المائى: يسهم فى تكوين روابط مستخدمى المياه وإمدادهم بالخدمات التى تسهم فى حسن إدارة واستخدام المياه.

ويعتبر تبنى الدولة لهذه المشروعات على المستوى القومى نتاجا طبيعيا للترابط الواجب تقويته بصفة مستمرة بين كل من الأجهزة البحثية والتنفيذية، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية والحفاظ على كل من المصادر المائية والأرضية.

ومن ناحية أخرى يجب إدماج التطبيقات والأساليب التى يقوم بتنفيذها مشروع تطوير الرى فى المناطق المختلفة مع نتائج الدراسات الزراعية المتمثلة فى أساليب تقليل الاحتياجات المائية لبعض المحاصيل الحقلية، وذلك فى شكل حزمة تطبيقات تكون لها فعاليتها فى زيادة كفاءة استخدام مياه الرى، وصيانة الأراضى الزراعية وزيادة إنتاجيتها.

الفصل السابع

خصوبة الأراضى المصرية

obeikandl.com

obeikandl.com

مقدمة:

تعتبر خصوبة الأراضى أحد العوامل الأساسية فى تحديد إنتاجيتها، حيث تعبر عن المستويات التى تتواجد بها العناصر الغذائية الكبرى والصغرى ودرجة صلاحيتها، علاوة على قدرة الأرض التنظيمية فى إمداد المحاصيل المنزرعة باحتياجاتها خلال أطوار النمو المختلفة. وتشكل خصوبة الأراضى ـ بجانب عوامل الإنتاج الأخرى ـ أهمية كبيرة فى تحديد أفضلية المناطق المختلفة لإنتاج المحاصيل فى مصر؛ ومن ثم تحديد مدى إسهامها فى تكوين الدخل القومى.

العناصر الكبرى بالأراضي المصرية:

ينخفض المحتوى العضوى بصفة عامة بالأراضى المصرية (المناطق الجافة وشبه الجافة)؛ حيث يتراوح بين ١,٢ ـ ٢,٢٪؛ ومن ثم ينخفض مستوى كل من النتروجين الكلى والذائب. ويرى بكمان ويرادى (١٩٦٠) أن الأراضى تحت أى مناخ معين ـ وتحت طرق معتادة من الاستزراع والتسميد ـ يكون بها كمية معتادة أو متزنة من النتروجين. وتتذبذب هذه الكمية فى مدى ضيق؛ حيث تؤدى محاولات رفع مستوى هذه الكمية المتزنة إلى ضياعها بالصرف أو بوسائل الفقد الأخرى.

ومن المستحسن عمليا محاولة المحافظة على هذا المستوى المتزن من نتروجين الأرض، مع العمل على جعل النتروجين فى حالة نشاط من خلال زراعة البقوليات وإضافة المواد العضوية الأخرى ذات النسبة الضيقة من الكربون إلى النتروجين.

ويتواجد الفوسفور بالأراضى على صورة عضوية وغير عضوية. ويكون الفوسفور غير العضوى حوالى ٤٨ ـ ٧٨٪ من الكمية الكلية فى الأراضى المصرية؛ حيث تبلغ كميته حوالى ٩٦,٨، ٢٠,٣، ٢٠,٤ ملليجرام فوسفور / ١٠٠ جرام تربة بأراضى الوادى، والأراضى الرملية، والأراضى الجيرية على التوالى.

ويسلك الفوسفور فى الأراضى سلوكا خاصا تحدده ظروف التربة نفسها، علاوة على أسلوب استغلال هذه الأراضى فى إنتاج المحاصيل. ويتمثل هذا السلوك فى الكميات العالية من الفوسفور المضاف إلى الأراضى إذا قورنت بالكميات التى تستهلكها المحاصيل المنزرعة، والتى يحددها مدى تيسير الفوسفور بصورة صالحة للامتصاص النباتى، بالاضافة إلى العوامل التى تؤدى إلى تثبيت الفوسفور الذائب.

وعلى هذا تنحصر مشكلة الفوسفور بالأراضى فى مدى زيادة تيسير فوسفور الأرض، بالإضافة إلى تأخير عمليات التثبيت أو تحويل الفوسفات المضافة المثبتة إلى صورة ذائبة. وبصفة عامة تبلغ قيم الفوسفور الصالح بالأراضى المصرية ١٩, ١٤, ٧ ملليجرام/ ١٠٠ جرام تربة لكل من الأراضى الرسوبية والرملية والجيرية على التوالى.

وتؤثر الأملاح السائدة بالأراضى المتأثرة بالأملاح فى مصر على مدى تيسير الفوسفور وصلاحيته نتيجة الإحلال والتبادل لأيونات الكالسيوم؛ مما يؤدى إلى ترسيب فوسفات الكالسيوم، فى حين تزداد صلاحية الفوسفور بزيادة الصوديوم المتبادل.

وتحت ظروف الأراضى الجيرية نجد أن محتوى التربة من كربونات الكالسيوم يعتبر أحد محددات صلاحية عنصر الفوسفور. كما أن نعومة كربونات الكالسيوم نفسها لها تأثيرها المعنوى فى صلاحية وتثبيت الفوسفور.

وقد تناول الجبلى (١٩٧٣) هذا الموضوع من حيث الطريقة المثلى لمواجهة مشكلة الفوسفور بهذه الأراضى؛ وذلك للوصول إلى وضع يسمح بوجود إمداد مستمر للنباتات خلال أطوارها الفسيولوجية المختلفة. وقد أشار إلى فعالية إضافة كمية

عالية من الفوسفور فى بداية زراعة هذه الأراضى؛ وذلك لبناء مستوى معين من الفوسفور بالأراضى، تعقبه إضافات سنوية للمحافظة على هذا المستوى.

ويسلك البوتاسيوم سلوكا خاصا فى الأراضى المصرية تعكس مدى استجابة المحاصيل للإضافات البوتاسية؛ فقد أظهرت الدراسات العديدة عدم وجود هذه الاستجابة، وخاصة فى حالة الأراضى الرسوبية التى يرتفع بها المحتوى البوتاسى الكلى والصالح للاستفادة؛ حيث تتحكم كمية الطين بصفة أساسية فى تحديد مستوى البوتاسيوم بالأراضى، وفى مدى قدرة الأرض على تيسير البوتاسيوم من الصورة غير المتبادلة إلى صورة صالحة للامتصاص. هذا بالرغم من تعرض صور البوتاسيوم بهذه الأراضى لاستنزاف مستمر طبقا للتكثيف الزراعى المتبع حاليا بالزراعة المصرية، واستخدام معدلات عالية من النتروجين، بالإضافة إلى إدخال الأصناف العالية الإنتاجية من المحاصيل. وقد انعكس هذا الوضع على مركز البوتاسيوم بالأراضى المصرية؛ حيث أظهرت بعض الدراسات اتجاها لبعض المحاصيل للاستجابة للإضافات البوتاسية.

ويختلف سلوك استنزاف البوتاسيوم فى الأراضى الرسوبية عند مقارنتها بكل من الأراضى الجيرية والرملية؛ حيث تشير دراسات الزناتى وآخرين (١٩٧٦) إلى اختلاف كبير فى منحنيات الاستنزاف لعنصر البوتاسيوم بهذه الأراضى؛ ففى حالة الأراضى الرسوبية يكون الاستنزاف تدريجيا، فى حين تتميز الأراضى الجيرية بشدة استنزاف صور البوتاسيوم بها فى البداية، ثم تقل تدريجيا بعد ذلك. وقد عزى ذلك إلى نظام ارتباط أيونات البوتاسيوم بمعادن الطين بهذه الأراضى.

وعموما تتواجد صور البوتاسيوم الذائب والمتبادل وغير المتبادل بكميات صغيرة إذا قورنت بمستوياتها فى حالة الأراضى الرسوبية. وترتبط هذه الصور طرديا بالمحتوى الطينى للتربة، وعكسيا مع محتوى التربة من كربونات الكالسيوم. ومن ناحية أخرى تنخفض قدرة الأراضى الجيرية على إمداد البوتاسيوم.

العناصر الصغرى بالأراضي المصرية:

تشكل العناصر الصغرى أهمية كبيرة فى الزراعة المصرية، حيث تلقى اهتماما متزايدا فى ظل التغيرات الجذرية لأسلوب الزراعة حاليا. وقد أسهمت عدة عوامل فى إظهار دورها وأعراضها على المحاصيل المختلفة، وخاصة بعد انقطاع ورود طمى النيل؛ نتيجة إنشاء السد العالى، واستهلاك المحاصيل لهذه العناصر، وخفض تركيزها إلى أقل من المستوى اللازم للنمو العادى. وبالإضافة إلى ما سبق.. فقد أدى تحسين أنواع المحاصيل واستخدام معدلات عالية من مخصبات العناصر الكبرى إلى زيادة مايستهلك من العناصر الصغرى. وفى الوقت نفسه فقد أُدى استخدام المخصبات العالية التركيز إلى عدم استعمال الأملاح غير النقية المحتوية على بعض هذه العناصر الصغرى.

وبصفة عامة يلاحظ أن معظم الأراضى القديمة تحتوى على مستويات من عناصر الزنك والحديد والمنجنيز والنحاس أعلى من الحدود الحرجة.

وفى الوقت نفسه تنخفض هذه المستويات كثيرا فى حالة الأراضى العالية المحتوى من كربونات الكالسيوم، وكذلك الأراضى الخشنة القوام. وفى هذا الخصوص فقد تناولت عديد من الدراسات بكلية الزراعة ـ جامعة عين شمس (١٩٧٣) سلوك هذه العناصر بالأراضى الجيرية كما يلى:

أولا ـ الحديد:

يبلغ الحديد الكلى حوالى ٥,٥ X ١٠^{٣} جزءاً فى المليون، فى حين يصل الحديد الصالح للاستفادة إلى حوالى ١٣ جزءاً فى المليون. ويختلف مدى استجابة المحصول للمصادر المختلفة للحديد من حيث كونها على صورة مخلبية أو كبريتات حديد. ومن ناحية أخرى ترتبط مظاهر الاصفرار الناجمة عن نقص الحديد بمحتوى الفوسفور المضاف ورطوبة التربة؛ حيث تزداد نسبة الحديد النشط بزيادة مستوى الفوسفور ورطوبة التربة.

ثانيا ـ المنجنيز:

يتراوح المنجنيز الكلى بالأراضى الجيرية بين ١٢٥ ـ ٢٢٠ جزءاً فى المليون، فى حين يتواجد الجزء الصالح للاستفادة فى المدى من ٤٥ ـ ١٠٠ جزء فى المليون. وقد تناولت هذه الدراسات التوازن الموجود بين صور المنجنيز المختلفة، وفاعلية المستخلصات المستخدمة، ومدى ارتباطها بمحتوى النبات من هذا العنصر.

وأوضحت هذه الدراسات أن الأراضى الجيرية تتميز بطول فترة بقاء تركيزات المنجنيز فى صورتها النشطه إذا قورنت بالأراضى الرسوبية؛ نظرا لانخفاض سعتها التبادلية، وقلة النشاط الحيوى بها.

ثالثا ـ الزنك:

يتراوح الزنك الكلى بالأراضى الجيرية من ١٨ ـ ٢٨ جزءاً فى المليون، فى حين تقع الصورة القابلة للاستفادة فى المدى بين ١,١ ـ ١,٨ جزءاً فى المليون. ويزداد محتوى النباتات النامية بالأراضى الجيرية نتيجة إضافة سلفات الزنك للأراضى التى تحتوى على ٢٠ ـ ٧٠٪ من كربونات الكالسيوم؛ مما يشير إلى نقص الزنك بها. كما تزداد فاعلية الزنك عند إضافته فى صورة مخلبية. ومن ناحية أخرى يتناقص محتوى النبات من الزنك بزيادة الفوسفور المضاف، وأيضا بزيادة محتوى الأراضى من كربونات الكالسيوم.

*** مستوي العناصر الكبري والصغري بالأراضي المخصصة لزراعة القطن ١٩٩٠**

قام معهد بحوث الأراضى والمياه بتجميع عينات من أراضٍ تمثل زراعات القطن عام (١٩٩٠)؛ حيث قدرت بها مستويات العناصر الكبرى والصغرى باستخدام مستخلصات كيماوية خاصة بكل عنصر. وقد استهدفت الدراسة تحديد مستويات كل عنصر بالمناطق المختلفة لزراعة القطن؛ بهدف الإسهام فى وضع تصور أفضل للسياسة السمادية لهذا المحصول. ويوضح جدول (١٥) مستوى صلاحية العناصر الكبرى والصغرى (جزء فى المليون) فى المناطق التى أجريت بها هذه الدراسة.

جدول رقم (١٥) : مستوى العناصر الكبرى والصغرى (جزء فى المليون) بأراضى القطن لموسم ١٩٩٠

المحافظة	المركز	N	P_2O_5	K_2O	Zn	Fe	Mn
١ـ القليوبية	قليوب	٢٠,٠٠	٤٦,٠٠	٦٢٦,٠٠	٢,٤٠	٥,٠٠	٦,٧٠
	بنها	٢٤,٤٠	٣٥,٩٠	٥٩٦,٠٠	٢,٦٠	٤,٧٠	١٤,٣٠
	شبين القناطر	٢٤,٧٠	٤٩,٧٠	٥٩٠,٠٠	٢,٠٠	٤,٦٠	٦,١٠
	الخانكة	٢١,٠٠	٤٢,٢٠	٣٢٣,٠٠	٣,٤٠	٧,٨٠	١٣,٨٠
	كفر شكر	٢٢,٦٠	١٤,٣٠	٥٥٢,٠٠	١,٧٠	٥,٥٠	١٠,١٠
	طوخ	١٧,٥٠	٢٥,١٠	٥٩٠,٠٠	٢,٣٠	٦,٩٠	١٥,١٠
	القناطر الخيرية	٢٣,٢٠	٦٠,٠٠	٦٠٥,٠٠	١,٣٠	٤,٩٠	٢,٩٠
	المتوسط العام	٢١,٩٠	٣٩,٠٠	٥٥٥,٠٠	٢,٣٠	٥,٦٠	٨,٠٠
٢ ـ المنوفية	شبين الكوم	٣٨,٠٨	٣,٣٧	٤٣١,٠٨	١٤,٦٩	٥,٥٥	٢,٧٢
	الباجور	٣١,٨٢	٤,١٩	٤٢٤,٩٧	١٨,٩١	٦,٠٦	١,٧٩
	الشهداء	٢١,٣٠	٥,٠٣	٤٩١,٨٣	١٨,٢٦	٥,٤٩	١,٦٨
	بركة السبع	٢٠,٩٥	٥,٦٧	٤١٩,٠٥	١٩,٤٣	٥,٩	١,٤٨
	أشمون	١٨,٧٥	٤,٥٤	٤٩٨,٠٠	١٢,٧٥	٥,٠	١,٧٨
	قويسنا	٢٣,٩٥	٤,٦٥	٠	١٧,٦٢	٥,٣٨	١,٧٢
	المتوسط العام	٢٥,٨١	٤,٥٨	٤٤٤,١٢	١٦,٩٤	٥,٥٨	١,٨٦
٣ ـ الشرقية	الزقازيق	٤١,٠٠	٣,٢٠	٤٣٠,٠٠	٣,٦	٣٢,٠	٦,٠٠
	مينا القمح	٢٣,٠٠	٢,٤٠	٤٢٠,٠٠	٢,٧	٢٦,٠	٥,٦٠
	بلبيس	٢٢,٠٠	٢,٢٠	٤٠١,٠٠	٤,٣	٢٣,٠	٣,٦٠
	أبو حماد	٩,٠٠	٢,٤٠	٤٥٩,٠٠	٢,٦	٢٩,٠	٥,٠٠
	كفر صقر	٤٥,٠٠	٧,٠٠	٣٩٢,٠٠	٢,٨	٢٥,٠	٥,٨٠
	أولاد صقر	٣٤,٠٠	٣,٦٠	٣٨٢,٠٠	٢,٧	٣٠,٠	٦,٠٠
	ههيا	٢٥,٠٠	٣,٠٠	٣٩٨,٠٠	٣,٠	٢٩,٠	٤,٧٠
	أبو كبير	٢٥,٠٠	٢,٥٠	٣٧١,٠٠	٣,٤	٣٢,٠	٤,٤٠
	الإبراهيمية	٢٠,٠٠	٢,٣٠	٣٦٧,٠٠	٢,١	٢٣,٠	٥,٠٠
	ديرب نجم	٣٨,٠٠	٢,٥٠	٣٧٣,٠٠	٣,٥	٣١,٠	٣,٨٠
	القنايات	٥٣,٠٠	٣,٠٠	٣٨٨,٠٠	٣,١	٢٩,٠	٦,٧٠
	الحسينية	٥٣,٠٠	٣,٢٠	٣٤٣,٠٠	٣,٢	٢٥,٠	٦,٥٠
	فاقوس	١٨,٠٠	٢,٣٠	٤٢٣,٠٠	٣,٢	٢٩,٠	٦,٠٠
	مشتول	١٦,٠٠	٢,٩٠	٤١٥,٠٠	٧,٢	٢٣,٠	٢,٧٠
	المتوسط العام	٣٢,٠٠	٣,١٠	٣٩٥,٠٠	٣,٠	٢٨,٠	٥,٣٠
٤ ـ البحيرة	أبو حمص	٤٥,٩٠	٥,٢٠	٤٨٨,٠٠	٢٢,٤	٤,٤	٢,٢
	دمنهور	٤٦,٢٠	٤,٨٠	٥٣٣,٠٠	١٩,٧	٣,٨	٢,١

(تابع) جدول رقم (١٥) : مستوى العناصر الكبرى والصغرى (جزء فى المليون) بأراضى القطن لموسم ١٩٩٠

المحافظة	المركز	N	P_2O_5	K_2O	Zn	Fe	Mn
	إيتاى البارود	٣٣,٥٠	٤,٩٠	٤٨٤,٠٠	٢٦,٣	٣,٨	٢,٠
	المتوسط العام	٤١,٨٥	٤,٩٥	٥٠٢,٠٠	٢٢,٨	٤,٠	٢,١
٥ ـ كفر الشيخ	قلين	١٥,٢٠	٣,٣٠	٤٨٧,٠٠	٣,٣	٣,٧	٢٤,٩
	الحامول	١٤,٣٠	٣,٢٠	٤٧٥,٠٠	٢,١	٤,٢	٣٠,١
	مطوبس	١٣,٣٠	٢,١٠	٤٨٧,٠٠	٢,١	٣,٤	٢٨,١
	فوة	١٤,٣٠	٣,٨	٥١٠,٠٠	٢,٢	٤,٧	٣٠,٦
	الرياض	١٧,٤٠	١,٨	٤٠٧,٠٠	٢,٠	٣,٢	٢٧,٢
	سيدى سالم	١٨,٥٠	٣,٥	٤٤٩,٠٠	٢,٤	٣,٤	٢٦,٩
	كفر الشيخ	٢٠,٢٠	٣,٣	٤٧٩,٠٠	١,٩	٤,١	٣٠,٠
	بيلا	٢٥,٦٠	٣,٣	٥٩٠,٠٠	٢,٠	٥,٠	٣٥,٢
	دسوق	١٩,١٠	٣,٣	٤٧٨,٠٠	٢,١	٣,٧	٣٠,٢
	المتوسط العام	١٧,٥	٣,٣	٤٨٥,٠٠	٢,١	٣,٩	٢٩,٢
٦ ـ دمياط	الزرقا	٢٨,٨	١٢,١	٤٧١,٠٠	٢٧,٠	١٣,٠	٤,٤٥
	فارسكور	٢٩,٢	١٠,٤	٥٥٩,٠٠	٢٢,٦	١٦,٣	٣,٩٠
	كفر سعد	١٨,٤	١١,٩	٥٤٣,٠٠	٢٨,٨	١٤,٧	٤,١
	المتوسط العام	٢٥,٥	١١,٥	٥٢٤,٥٠	٢٦,٢	١٤,٦	٤,١
٧ ـ الفيوم	الفيوم	٢١,٠	٢١,٥	٦٢١,٠٠	٣,٣	١٦,٠	١٥,٨
	إطسا	٢٣,٤	٢٤,٠	٦٢٦,٠٠	٣,٠	١٥,٣	١٧,٧
	سنورس	٢٢,٠	٢٢,٠	٦٣٨,٠٠	٣,٤	١٣,٢	٢٠,٨
	أبشواى	٢٧,٠	٢٦,٠	٦٠٥,٠٠	٣,٥	١٦,٤	١٦,٩
	طامية	٢٤,٠	٢١,٦	٥٦٢,٠٠	٣,٩	٢٤,٨	١٦,٥
	المتوسط العام	٢٣,٥	٢٣,٠	٦٠٩,٠٠	٣,٤	١٧,٢	١٧,٥
٨ ـ بنى سويف	الواسطى	٢٦,٠	٢٨,٠	٥٩٤,٠	٢,٣	٢٥,٠٠	١٦,٠٠
	بنى سويف	١٩,٠	٢٨,٠	٧٣١,٠	٣,٧	٢٧,٠٠	١٨,٠٠
	ببـــا	٢٨,٠	٢٦,٠	٦٦٦,٠	٢,٨	٢٦,٠٠	١٨,٠٠
	أهناسيا	٣٥,٠	١٥,٠	٧٩٥,٠	٣,٨	٢٦,٠٠	٢١,٠٠
	سمسطا	٤٢,٠	٢١,٠	٦٤٨,٠	٣,١	٢٤,٠٠	١٨,٠٠
	ناصر	١٠,٠	٣١,٠	٦٥٤,٠	٢,٥	٢٧,٠٠	١٤,٠٠
	الفشن	٢٩,٠	١٣,٠	٧٣٧,٠	٤,٧	٣٢,٠٠	١٧,٠٠
	المتوسط العام	٢٨,٥	٢٣,٠	٦٩٠,٠	٣,٣	٢٧,٠٠	١٧,٠٠
٩ ـ المنيا	مغاغة	٢١,٦	١٧,٨	٦١٣,٠	٤,٩	٣٥,٠٤	٢٤,٢٩
	بنى مزار	١٨,٢	٣٣,٠	٨٣٥,٠	٢,٩٤	٢٣,٧٢	١١,٦٦

(تابع) جدول رقم (١٥) : مستوى العناصر الكبرى والصغرى (جزء فى المليون) بأراضى القطن لموسم ١٩٩٠

المحافظة	المركز	N	P_2O_5	K_2O	Zn	Fe	Mn
	العدوه	١٧,٠	١٨,٠	٥٢٣,٠	٣,١٩	٢٢,٩٤	٩,٦٩
	سمالوط	٢١,٠	٢٠,٠	٤٤٨,٠	٣,٨٢	١٩,٨٧	١١,٢٩
	مطاى	٢٤,٤	٢٦,٢	٦٦٧,٠	٣,٣٤	٩١,٠٦	١٢,٣٢
	المنيا	٣١,٨	٣٦,٠	٦٤٨,٠	٣,٨٥	٢٨,٦٦	١٢,٥٣
	ملوى	٢٠,٦	٣٥,٨	٦٣٦,٠	٢,٨٢	٣٧,٨٨	٢٧,٦٩
	أبو قرقاص	٢٢,٤	٢٤,٩	٤٨٦,٠	٤,٢٧	٢٤,٠٧	١١,٣٠
	دير مواس	١٨,٠	٢٨,٧	٥٢٧,٠	٢,٩٩	١٠,١٥	١١,٨١
	المتوسط العام	٢١,٣	٢٦,٨	٥٨٩,٥	٣,٦٠	٢٧,٠٠	١٤,٧٠
١٠ ـ أسيوط	أسيوط	٧٤,٠	٨,٦	٤٨٨,٠	١,١	١٤,٠	٦,٦
	الغنايم	٧٤,٠	٧,٨	٥١٢,٠	١,٣	١٤,٠	٨,٠
	ساحل سليم	٦٦,٠	٨,٦	٤٦٩,٠	١,٢	١٤,٠	٦,٦
	صدفا	٩٨,٠	٨,٥	٤٢٨,٠	١,٣	١٤,٠	٧,٤
	الفتح	٧٧,٠	٧,٨	٤٨٩,٠	١,٣	١٥,٠	٧,٠
	البدارى	٥٦,٠	٧,٨	٤٢٠,٠	١,٢	١٥,٠	٧,٠
	القوصية	٧٢,٠	٧,٥	٤٣٣,٠	١,١	١٣,٠	٧,٩
	منفلوط	٧٤,٠	٨,٠	٤٧٦,٠	١,٢	١٦,٠	٧,٠
	أبنوب	٧٥,٠	٧,٨	٤٤٦,٠	١,٢	١٦,٠	٦,٩
	ديروط	٧٥,٠	٨,٠	٤٧٦,٠	١,٧	١٣,٠	٦,٧
	أبو تيج	٧٨,٠	٧,٦	٤٧٢,٠	١,٤	١٤,٠	٧,٧
	المتوسط العام	٧٤,٠	٧,٦	٤٧٢,٠	١,٤	١٤,٠	٧,٢
١١ ـ سوهاج	طهطا	٨٦,٨	٥,٢	٤٨٩,٠	١,٥	١٨,٨	١٠,٨
	المنشأة	٦٥,١	٦,٢	٣٥٧,٠	٢,١	١٣,٥	٩,١
	ساقلته	٦١,٦	٣,٣	٤١١,٠	١,٣	١٥,١	١٥,٨
	جرجا	١٠٠,٠	٥,١	٤٢٨,٠	١,٤	١٩,٤	٩,٩
	البلينا	٧٣,٠	٥,٣	٤٧٨,٠	١,٦	١٥,٠	١١,١
	المراغة	٨٦,٠	٦,٤	٤٣٥,٠	١,٩	١٥,٣	١٢,٢
	سوهاج	٨٨,٦	٥,٤	٤٢٢,٠	١,٤	١٥,٥	٩,٩
	دار السلام	٨٠,٩	٥,٩	٤١٨,٠	١,٥	١٦,٩	١٠.٤
	أخميم	٣٨,٨	٤,٨	٤٧٢,٠	١,٤	١٤,٤	١٦,٠
	جهينة	٩٧,٢	٦,٥	٤٤٤,٠	١,٤	١٧,١	٩,٢
	طمسا	٨٠,٢	٥,٤	٤٣٧,٠	١,٨	١٦,١	١٠,١
	المتوسط العام	٧٨,٠	٥,٤	٤٣٦,٠	١,٨	١٦,١	١١,٣

وقد استخدمت القيم الواردة فى الجدول السابق فى تقدير التوصيات السمادية لانتاج محصول القطن؛ استرشادا بالحدود الحرجة لكل عنصر، واتجاه استجابة المحاصيل المختلفة للأسمدة المضافة تحت ظروف مستويات مختلفة من صلاحية العناصر. وفيما يلى الحدود المستخدمة لصلاحية العناصر (بالجزء فى المليون).

العنصر	منخفض	متوسط	مرتفع
النتروجين	أقل من ٤٠	٤٠ ـ ٨٠	أعلى من ٨٠
الفوسفور	أقل من ١٠	١٠ ـ ١٥	أعلى من ١٥
البوتاسيوم	أقل من ٢٠٠	٢٠٠ ـ ٤٠٠	أعلى من ٤٠٠
المنجنيز	أقل من ١,٨		أعلى من ١,٨
الزنك	أقل من ١,٠	١ ـ ١,٥	أعلى من ١,٥
الحديد	أقل من ٢,٠	٢ ـ ٤	أعلى من ٤,٠

ويتضح بجلاء أن مركز العناصر الكبرى والصغرى بالأراضى القديمة تسلك سلوكا خاصا تحكمه بعض الاتجاهات تتمثل فى افتقار هذه الأراضى بصفة عامة إلى عنصر النتروجين الذى يستدعى ضرورة إضافة الاحتياجات النتروجينية كلها لإنتاج المحاصيل، فى حين أوردت النتائج وجود مساحات محدودة يرتفع بها المحتوى النتروجينى نسبيا؛ نتيجة تطبيق بعض المعاملات الزراعية، وكذلك الدورة الزراعية المتبعة.

أما من حيث عنصر الفوسفور فيلاحظ أن الأراضى يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات يتواجد بها الفوسفور بمستويات صلاحية مختلفة، يمكن على أساسها وضع الأسلوب المناسب للتسميد، مع ملاحظة تواجد مساحات كبيرة نسبيا تعانى نقص الفوسفور الصالح بها عن الحد الحرج. يختلف نسبة تواجد هذه المساحات باختلاف المحافظات.

ومن جهة أخرى يتواجد عنصر البوتاسيوم بكميات مرتفعة وكافية فى هذه الأراضى؛ بحيث تغطى احتياجات المحاصيل؛ ومن ثم لاتشمله التوصيات السمادية بصفة عامة.

وقد أوردت النتائج الخاصة بالعناصر الصغرى اتجاهات جديدة لسلوك هذه العناصر بالأراضى المصرية؛ حيث أظهرت التقديرات أن عنصر الزنك تفتقر إليه مساحات بالمناطق المدروسة حيث يقل بها الزنك الصالح عن الحد الحرج، فى حين يتواجد بكميات متوسطة فى مساحات كبيرة نسبيا.

ويتواجد الحديد والمنجنيز الصالح للاستفادة بمستويات أعلى من الحدود الحرجة لهذه العناصر وإن أظهرت بعض التقديرات انخفاض قيم المنجنيز الصالح فى بعض المناطق قد تستجيب بها المحاصيل المنزرعة عند إضافة هذا العنصر.

وقد قام معهد بحوث الأراضى والمياه باستخدام قيم صلاحية العناصر فى وضع برنامج تسميدى لمحصول القطن لكل منطقة، مع الوضع فى الحسبان اتجاهات الاستجابة لهذه الإضافات بالتجارب الحقلية التى يقوم بتنفيذها.

السياسة السمادية في مصر:

يمكن تعريف السياسة السمادية بأنها الأسلوب المتبع لتحقيق أحكام استخدام الأسمدة؛ عن طريق تقدير المقررات السمادية المختلفة للحاصلات، ونوعيات الأراضى، والظروف المرتبطة بالإنتاج، والدورات الزراعية، والتراكيب المحصولية، بالإضافة إلى تقليل فواقد الأسمدة وزيادة كفاءتها؛ للحصول على عائد اقتصادى مجزٍ.

وجدير بالذكر أن تقدير المقررات السمادية يعتمد ـ بصفة أساسية ـ على نتائج التجارب الحقلية الخاصة بتسميد الحاصلات تحت ظروف مختلف أنواع الأراضى والحاصلات والأصناف المزروعة بمختلف المناطق ومناقشة وتحليل نتائج هذه التجارب، مع الأخذ فى الحسبان الدراسات الخاصة بمنحنى الاستجابة للعناصر وأسعار الأسمدة والناتج المحصولى لتحديد المعدل السمادى الاقتصادى الأمثل لكل محصول.

كما يؤخذ فى الحسبان كل من نتائج الدراسات الخاصة باختبارات التربة، والتركيب المحصولى، والدورة الزراعية المتبعة، والأثر المتبقى للأسمدة العضوية والمعدنية المستخدمة، وسياسات التكثيف الزراعى، والأصناف الجديدة العالية الإنتاج.

ويشير تقرير معهد بحوث الأراضى والمياه (١٩٩١) إلى أن الأسس العلمية والتكنولوجية والاقتصادية المتبعة حاليا فى تخطيط السياسة السمادية للبلاد لها إيجابياتها وفعاليتها فى التخطيط الزراعى وتحقيق معدلات عالية من الإنتاج.

ومما لا شك فيه أن الأسس التى تعتمد عليها السياسة السمادية الحالية تشكل إحدى الركائز التى يجب الأخذ بها فى تقرير السياسة السمادية فى المستقبل بعد تطوير بعض النواحى المرتبطة بالأساليب العلمية فى تقدير المقررات السمادية بصورة أكثر تحديدا، مع العمل على ترشيد استخدام السماد لتحقيق أكثر إفادة من السماد المضاف.

ويؤخذ على الأسلوب الحالى لتقدير المقررات السمادية الاعتماد ـ بصفة أساسيـة ـ على النتائج المتحصل عليها من التجارب الحقلية فى المناطق المختلفة للجمهورية؛ بحيث تعمم اتجاهاتها بكل منطقة دون تحديد التباين فى خصوبة الأراضى على مستوى المزرعة.

ومما لا شك فيه أن اتباع نظام اختبارات التربة له دوره الإيجابى فى التحديد الفعال للمقررات السمادية على مستوى الحقل، برغم المعوقات التى تواجه تنفيذ هذا الأسلوب، وكذلك الاحتياجات المعملية والتنظيمية التى تضمن تطبيقه بصورة مثالية.

وفى هذا المجال أجريت دراسات خاصة (الزناتى وآخرون ١٩٨٢) بمشروع تطوير الرى الحقلى بوزارة الأشغال والموارد المائية، استهدفت التعرف على مستوى صلاحية العناصر الغذائية بالأراضى، بالإضافة إلى تحديد جدوى اتباع أسلوب اختبارات التربة تحت الظروف المصرية. كما استهدفت هذه الدراسات ـ بصفة أساسية ـ الوصول

إلى الأعداد المثلى من عينات التربة التى تؤخذ على مستوى الحوض لتحديد مستويات صلاحية العناصر الكبرى والصغرى؛ بحيث يمكن تقرير الاحتياجات السمادية للمحاصيل.

وفى هذه الحالة تكون التوصيات أكثر تحديدا إذا قورنت بالتوصيات العامة التى يقررها الأسلوب المتبع حاليا، والتى تعتمد ـ كما سبق ذكره ـ على تعميم نتائج التجارب المقامة بمنطقة معينة؛ بحيث تطبق فى أراضى المنطقة كلها برغم التباين فى مستوى خصوبة الحيازات المكونة للمنطقة؛ مما ينعكس على كفاءة استخدام الأسمدة المضافة.

وقد أوضحت الدراسة ـ التى أجريت بمناطق المشروع الثلاث بالدلتا والوجه القبلى والبالغ مساحتها الكلية حوالى ٥٠٠٠ فدان ـ الاتجاهات التالية:

١ ـ انخفاض المحتوى الفوسفورى لمعظم أراضى الدراسة إلى المستوى الذى يمكن من حدوث استجابة فى المحصول نتيجة الإضافات السمادية.

٢ ـ انخفاض مستويات الزنك الصالح للاستفادة بأغلب الأراضى؛ مما يعطى مؤشرا جديدا لاستخدام العناصر الصغرى فى الزراعة المصرية.

٣ ـ ارتفاع مستوى صلاحية البوتاسيوم والمنجنيز والنحاس.

٤ ـ يتواجد الحديد بقيم عالية فى الأراضى الثقيلة فى حين يصل إلى الحد الحرج فى الأراضى الخفيفة.

وقد أشارت الدراسة إلى إمكان تطبيق اختبارات التربة على مستوى الحوض؛ حيث أظهرت التحليلات الإحصائية تماثل الحيازات المكونة للحوض الواحد نظرا لتماثل المعاملات الزراعية وأسلوب الإنتاج به،وخاصة فى مناطق المنيا وكفر الشيخ. وعلى العكس من ذلك يختلف هذا التماثل فى حالة الحوض الواحد بالنسبة للمناطق الزراعية التى تتفتت بها الحيازة؛ كما هو حادث بمنطقة المنصورية بالجيزة التى يتباين بها التركيب المحصولى؛ ومن ثم خواص الأراضى، ومستوى خصوبتها.

ويقترح التقرير ـ بناء على النتائج المتحصل عليها ـ القيام بتحديد المقررات السمادية باستخدام أسلوب اختبارات التربة للحوض الواحد؛ وذلك بتجميع ٣٠عينة فى حالة المناطق غير المتفتتة الحيازات؛ حيث أوضحت مستوى ثقة عالية بالنسبة لعنصرى الفوسفور والزنك. ومما لاشك فيه أن اتباع أسلوب اختبارات التربة على مستوى الحوض سيقلل ـ إلى حد كبير ـ من الجهد والتكلفة والإدارة عما لو اتبع على مستوى المزرعة الواحدة.

طمي النيل وخصوبة الأراضي المصرية:

معظم الأراضى الزراعية المصرية أراضٍ منقولة. ويعتبر طمى النيل الناتج من تحلل الصخور البازلتية والجرانيتية بهضبة الحبشة مادة الأصل لكل من أراضى الوادى والدلتا الرسوبية.

وخلال فترة ما قبل بناء السد العالى بلغ المتوسط السنوى لرواسب طمى النيل ـ التى تدخل الأراضى المصرية ـ حوالى ١٣٥مليون طن سنويا، تناقصت بعد إنشاء السد؛ حيث بلغ ما يصل إلى بحيرة السد ما يقرب من ٨٥ مليون طن سنويا تترسب بالجزء الجنوبى للبحيرة.

وخلال فترة الجفاف التى أصابت القارة الإفريقية وما تبعها من انخفاض إيراد النيل حدثت إزاحة للترسيبات الموجودة بالجزء الجنوبى للبحيرة نحو الشمال؛ حيث وصل سمكها إلى حوالى ٤ ـ ٩ متر فى منطقتى قسطل وأدندان.

وتشير دراسات معهد بحوث الآثار الجانبية للسد العالى إلى أن أقصى سمك لهذه الترسيبات يتكون فى أقصى الجنوب عند الحدود السودانية.

وتقدمت هذه الترسيبات نحو الشمال خلال فترة من (١٩٧٥ ـ ١٩٨٦).

ويعتبر طمى النيل مادة الأصل للأراضى المصرية، علاوة على أهميته فى رفع مستوى العناصر الغذائية وصيانتها بالتربة. ويبلغ متوسط ما يترسب سنويا على الأرض الزراعية حوالى ٠,٩ ملليمتراً (بول ١٩٣٩)؛ بما يوازى ٥,٦٧طناً للفدان؛ أى بكمية كلية تصل إلى ٣٤ مليون طن للرقعة الزراعية كلها.

مكونات طمي النيل:

يبلغ متوسط محتوى ترسيبات طمى النيل من الرمل والسلت والطين ٢١,٧٪، ٢٩,١٪، و٤٣,٩٪، وتتكون أساسا من الكوارتز، يليه معدن الكاؤولينيت والمونتموريللونيت والإليت، مع كميات صغيرة من معادن البلاجيوكلاز والكالسيت. وفيما يلى المحتوى العضوى والعنصرى لكمية طمى النيل / فدان التى تترسب سنويا بالأراضى الزراعية:

كمية طمى النيل	٥,٦٧طناً	المنجنيز	٩,٠كيلو جرامات
كمية الطين	٢,١٠طناً	الزنك	١,٨ كيلوجرام
المادة العضوية	٢٣٥كيلو جرام	النحاس	١,٨ كيلوجرام
البوتاسيوم	٤٠ كيلو جرام		
النتروجين	٧,٢ كيلو جرام		
الفوسفور	٤,٠ كيلو جرام		

وقد انعكس غياب ورود طمى النيل للأراضى المصرية على ما يضيفه سنويا من العناصر الغذائية والمادة العضوية، إلا أنه يجب أن نأخذ ـ فى الحسبان ـ عوامل التربة المختلفة التى تحدد مدى صلاحية هذه المكونات ومدى تيسيرها للنبات.

وتنخفض القدرة الإمدادية للبوتاسيوم وصوره المختلفة لطمى النيل إذا قورن بالأراضى الرسوبية والجيرية، فى حين تفتقر الأراضى الرملية فى مستوى صور هذا العنصر طبقا لنتائج الزناتى (١٩٧٠). ويعتبر محتوى الأراضى المصرية من هذا العنصر كافيا لمواجهة الاحتياجات البوتاسية للمحاصيل فيما عدا الأراضى الرملية. ولم يؤدِّ غياب ورود طمى النيل إلى إحداث تغييرات فى هذا الاتجاه.

أما من حيث المحتوى الفوسفورى لطمى النيل فإن تواجده فى صور عنصرية ـ وكذلك وجود المركبات المعقدة من الطين والمواد العضوية وزيادة محتواه من الحبيبات

الدقيقة ـ يسهم فى زيادة فعالية الفوسفور وصلاحيته للنبات. ولم يؤثر غياب طمى النيل فى الأسلوب المتبع لمواجهة الاحتياجات الفوسفورية فى الزراعة المصرية أو فى اتجاه الاستجابة للإضافات الفوسفورية.

وتبلغ نسبة الكربون: النتروجين بطمى النيل حوالى ١٤,٥ ؛ وهى نسبة تتناسب مع معدنة النتروجين العضوى وصلاحيته للامتصاص النباتى. إلا أن ارتباط المادة العضوية بمعادن الطين تؤثر نسبيا على مدى قابلية النتروجين العضوى للتحول إلى الصور المعدنية الصالحة للاستفادة.

وتصل نسبة المادة العضوية بطمى النيل إلى حوالى ٢,٩٥٪، ٣,٨٤٪، ٥,٦٪ لكل من الرمل والسلت والطين على الترتيب. كما يزداد محتوى الطمى من المواد العضوية بزيادة نسبة الطين والسلت نبهان (١٩٦٦).

وتبلغ كمية المادة العضوية الموجودة فى صورة دبالية ـ والتى يضيفها الفيضان إلى الفدان الواحد ـ ما يقرب من ٢٣٥ كيلو جرام حرمت منها الأرض المصرية بعد إنشاء السد العالى. وهذه الكمية لها دورها الكبير فى تحسين خواص التربة الطبيعية والكيماوية والحيوية، وقد انعكست آثار غيابها على خواص الأراضى. ويجب أن تسهم الأسمدة العضوية فى احتواء هذه الآثار لتعويض الدور الهام الذى كان يلعبه طمى النيل فى خصوبة أراضينا؛ باعتبارها بديلا لا غنى عنه.

إن غياب هذه الإضافة لها تأثيرها على الأراضى المصرية؛ نظرا لنقص الموارد العضوية المتاحة عن الاحتياجات الفعلية.

وقد شهدت الزراعة المصرية استجابة بعض المحاصيل لإضافات العناصر الصغرى بالأراضى القديمة، ترجع بالدرجة الأولى إلى استخدام الأصناف العالية المحصول، وزيادة المقررات النتروجينية، ونقاوة الأسمدة الكيمياوية؛ مما يسبب استنزاف محتوى هذه الأراضى من هذه العناصر، وانخفاض مستوياتها تبعا لذلك. ومما لا شك فيه أن الإضافات السنوية من طمى النيل تلعب دورا كبيرا فى تعويض تناقصها بالأراضى.

وبمقارنة استهلاك الزراعة المصرية للأسمدة الكيماوية ـ قبل إنشاء السد العالى وبعده ـ نجد زيادات كبيرة فى استهلاك كل من الأسمدة النتروجينية والفوسفورية تصل إلى حوالى ٤ أضعاف؛ فبينما بلغ الاستهلاك خلال فترة (١٩٥٠ ـ ١٩٥٤) حوالى ٦١٠ ألف طن من السماد النتروجينى، و١٢١ ألف طن من السماد الفوسفورى؛ فقد ارتفع الاستهلاك ليصل إلى ٢٥٠٠ ألف طن، و ٤٢٠ ألف طن من الأسمدة النتروجينية والفوسفورية على الترتيب خلال (١٩٧٤ / ١٩٧٥). وترجع هذه الزيادة ـ بالدرجة الأولى ـ إلى الاتجاه نحو زيادة المقررات السمادية بناء على ما أسفرت عنه الدراسات والبحوث من مؤشرات تبنتها السياسة السمادية.

وقد تزايد الاستهلاك ـ أيضا ـ نتيجة إدخال الأصناف العالية الإنتاج، وزيادة نسبة التكثيف المحصولى بالرقعة الزراعية كلها.

صيانة خصوبة الأراضي المصرية:

تعتبر خصوبة الأراضى أحد العوامل الهامة فى تحديد إنتاجية الأراضى؛ مما يستوجب العمل على صيانتها لمواجهة الاحتياجات الغذائية من خلال التطبيقات التالية:

أولا: العناصر الكبرى:

تتفق الآراء فى مجموعها على الاهتمام وتوجيه الجهود نحو زيادة إنتاج وتحسين الأسمدة العضوية؛ ومن ثم رفع مدى إسهامها فى مواجهة الاحتياجات النتروجينية للمحاصيل، إلى جانب الاهتمام بتعميم التلقيح البكتيرى لأراضى البقوليات، والعمل على زيادة معدلات معدنة النتروجين العضوى بالتربة الزراعية من خلال تحسين الخواص الطبيعية للأراضى. وفى الوقت نفسه يمكن اتباع بعض الأساليب التى تسهم فى صيانة هذا العنصر؛ من حيث إعادة بقايا المحاصيل الزراعية، وقلب النباتات بالأراضى للانتفاع بها كسماد أخضر. ويفضل فى هذه الحالة النباتات البقولية التى تتميز بارتفاع محتواها النتروجينى نتيجة النشاط البكتيرى بجذور البقوليات.

ويرى عيد (١٩٥٩) أنه يمكن سد جزء كبير من العجز فى الميزان الفوسفورى للزراعة المصرية عن طريق تحسين وسائل الإنتاج، وكذلك القيمة السمادية للأسمدة البلدية.

ويتميز المركز العام للبوتاسيوم فى الزراعة المصرية بتوازن كبير عكس الحال فى الأزوت أو الفوسفور؛ مما يشير إلى اعتبار أن الأراضى المصرية لا تعانى استهلاكا ذاتيا من ناحية البوتاسيوم الصالح للامتصاص النباتى بها.

ويشير عيد (١٩٥٩) إلى أن وضع عنصر البوتاسيوم يعتبر خاصا بمقارنته بهذين العنصرين، ويمكن دراسته كعنصر غذائى فى حالات خاصة وليس من الناحية العامة؛ مثل حاجة الأراضى الرملية إلى البوتاسيوم، وكذلك بعض الحاصلات الزراعية. وعلاوة على ماسبق.. يرى عيد أن تحسن إنتاج السماد البلدى الطبيعى يسهم فى الاستغناء عن استيراد وصناعة البوتاسيوم للزراعة المصرية.

ثانيا ـ العناصر الصغرى:

أشار بكمان وبرادى (١٩٦٠) إلى أن استخدام مخصبات العناصر الدقيقة (الزنك ـ الحديد ـ النحاس ـ المنجنيز) سيواجه تطورات كبيرة فى المستقبل؛ حيث تنصب كل المجهودات حاليا على عناصر النتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم. كما أن استمرار الزراعة باستخدام العناصر الكبرى سوف يؤدى حتما إلى إنهاك تدريجى للكميات الصغرى من العناصر الصغرى؛ مما يسبب انخفاض مستوياتها إلى ما تحت المستويات اللازمة لبعض المحصولات؛ ومن ثم يؤدى ذلك إلى ظهور أعراض نقصها على هذه المحاصيل.

ومما لا شك فيه أن تحديد مستويات العناصر الصغرى بالأراضى القديمة علاوة على الأراضى الجديدة ـ سواء الجيرية أم الرملية ـ يجب أن تكون لها الأولوية فى هذا الخصوص. كما أن تعيين الحدود الحرجة لكل عنصر تحت ظروفنا المصرية يجب أن تتناوله دراسات الباحثين من كافة الوجوه.

ويجب الأخذ فى الحسبان ما حققه إضافات عنصر الزنك من زيادات كبيرة فى محصول الأرز، علاوة على الآثار المتبقية لهذه الإضافات على إنتاجية المحاصيل التالية.

وتتناول دراسات الأراضى بعض المشاكل التى تواجه استخدام العناصر الصغرى بالأراضى المصرية؛ مثل عوامل ملوحة وقلوية الأراضى، علاوة على محتوى الأراضى من كربونات الكالسيوم، ومدى فاعلية استخدام الأسمدة العضوية فى التغلب على بعض المشاكل التى تواجه فاعلية إضافة العناصر الصغرى.

ولا شك فى أن التنسيق السليم بين مستوى العناصر الغذائية بالأراضى ـ وكذلك تلافى العوامل المساعدة لتكوين الملوحة والقلوية، وارتفاع مستوى الماء الأرضى، مع تحسين خواص الأراضى الطبيعية والكيماوية، إل جانب اتباع دورة زراعية مناسبة، وتحسن أسلوب تطبيق المعاملات الزراعية وخدمة الأراضى ـ يؤدى إلى صيانة خصوبة الأراضى وحفظها على مستوى اقتصادى مجزٍ. وفى هذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أن الظروف السائدة تحدد مدى الحاجة إلى تطبيق كل هذه الوسائل أو بعضها.

الفصل الثامن

مشاكل الأراضى الجديدة

obeikandl.com

obeikandl.com

مقدمة:

يعتبر التوسع الأفقى فى الأراضى الزراعية من الموضوعات الحيوية التى ترتكز عليها السياسة الزراعية فى مصر. وبالرغم من كبر حجم الاستثمارات التى تحتاج إليها برامج التوسع الأفقى إلا أن الضغوط الاقتصادية الناشئة عن المعدلات العالية للزيادة السكانية أعطت هذه البرامج الأولوية المطلقة من حيث التنفيذ.

وقد تناول موضوع استصلاح الأراضى الأفراد والجمعيات والشركات منذ وقت طويل، كما أعطته الدولة اهتماما كبيرا منذ قيام الثورة للآن. وبرغم هذا الاهتمام الكبير بهذه البرامج الطموحة إلا أنها ووجهت بعديد من السلبيات أدت إلى عدم تحقيقها التنمية المطلوبة.

وقد أجريت عديد من الدراسات لتقييم هذه البرامج وتحديد الدروس المستفادة، حتى يمكن الوصول إلى الأساليب التى تضمن الاستخدام الأمثل للموارد والاستثمارات. ومما لاشك فيه أن نظم الإدارة والتخطيط التى ارتبطت بهذه البرامج لها دورها الكبير فى الوصول إلى الأهداف المطلوبة.

برامج التوسع الأفقي في مصر:

اقترن موضوع التوسع الأفقى فى مصر بمجهودات عديدة من جانب الأفراد والهيئات منذ بداية هذا القرن، حيث أسفرت عن إضافة مساحات جديدة من الأراضى تضمنتها بيانات جدول (١٦)، الذى يشمل ما تم استصلاحه قبل عام (١٩٦٠)، وما تلاه من برامج حتى عام (١٩٩٢/٩١).

جدول (١٦) تطور استصلاح الأراضى فى مصر بالألف فدان

السنـــــة	ماتم استصلاحه خـلال السنـة	جمـلة ماتـم استصلاحـه	
ما قبل .. ـ ١٩٦٠	ـــــ	٧٨,٨	
١٩٦٠ ـ ١٩٦١	٢٨,٢	١٠٧,٠	
١٩٦١ ـ ١٩٦٢	٨٩,٤	١٩٦,٤	
١٩٦٢ ـ ١٩٦٣	١٢٢,٤	٣١٨,٨	
١٩٦٣ ـ ١٩٦٤	١٥٩,٤	٤٧٨,٢	
١٩٦٤ ـ ١٩٦٥	١٣٧,٠	٦١٥,٢	
١٩٦٥ ـ ١٩٦٦	١١٩,٦	٧٣٤,٨	
١٩٦٦ ـ ١٩٦٧	٥٦,١	٧٩٠,٩	
١٩٦٧ ـ ١٩٦٨	٣٤,٠	٨٢٤,٩	
١٩٦٨ ـ ١٩٦٩	٤٥,١	٨٧٠,٠	
١٩٦٩ ـ ١٩٧٠	٢١,٠	٨٩١,٠	
١٩٧٠ ـ ١٩٧١	٢١,٠	٩١٢,٠	
١٩٧١ ـ ١٩٧٢	ـــ	٩١٢,٠	
١٩٧٢ ـ ١٩٧٣	ـــ	٩١٢,٠	
١٩٧٣ ـ ١٩٧٤	ـــ	٩١٢,٠	
١٩٧٤ ـ ١٩٧٥	ـــ	٩١٢,٠	
١٩٧٥ ـ ١٩٧٦	ـــ	٩١٢,٠	
١٩٧٦ ـ ١٩٧٧	ـــ	٩١٢,٠	
١٩٧٧ ـ ١٩٧٨	ـــ	٩١٢,٠	
١٩٧٨ ـ ١٩٧٩	٥,٠	٩١٧,٠	
١٩٧٩ ـ ١٩٨٠	٧,٠	٩٢٤,٠	
١٩٨٠ ـ ١٩٨١	١٢٧,٠	١٠٥١,٠	
١٩٨١ ـ ١٩٨٢	٨١,٠	١١٣٢,٠	
١٩٨٢ ـ ١٩٨٣	٨٧,٠	١٢١٠,٠	
١٩٨٣ ـ ١٩٨٤	٤٥,٠	١٢٥٥,٠	جمـــلة الخطـــة
١٩٨٤ ـ ١٩٨٥	٥٢,٠	١٣٠٧,٠	الخمسية الأولى
١٩٨٥ ـ ١٩٨٦	١٠٠,٠	١٤٠٧,٠	٣٩٥,٠
١٩٨٦ ـ ١٩٨٧	١٢٠,٠	١٥٢٧,٠	
١٩٨٧ ـ ١٩٨٨	المستهدف فى الخطة		جملة مستهدف الخطة
١٩٨٨ ـ ١٩٨٩	الثانية استصلاح		الخمسية الثانيـــة
١٩٨٩ ـ ١٩٩٠	٧٥٠ ألف فدان		
١٩٩٠ ـ ١٩٩١	بمعدل ١٥٠,٠		
١٩٩١ ـ ١٩٩٢	ألـف فـدان سنـويا	(٢٢٧٧,٠)	٧٥٠,٠

المصدر: الهيئة العامة لمشروعات التعمير، التنمية الزراعية ـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى

obeikandl.com

وفى هذا المجال قامت وزارة الرى فى عام (١٩٧٧) بإعداد برنامج للتوسع الأفقى فى مساحة ٢,٨ مليون فدان، تم تعديله فيما بعد.

واسترشادا بالسياسة المائية لوزارة الرى التى أقرها مجلس الوزراء فى (١٩٨٥) (جدول١٧) يتضح أن الموارد المائية المتاحة للتوسع الأفقى حتى عام (٢٠٠٠) بلغت ٩,٣ مليار متر مكعب تكفى للتوسع فى مساحة ١,٧ مليون فدان. هذا بالإضافة إلى المساحات التى يمكن استصلاحها على مياه الصرف الصحى وعلى المياه الجوفية بالصحارى.

جدول (١٧) : الموارد المائية المتاحة للتوسع الأفقى بالمليار متر مكعب.

التاريـــخ	الموارد المتاحة	الاستخدامات	المتاح للتوسع
يوليو ١٩٨٧	٦١,٣	٦٠,٤	٠,٩
يوليو ١٩٩٣	٦٩,٨	٦٢,١	٧,٧
نهاية ٢٠٠٠	٧٣,٩	٦٤,٦	٩,٣

المصدر: وزارة الرى ـ السياسة المائية وعلاقتنا بدول حوض النيل.

وعلى هذا فقد أعدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خطتين خمسيتين تضمنت استصلاح مساحات جملتها ٦٣٦,٧ ألف فدان خلال الخطة الخمسية الأولى (١٩٨٣/٨٢ ـ ١٩٨٧/٨٦). أما الخطة الحالية (١٩٨٨/٨٧ ـ١٩٩٣/٩٢) فإنها تستهدف استصلاح ٧٥٠ ألف فدان بمعدل ١٥٠ ألف فدان فى السنة.

وقد تناول تقرير وكالة التنمية الأمريكية بالاشتراك مع وزراة الزراعة المصرية (١٩٧٦) المشاكل التى صاحبت برامج التوسع الأفقى فى مصر؛ حيث يأتى فى مقدمتها أسلوب اختيار مناطق التوسع والذى لم يتضمن الدراسات الكافية لتحديد الجدوى الاقتصادية لاستصلاح المناطق المختلفة. كما أدى التركيز على الاستثمارات الموجهة إلى الأراضى بصفة خاصة دون بقية المدخلات (كالأسمدة والإرشاد الزراعى والبحوث) إلى الإخلال بالتوازن المطلوب بين عوامل تنمية القطاع الزراعى بوجه عام.

كما تطرق التقرير إلى استعراض بعض العوامل المسببة لتدهور الأراضى المستصلحة؛ مثل ارتفاع مستوى الماء الأرضى، وسيادة الأراضى المتأثرة بالملوحة والتى تعزى بصفة أساسية إلى انخفاض كفاءة الصرف الحقلى، بالإضافة إلى عدم إقامة شبكات الصرف فى معظم هذه المناطق.

ويشير التقرير إلى أن عدم إدراج موضوع الصرف الحقلى فى خطط الاستصلاح يرجع ـ أساسا ـ إلى عدم توقع المسؤولين ظهور مشاكل الصرف الحقلى خلال فترة ١٠ـ١٥ سنة بهذه الأراضى؛ ومن ثم لم توضع موضع التنفيذ آنذاك. وحاليا تظهر الحاجة الملحة إلى تزويد معظم هذه المناطق بنظام صرف حقلى ذى كفاءة عالية؛ نظرا لما سببه انعدام الصرف الحقلى من رفع مستوى الماء الأرضى؛ حيث ارتفع فى بعض المناطق حوالى ٣ أمتار خلال ٦ سنوات.

وقد خلص التقرير إلى وضع بعض التوصيات التى تهدف إلى فعالية برامج التوسع الأفقى كما يلى:

أولا ـ وضع مخطط رئيسى للتوسع الأفقى:

تتواجد عدة مشروعات للتوسع الأفقى فى مناطق مختلفة لا يجمعها تخطيط محدد؛ مما يحتم إيجاد فريق متكامل يختص بمسؤولية وضع خطة شاملة تأخذ فى حسبانها مدى كفاية الموارد المائية لكل منطقة، ومدى مقدرة نظام الرى على توفير المياه اللازمة للتراكيب المحصولية المختلفة، بالإضافة إلى نظام الصرف الحقلى الذى يتواءم مع احتياجات الصرف، وتوصيف البنية الأساسية، ومدى كفاءتها لمواجهة احتمالات الزيادة فى عدد المنتفعين، واحتياجات رأس المال تحت ظروف الأراضى الجديدة، ومع التركيز ـ بصفة أساسية ـ على إجراء حصر تصنيفى تفصيلى لمناطق الاستصلاح؛ للوصول إلى استخدام أمثل لهذه الموارد.

ومن ناحية أخرى يجب تصميم المخطط الرئيسى للبرامج؛ بحيث يشمل التنفيذ حال الموافقة عليه، مع إعطائه سلطة توجيه أجهزة الرى والصرف والإسكان... إلخ،

وكذلك إعطاء البدائل وتكلفتها، مع حساب العائد والنتائج الخاصة بكل بديل. وفى الوقت نفسه يجب تحديد عامل الوقت والاحتياجات الفنية المحلية والأجنبية. ولا شك فى أن توصيف هذه العوامل وتحديدها يسهل لمتخذى القرار الوصول إلى إيجابيات مثالية.

ثانيا ـ إنشاء وحدة مسؤولة عن تنفيذ المخطط:

لاشك فى أن وضع المسؤولية كلها تحت تصرف جهاز واحد يؤدى إلى تلافى عديد من المشاكل؛ مثل تكرار المجهودات والأعمال، وتسهيل اتخاذ القرار. كما أن تعدد الاختصاصات والمسئوليات يؤدى فى النهاية إلى عدم كفاءة الإدارة بصفة عامة. ويؤدى افتقاد الاتصال بين الأجهزة المختلفة وعدم التنسيق بينها إلى نفس النتيجة.

ثالثا ـ إنشاء نظام حساب التكاليف والإدارة المزرعية:

يساعد هذا النظام على تتبع كفاءة العمليات المختلفة، ومدى الحاجة إلى تصحيح مسارها، علاوة على أنه يتيح عقد المقارنات، وتقدير الاحتياجات المستقبلية لبنود الميزانية، وتحديد العائد من برامج التوسع.

نظام الحيازة:

طرحت عدة بدائل تختص بنظام الحيازة للأراضى المستصلحة والتى تؤدى إلى استخدام أمثل لهذه الموارد؛ من خلال حسن الإدارة، وتوجيه عناصر الإنتاج؛ فقد أظهرت الإدارة الحكومية لهذه الأراضى سلبيات عديدة أحدثت تأثيراتها على أهداف البرامج. كما طرحت أيضا أحد البدائل وهى الشركات الاستثمارية، وهذا البديل يتيح استخدام رأس المال الأجنبى. وفى الوقت نفسه وجد البديل الثالث؛ وهو تقسيم الأراضى التى وصلت إلى مرحلة الإنتاج إلى وحدات إنتاج اقتصادية توزع على المزارعين والخريجين.

ومما لاشك فيه أن تقرير أحد هذه البدائل سيكون أكثر تعقيدا فى حالة الأراضى التى لم تصل إلى الحدية الإنتاجية.

وفى هذا المجال يوصى المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية ـ فى دراسته الخاصة بالأراضى الجديدة (١٩٨٥) ـ بقيام أجهزة الشركات المتخصصة المساهمة المصرية أو المشتركة بتنفيذ برامج استصلاح الأراضى بدلا من قيام شركات القطاع العام بهذا العمل؛ نظرا لقدرة الأولى على التحررمن البيروقراطية واتخاذ القرار.

وقد تناول المجلس موضوع تمليك الأرض الجديدة؛ حيث تبنى وجهة النظر التى توصى بعدم تفتيت الرقعة الزراعية بتوزيعها على الخريجين وصغار المزارعين، وما يتبع ذلك من تفاوت فى الإنتاجية واستنزاف مياه الرى؛ ولذا ركز المجلس على ضرورة قيام الشركات المساهمة المتخصصة بتحمل مسؤولية الاستصلاح والإنتاج للأسباب التالية:

أولا: قدرة هذه الشركات على تدبير التمويل اللازم ودخولها مجالات متنوعة للإنتاج والتصنيع والتسويق.

ثانيا: قدرة هذه الشركات على استخدام أساليب الرى الحديثة، وتطوير أساليب الإنتاج .وتطبيق نتائج البحوث بما يكفل تحقيق عائد للمساهمين.

ثالثا: القدرة على اتخاذ القرار، والتحديث والتطوير المستمرين.

رابعا: القدرة على رفع مستوى معيشة العاملين بالإنتاج الزراعى، وتوفير مستوى حضارى متقدم ثقافيا واجتماعيا.

خامسا: الاستخدام الأمثل للموارد المختلفة بما يكفل إسهاماً فعالاً للإنتاج الزراعى فى تكوين الدخل القومى.

ولم يغفل التقرير موضوع الملكيات الصغيرة فى ظل وجود الاعتبارات السياسية والاجتماعية للدولة؛ حيث اقترح أن يكون توزيعها من خلال الأراضى التى قامت الشركات باستصلاحها ووصلت بها إلى مرحلة الحدية؛ مما يقلل من تكاليف الإنتاج، ويوفر عائدا معقولا.

المخطط الرئيسي للأراضي ـ نوفمبر ١٩٨٦:

تشكل الدراسات والنتائج ـ التى قام بها مشروع المخطط الرئيسى للأراضى بوزارة التعمير ـ الأسس الرئيسية فى مستقبل التوسع الأفقى فى الرقعة الزراعية المصرية. وقد حددت أهداف المخطط فى النقاط التالية:

أولا: تحديد مساحات الأراضى القابلة للاستصلاح والتى لا تقل مساحتها عن ١٠٠٠ فدان؛بحيث لا يتعدى رفع مياه الرى السطحى (مياه النيل) ١٥٠ مترا. وفى حالة استخدام المياه الجوفية يجب أخذ إمكاناتها المتاحة فى الحسبان.

ثانيا: تحديد أولويات وحدات تنمية الأراضى وفقا للمعايير الطبيعية والفنية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك أهداف التخطيط القومى.

ثالثا: تصنيف وحدات تنمية الأراضى إلى أنماط تعكس الخواص الطبيعية والكيميائية للتربة وأفضل الطرق لتعرف احتياج الأراضى إلى الصرف، وتحديد المحاصيل وإنتاجيتها، بالإضافة إلى تحديد أفضل أساليب الإدارة المزرعية، ونوع وحجم الحيازات والمزارع. وقد حددت الدراسات خمسة أنماط لإدارة الأراضى كالتالى:

١ـ أراضٍ طينية صالحة جدا للزراعة، تروى بالغمر، وتحتاج إلى صرف فعال، وتصلح لصغار الملاك والمزارع الأسرية من ٥ـ١٥ فداناً ويمكن تقسيمها إلى:

(أ) أراضٍ طينية بحرية بشمال الدلتا مستوية السطح، مع وجود كثبان طينية منخفضة الارتفاع، بالإضافة إلى ملوحة الماء الأرضى. وتصلح هذه الأراضى لزراعة محاصيل متعددة؛ كالأرز، والقطن، والقمح، وبنجر السكر، والخضر، والفاكهة.

(ب) أراضٍ طينية دلتاوية جيرية (تحتوى على الجبس) شديدة الملوحة، وتتواجد بعض المناطق خارج الدلتا كالوادى الجديد، وتجود بها زراعة الأرز.

٢ ـ أراضٍ تتراوح بين الرملية الطفلية والطينية. ويتم الرى بالمواسير ذات البوابات، أو

باستخدام الرى بالرش النقالى. وهذه تحتاج إلى الصرف الحقلى بعد عدة سنوات، ولا تصلح للمحاصيل التى تتأثر بالجير كالموالح؛ وهى مناسبة للمزارع الأسرية وشباب الخريجين ٢٥ ـ ٥٠ فداناً. ويمكن تقسيمها إلى:

(أ) أراضٍ طفلية رملية قليلة الجير وتربة طينية رملية بمناطق شرق كوم أمبو والوادى الجديد. وهذه الأراضى إمكاناتها الزراعية ضعيفة.

(ب) أراضٍ رملية جيرية طفلية، وطفلية طينية غير جيرية أو قليلة الجير بمناطق النوبارية والوادى الجديد.

٣ ـ أراضٍ عميقة رملية متموجة السطح، مع وجود كثبان رملية منخفضة. وتحتاج هذه الأراضى إلى عمليات التسوية، وسعتها الحقلية من ٥ ـ ١٠ ٪، وتصلح للرى بالمواسير ذات البوابات أو الرش النقالى. وتحتاج إلى الصرف الحقلى بعد عدة أعوام من بداية الاستصلاح. وتصلح لزراعة البقول والمحاصيل الزيتية والأعلاف والفواكه، وهذه الأراضى غير مناسبة لزراعة القطن والأرز، تصلح للمزارع المتوسطة والأسرية والمزارع التجارية (١٦٠ فدان فأكثر).

٤ ـ أراضٍ صحراوية متموجة السطح بها كثبان رملية بارتفاع حوالى ٣ أمتار وتحتاج عمليات تسوية، وتتراوح سعتها الحقلية من ٥ ـ ١٠ ٪، وتروى بالرش النقالى، وكذلك الآلى الطولى والمحورى، أو بطريقة التنقيط. وتصلح هذه الأراضى لجميع المحاصيل، ماعدا الأرز والقطن والبرسيم، كما تصلح للمزارع التجاريـة (٢٠٠ ـ ٥٠٠ فدان).

٥ ـ أراضٍ صحراوية خشنة، بها نسبة عالية من الزلط مستوية إلى متموجة السطح، وسعتها الحقلية أقل من ٥٠ ٪، ويناسبها الرى بالرش الثابت أو المحورى، وكذلك باستخدام أسلوب الرى بالتنقيط، وتصلح لزراعة البرسيم الحجازى والفول السودانى والطماطم والفاكهة، كما تصلح للمزارع الكبيرة (١٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ فدان).

وقد أخذ فى الحسبان ـ عند تحديد أولويات التنفيذ ـ منسوب رفع مياه الرى وخطوات التنفيذ التى تمت سابقا، أوما أنفق من استثمارات إلى الآن، والقرب من

مراكز النمو السكانى والأسواق، وعدالة التوزيع الإقليمى، وأثر تنفيذ المشروع فى الاقتصاد القومى، وكذلك على ضوء التقيم الاقتصادى وأهداف التخطيط القومى.

وقد تطرق التقرير إلى البرنامج التنفيذى؛ حيث اقترح الاستشاريون خطة للتنفيذ على المدى القصير/ المتوسط؛ وهو برنامج مرحلى ينفذ على مدى ١٠ ـ ١٥ سنة بمراد فين هما:

الأول: الأراضى التى لا يتجاوز الرفع فيها ٤٠ مترا، بالإضافة إلى الأراضى المدرجة بالخطة الخمسية (١٩٨٨/٨٧ ـ ١٩٩٣/٩٢) للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

الثانى: الأراضى التى لا يتجاوز فيها رفع مياه الرى ٤٠ مترا، بالإضافة إلى مشروع بنجر السكر الجارى تنفيذه الآن.

المشاكل التي واجهت عمليات استصلاح الأراضي:

قام مشروع الأمم المتحدة لتنمية مصادر المياه (١٩٨٤) باستعراض برامج التوسع الأفقى فى أربع مناطق، هى: مريوط، والملاك، والنهضة ، وسمالوط.

وتختلف هذه المشروعات من حيث خواص الأراضى، والموقع، والمناخ السائد، ونظام الرى المتبع، وكذلك التركيب المحصولى السائد، علاوة على نظم الحيازة الزراعية بهدف تعرف مشاكل الأراضى والعمليات الزراعية المرتبطة بإصلاحها وزراعتها. ويسهم تتبع هذه الأنشطة فى وضع بعض الأسس كدروس مستفادة يمكن العمل بها فى البرامج المستقبلية وتفادى سلبياتها؛ مما يتيح الاستخدام الأمثل للموارد الأرضية والمائية.

أولا ـ مريوط:

يقع مشروع مريوط ضمن منطقة العامرية بمحافظة الاسكندرية على بعد ٤٠ كيلو مترا جنوب غربى الاسكندرية، وتبلغ مساحته حوالى ٤٧٠٠٠ فدان. وقد واجهت هذا المشروع عديد من المشاكل تتلخص فيما يلى:

(أ) مشاكل الأراضى:

١ ـ تكون القشرة الصلبة على سطح التربة الناتجة من تماسك حبيبات التربة؛ وهى الظاهرة التى تتميز بها الأراضى الجيرية ذات المحتوى المنخفض من المادة العضوية. وهذه القشرة تعيق الانبات ونفاذية المياه.

٢ ـ عدم استواء سطح الأرض؛ مما يؤدى إلى انخفاض كفاءة الرى والتمليح الثانوى.

٣ ـ رشح المياه من قنوات الرى ذات المناسيب العالية إلى الأراضى المنخفضة؛ مما يسبب ارتفاع مستوى الماء الأرضى وملوحة الأراضى، وخاصة مع غياب نظام الصرف الفعال.

٤ ـ اختلال التوازن الغذائى للمحاصيل فى الأراضى الجيرية المرتفعة المحتوى من كربونات الكالسيوم؛ من حيث انخفاض الفوسفور الصالح للنبات، والزنك، والمنجنيز، علاوة على اصفرار الأوراق الناتج من نقص الحديد.

وقد تناول التقرير التوصيات الخاصة بمواجهة المشاكل السابقة من حيث تقليل احتمالات تكوين القشرة الأرضية عن طريق إضافة المادة العضوية فى صورة أسمدة عضوية أو خضراء. وفى الوقت نفسه يجب تجنب إجراء عمليات الخدمة كالحرث فى حالة الأرض الزائدة الجفاف أو الابتلال.

أما من حيث تسوية الأراضى الجيرية فيوصى التقرير بضرورة إجرائها مرة واحدة سنويا. ولا شك فى أن تزويد هذه المناطق بنظام صرف حقلى ذى كفاءة عالية مع إنشاء مصارف قاطعة يؤدى إلى مواجهة مشكلة ارتفاع الماء الأرضى وملوحة الأراضى.

ومن حيث صلاحية العناصر الغذائية.. يوصى التقرير بضرورة وضع السماد الفوسفاتى تكبيشا بجوار النباتات بدلا من توزيعه على المساحة كلها، مع إضافة العناصر الصغرى رشا على النبات.

(ب) مشاكل الرى والصرف والملوحة: تتلخص هذه المشاكل فيما يلى:

١ـ ملوحة مياه الرى:

تتزايد ملوحة ترعة الحرية من ٨١٩ جزءاً فى المليون عند المحطة رقم (٢) إلى ١١٦٥ جزءاً فى المليون عند المحطة رقم (٥)؛ وذلك نتيجة الإسراف فى الرى بالأراضى وانسيابها للترعة.

ولمواجهة الارتفاع فى ملوحة مياه الترعة يجب ترشيد استخدام المياه بالأراضى الواقعة على جانبيها، وزيادة كفاءة استخدام المياه؛ وذلك باستبدال الرى السطحى، واستخدام الطرق الحديثة وخاصة فى مزارع الفاكهة.

٢ ـ إدارة مياه الرى:

تعانى أراضى المشروع عدم كفاية مياه الرى؛ حيث تركت حوالى ٢٥٠٠ فدان بوراً دون زراعة، بالإضافة إلى أن المحاصيل المنزرعة بباقى المساحة تروى بكميات تقل عن احتياجاتها المائية؛ ومن ثم تنخفض إنتاجيتها.

تحتاج الأراضى العالية إلى محطات رفع؛ لإمدادها بالمياه اللازمة لمساحتها البالغة حوالى ٨٠٠ فدان موزعة بمزارع شدوان والجلاء والحرية.

وفى الوقت نفسه تعانى الأراضى الواقعة بنهايات الترع نقصاً حاداً فى مياه الرى بما يحتم ضرورة تحسين نظام توزيع المياه.

ولحل هذه المشاكل القائمة يجب تقدير كميات المياه الواردة إلى أرض المشروع، وبناء على الاحتياجات المائية للمحاصيل يمكن وضع تركيب محصولى وكثافة محصولية تتناسب مع الموارد المائية المتاحة، مع العمل على تطوير نظام نقل المياه وتوزيعها بما يكفل رفع كفاءة استخدام المياه التى تعتبر منخفضة نسبيا.

٣ ـ مشاكل الصرف:

تبلغ المساحة التى تعانى مشاكل الصرف حوالى ٣٠٠٠ فدان؛ وذلك بسبب عدم تزويد نصف المساحة بنظم الصرف الحقلى، فى حين تعانى باقى المساحة سوء صيانة شبكة الصرف الحقلى وعدم فعاليتها. وترجع مشاكل الصرف بهذه المنطقة إلى تعدد الجهات المسؤولة عنها دون وجود ارتباط وتنسيق بينها.

(جـ) مشاكل خاصة بإنتاجية المحاصيل والتركيب المحصولى:

تنخفض إنتاجية المحاصيل المنزرعة بأراضى المشروع نظرا للظروف السابقة بصفة أساسية، علاوة على معوقات الإنتاج فى مزارع العنب القائمة؛ من حيث عدد النباتات فى الفدان، وجدولة الرى، والتقليم المناسب، والتسميد، ومقاومة الحشائش والآفات الزراعية؛ مما يستدعى ضرورة تحسين وتجديد الزراعات القائمة من أجل رفع إنتاجيتها.

كما تنخفض إنتاجية محاصيل الخضر كذلك بأرض المشروع عند مقارنتها بالإنتاجية على المستوى القومى؛ نظرا لتواجد العوامل السابقة. وبالاضافة إلى هذه العوامل لم يوضع التركيب المحصولى المناسب الذى يتلاءم مع خواص التربة والموارد المائية المتاحة فى الأوقات المختلفة لمواسم نمو المحاصيل، كما أن التغيير فى التركيب المحصولى يتم دون أسس علمية.

ويلاحظ اختلاف درجة التكثيف المحصولى من مزرعة لأخرى بأرض المشروع؛ حيث تتراوح بين ٩٠٪ إلى ٢٠٠٪؛ بمتوسط يصل إلى ١٣٠٪ على مستوى المشروع. كما تصل إنتاجية بعض المحاصيل إلى ثلث الإنتاجية على المستوى القومى، ويعزى ذلك إلى أن حوالى ٤٠٪ من المساحة تعتبر تحت الحدية الإنتاجية.

وتتمثل الحلول المقترحة لمواجهة هذه المشاكل فى ضرورة الوصول بمساحة ٧١٨٤ فدان إلى الحدية الانتاجية من خلال توفير المياه اللازمة لمساحة ٢١٨٤ فداناً وكذلك تحسين شبكة الصرف الحقلى فى مساحة ٣٠٠٠ فدان أخرى، بالإضافة إلى إجراء عمليات التسوية، وتحسين نظام توزيع المياه فى مساحة ٢٠٠٠ فدان.

كما تطرقت الحلول المقترحة إلى وضع التركيب المحصولى التالى على أساس:

٣٤٪ من المساحة تزرع بمحاصيل الخضر (طماطم/ بطيخ).

٣٣٪ من المساحة محاصيل العلف (برسيم حجازى / ذرة سكرية).

٣٣٪ من المساحة محاصيل حقلية (القمح، والذرة الشامية، والفول البلدى).

ثانيا ـ مشروع النهضة:

يقع هذا المشروع شرقى طريق مصر الاسكندرية الصحراوى على بعد ٣٦ كيلو متراً من مدينة الاسكندرية، ويبلغ مساحته ٢٢٠٠٠ فدان. وتتلخص المشاكل التى واجهت هذا المشروع فيما يلى:

(أ) مشاكل الأراضى:

أراضى المشروع طينية ثقيلة، يصل فيها مستوى الماء الأرضى ذى الملوحة العالية إلى قرب سطح الأرض؛ وعلى هذا تحتاج هذه الأراضى إلى شبكة صرف حقلى ذات كفاءة عالية، يمكن عن طريقها خفض مستوى الماء الأرضى، وغسيل الأملاح المتواجدة التى تعتمد على خاصية نفاذية التربة. فى هذا الخصوص أوضح التقرير (١٩٨٤) أنه فى حالة النفاذية العالية للتربة ـ كما فى حالة أراضى منطقة أبيس ـ نجد أن غسيل قطاع التربة لحوالى متر يحتاج إلى مدة زمنية تصل إلى عام تقريبا، بينما تصل إلى عامين فى حالة مشروع النهضة؛ نظرا لقلة نفاذية التربة؛ ومن ثم بطء غسيل الأملاح.

ويرتفع محتوى أراضى المشروع من عناصر المغنسيوم والصوديوم؛ مما يعطى الفرصة لظهور القلوية بالأراضى عند غسيلها فى غياب الكالسيوم؛ وعلى هذا فإن عمليات حرث تحت التربة، وإضافة الجبس الزراعى، وإجراء عمليات الغسيل تسهم بفاعلية فى تقليل تكوين القلوية. كما يوصى فى هذه الحالة بزراعة محاصيل الشعير والأرز خلال عمليات الغسيل.

(ب) مشاكل الرى والصرف والملوحة:

لا توجد مشاكل خاصة بتسرب المياه من الأراضى الزراعية الواقعة على جانبى الترعة التى تخدم أرض المشروع. وبالتالى عدم زيادة ملوحتها كما هو حادث فى ترعة الحرية (مشروع النهضة). ومن جهة أخرى يعتبر نصيب الترعة من الماء كافياً

جدا للزراعات القائمة ماعدا فترة أعلى الاحتياجات، وخاصة أن محاصيل الخضر تعتبر سائدة فى أغلب المساحة؛ مما يدعو إلى إعادة النظر فى هذا المقنن.

وكالعادة تعتبر مشكلة الصرف إحدى معوقات الإنتاج؛ حيث تسير عمليات الصيانة لها بطريقة غير مجدية؛ نظرا لتعدد الجهات المسؤولة عن هذا العمل؛ ومن ثم ترتفع مستويات الماء الأرضى، ويتبع ذلك تدهور خواص التربة.

(جـ) مشاكل خاصة بإنتاجية المحاصيل والتركيب المحصولى:

شمل التركيب المحصولى فى بداية المشروع كلاً من محاصيل العلف والمحاصيل الحقلية، وذلك فى المساحات الخاصة بصغار الملاك، تم إحلالها تدريجيا بمحاصيل الأعلاف والخضر؛ حيث تشغل الخضر حاليا ما يقرب من ٤٥ ٪، ٥٠ ٪ من جملة المساحة خلال الموسمين الشتوى والصيفى على الترتيب. أما فى حالة مزارع الخريجين.. فنجد أن محاصيل الخضر تشغل حوالى ٦٠ ٪، ٨٣ ٪ من مساحة الموسمين الشتوى والصيفى على الترتيب. فى حين نجد أن الأعلاف تحتل حوالى ٧٦ ـ ٨٦ ٪ من المساحة التى تشرف عليها الشركة.

ويلاحظ أن اختيار التركيب المحصولى فى هذا المشروع يتم بناء على خواص التربة وظروف المنطقة، بالإضافة إلى الاحتياجات الخاصة بالمنتفعين، كما تتماثل إنتاجية المحاصيل والتكثيف المحصولى فى هذه الحالة مع المتوسط القومى.

أما من حيث الأراضى التى تشرف عليها شركة النهضة.. فبالرغم من انخفاض إنتاجية المحاصيل ونسبة التكثيف المحصولى بها عن المتوسط القومى إلا أنه أعلى نسبيا من معظم المشروعات الأخرى؛ مما يعطى اتجاها مميزا للأراضى الطينية من حيث ثبات إنتاجيتها مقارنة بالأراضى الرملية المستصلحة.

ويتدخل حجم العائد فى تحديد أفضلية التراكيب المحصولية المتبعة تحت ظروف هذا المشروع؛ إذ تلاحظ زيادة محاصيل الخضر مزارع صغار المنتفعين لعائدها الكبير نسبيا مقارنة بمحاصيل الأعلاف، فى حين تحتل الأخيرة معظم أراضى شركة النهضة لأفضليتها اقتصاديا بالنسبة لها.

ثالثا ـ مشروع الملاك:

يقع هذا المشروع على بعد ٧٠ كيلو مترا شمال شرقى القاهرة. كما يبعد حوالى ٣٠ كيلو مترا غربى مدينة الإسماعيلية. وتبلغ مساحته حوالى ٢٠,٠٠٠ فدان. وتنحصر مشاكل المشروع فيما يلى:

(أ) مشاكل الأراضى:

أرض هذا المشروع رملية من أراضى الدرجتين الرابعة والخامسة، وهى ذات قدرة إنتاجية منخفضة. ومستوى خصوبة منخفض. ويوصى التقرير باتباع المعاملات الزراعية التالية فى إدارة هذه الأراضى:

١ ـ تقليل ـ أوعدم ـ إجراء عمليات خدمة وتجهيز الأراضى من أجل ثبات التربة وعدم انجرافها هوائيا.

٢ ـ تحسين بناء التربة، وزيادة القدرة على حفظ المياه، ورفع مستوى خصوبتها عن طريق زيادة محتواها من الطين والمادة العضوية، بالإضافة إلى الاستخدام المتوازن للأسمدة. ويوصى بإضافة نواتج التطهير والبنتونيت بمعدل ٦٠ طناً /للفدان إذا ثبتت اقتصاديتها.

ومن ناحية أخرى.. فإن استخدام الأسمدة العضوية بمعدل ١٠ أمتار مكعبة سنويا للفدان واتباع أسلوب التسميد الأخضر له تأثيره الواضح فى تحسن الخواص الكيماوية والطبيعية للتربة.

(ب) مشاكل الرى والصرف:

من الناحية النظرية تعتبر المياه المخصصة لأراضى المشروع أعلى من قيم الاستهلاك المائى للمحاصيل المزروعة. ولكن برغم هذا تعانى منطقة المشروع نقص؛ مما أدى إلى خفض عدد الريات، وانخفاض التكثيف المحصولى الذى يصل إلى حوالى ١٠٠ ٪؛ أى بمعدل محصول / سنة.

وتستخدم طريقة الرى بالرش النقالى الذى يحتاج إلى عمالة كثيرة للإدارة والصيانة. وتنخفض كفاءة الرى بهذا النظام حيث تصل إلى ٥٧٪. كما أن عدم تبطين قنوات الرى يزيد من نسبة الفقد إلى حوالى ٣٠٪.؛ وعلى هذا يوصى بتبطين القنوات، واستبعاد نظام الرى بالرش واتباع أحد الأنظمة التالية:

١ ـ نظام الرى بالتنقيط فى حالة مزارع الموالح والخضر.

٢ ـ نظام الرى بالرش الثابت فى حالة المساحات المخصصة لإنتاج الأعلاف والمحاصيل الحقلية.

وسوف يؤدى تعديل نظام الرى إلى زيادة كفاءته من حوالى ٥٧٪ حاليا إلى أكثر من ٨٠٪، مع زيادة نسبة التكثيف المحصولى إلى حوالى ٢٠٠٪. وفى الوقت نفسه ستزاداد إنتاجية المحاصيل؛ نظرا لحصولها على احتياجاتها المائية.

(جـ) مشاكل إنتاجية المحاصيل والتركيب المحصولى:

طبقا لخواص التربة السائدة ومحدودية إنتاجيتها.. فإنها تحتاج إلى اختيار محاصيل معينة ومعاملات زراعية خاصة؛ وعلى هذا الأساس فقد وضع فى الحسبان ـ عند إقامة هذا المشروع ـ أن يتبع التركيب المحصولى التالى: (٣٣٪من المساحة تزرع موالح، والباقى ٦٧٪ بالأعلاف والمحاصيل الزيتية كالفول السودانى) على أن يطبق ذلك ابتداء من بداية الاستزراع ولمدة خمس سنوات قادمة، إلا أن توالى تغيير الإدارة بالمشروع أدى إلى عدم تطبيق التركيب المحصولى المقترح؛ حيث تمت زراعة محاصيل لا تتناسب مع خواص التربة والمناخ السائد بالمنطقة واحتياجاتها المائية؛ مما أدى إلى انخفاض إنتاجية هذه المحاصيل عن المتوسط القومى، وعانى المشروع الأزمات المالية المتوالية.

وقد تناول التقرير (١٩٨٤) هذا الموضوع؛ حيث أورد أنه بعد مرور حوالى ١٣ عاما من التجربة والخطأ يمكن التوصية بزراعة عدد من المحاصيل التى تتناسب مع الظروف السائدة، مع الوضع فى الحسبان تحسين المعاملات الزراعية وهى:

محاصيل فاكهة تتمثل فى الموالح	(برتقال بلدى/ برتقال صيفى/ ليمون).
محاصيل الخضر	(بطاطس وطماطم بصفة أساسية).
محاصيل العلف	(البرسيم والبرسيم الحجازى).
المحاصيل الحقلية	(الشعير والفول السودانى).

رابعا ـ مشروع سمالوط:

يقع هذا المشروع فى محافظتى بنى سويف والمنيا غربى بحر يوسف، ويتمثل فى شريط من الأراضى بطول ١٠٠ كيلو متر، تمتد من الشمال إلى الجنوب، وبعرض ٣ ـ ٤ كيلو مترات من الشرق إلى الغرب، وتبلغ مساحته حوالى ٤٤٠٠٠ فدان. وتتلخص المشاكل التى واجهت المشروع فيما يلى:

(أ) مشاكل الأراضى:

أراضى هذا المشروع إنتاجيتها منخفضة؛ حيث تتبع أراضى الدرجتين الرابعة والخامسة؛ وهى أراضٍ رملية أو رملية حصوية، مع وجود طبقات من الكاليش أو الجبس التى تسبب التمليح الثانوى للأراضى بعد تطبيق أساليب الرى؛ وعلى هذا تتمثل مشاكل هذه الأراضى فيما يلى:

١ ـ انخفاض خصوبة الأراضى وقدرتها على حفظ المياه.

٢ ـ انخفاض محتواها من المادة العضوية.

٣ ـ تواجد طبقات أملاح كلوريد الصوديوم والجبس.

٤ ـ سيادة ظروف التمليح الثانوى.

٥ ـ قابليتها للانجراف الهوائى.

وجدير بالذكر أن أراضى هذا المشروع لم تُعطَ أولوية فى برامج التوسع؛ حيث نص التعاقد مع الشركة المنفذة (ايتال كونسلت) على إدراج الأراضى المناسبة فقط ضمن عمليات الاستصلاح، ولم تلتزم الشركة بهذه الشروط.

وقد شملت عمليات الاستصلاح إضافة طمى النيل بمعدل ٣٠ ـ ٥٠ متراً مكعباً للفدان، واستخدام التسميد الأخضر؛ وذلك لتحسين خواص الأراضى الطبيعية والكيميائية.

وطبقا لخواص الأراضى والاحتياجات المائية للمحاصيل يمكن تقسيم أراضى المشروع إلى:

١ ـ أراضٍ مناسبة لزراعة الفاكهة؛ وهى ذات قطاع عميق، مع وجود مشاكل محددة بدرجة بسيطة إلى متوسطة.

٢ ـ أراضٍ مناسبة للمحاصيل الحقلية؛ وهى ذات قطاع متوسط العمق، مع وجود مشاكل محددة بدرجة متوسطة.

٣ ـ أراضٍ مناسبة لزراعة الأعلاف؛ وهى ذات قطاع قليل العمق، مع وجود مشاكل محددة بدرجة كبيرة.

٤ ـ أراضٍ لا تناسب الزراعة؛ نظرا لوجود مشاكل محددة بدرجة عالية جدا.

(ب) مشاكل الرى:

أدت المشاكل الخاصة بعدد ساعات التشغيل وانقطاع التيار الكهربائى إلى انخفاض كميات المياه الواردة للمشروع، مقارنة بالتصميم الموضوع لإمكانات محطات الضخ؛ ومن ثم فقد تركت حوالى ٢٧,٠٠٠ فدان دون زراعة نتيجة عدم توافر المياه اللازمة لها.

وقد وضعت الشركة المنفذة أسلوبا خاصا بتوزيع المياه يعتمد على التدفق المستمر للمياه فى قنوات الرى. ويعتمد هذا النظام ـ بصفة أساسية ـ على وجود جهاز إرشادى يتيح للمزارعين التأقلم مع هذه الظروف التى تختلف كلية عما هو حادث فى الزراعة المصرية؛ ولذلك فقد أدى غياب الإرشاد المائى إلى قيام المزارعين بهدم أغلب الأعمال الإنشائية الخاصة بتوزيع مياه الرى.

وعلاوة على ما سبق ذكره فقد أدى تأخير توريد معدات الرى بالرش إلى ترك حوالى ١١,٠٠٠ ألف فدان دون زراعة. ولا يتناسب نظام الرى بالرش النقالى مع ظروف هذه الأراضى؛ لاحتياجه إلى عمالة كبيرة. وتتجه السياسة المستقبلية لهذه الأراضى نحو استخدام طرق الرى بالتنقيط لأشجار الفاكهة، مع استخدام الرى المحورى فى إنتاج الأعلاف، والتركيز على عدم استخدام طريقة الغمر فى رى أراضى المشروع، والتى تسببت فى رفع مستوى الماء الأرضى، مع مشاكل صرف مزمنة فى الأراضى المنخفضة بالوادى والمجاورة لمنطقة المشروع.

(جـ) مشاكل خاصة بإنتاجية المحاصيل والتركيب المحصولى:

تمت زراعة محاصيل البرسيم المصرى والحجازى فى أولى مراحل عمليات الاستصلاح؛ من أجل تحسن الخواص الطبيعية والكيميائية للأراضى، وتغذية الحيوان. وأعقب ذلك إدخال محاصيل الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية؛ حيث تم اختيار المحصول بناء على العائد الناتج من زراعته.

وبوجه عام فقد زادت المساحات المنزرعة بالخضر والفاكهة، مع انخفاض مساحة النباتات العطرية والمحاصيل الحقلية، بالإضافة إلى سيادة الأعلاف بالتركيب المحصولى.

وتطبق شركة الوجه القبلى ـ حالياً ـ تركيباً محصولياً لهذه الأراضى يعتمد على التوسع فى زراعة محاصيل الأعلاف وتوفيرها للتوسعات فى برامج الإنتاج الحيوانى، علاوة على التوسع فى زراعة الفاكهة، وفى الوقت نفسه خفض المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل الحقلية؛ نظرا لانخفاض إنتاجيتها وأسعارها. وقد أدت مشاكل التسويق الخاصة بالنباتات العطرية إلى خفض مساحتها أيضا.

أما من حيث درجة التكثيف المحصولى.. فيلاحظ أن المساحة التى تقوم بإدارتها الشركة يتساوى بها التكثيف المحصولى مع المتوسط القومى؛ حيث يصل إلى حوالى ١٩٥٪.

وهذا المستوى أعلى قليلا من الحادث فى مزارع المنتفعين؛ حيث تصل هذه النسبة إلى ١٨٨ ٪. وهذا الاتجاه مغاير جدا لما هو حادث فى معظم المشروعات؛ ويرجع السبب إلى أن حوالى ٥٠ ٪ من المساحة القابلة للزراعة تقوم الشركة بزراعتها فى حين تركت المساحات تحت الاستزارع للمنتفعين.

مستقبل التوسع الأفقي في مصر:

استعرضت الأعمال والأنشطة التى صاحبت مشروعات مريوط، والنهضة، والملاك، وسمالوط، والتى تمثل العوامل المختلفة للأراضى، والمناخ، وطرق الرى، والحيازات. كما استعرضت المعوقات والتوصيات المناسبة لكل مشروع كما أوردها تقرير المخطط الرئيسى للمياه (١٩٨٤).

وفى الوقت نفسه وضع المخطط الرئيسى للأراضى (١٩٨٦) عدة أنماط لإدارة الأراضى على خواص التربة والمحاصيل والرى والصرف وظروف المنطقة.

وتسهم المجالس القومية المتخصصة (١٩٨٥) فى هذا المجال بوضع بعض المؤشرات التى يجب أخذها فى الحسبان عند تقرير الأسلوب الأمثل لهذه البرامج، بما يكفل الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. ويمكن تلخيص هذه الاتجاهات فيما يلى:

أولا - أسلوب إدارة الأراضى:

يشير تقرير المخطط الرئيسى للمياه (١٩٨٤) إلى أنه برغم استنفاذ ما يقرب من ثلاثين عاماً - طبقت خلالها مختلف السياسات الخاصة بأسلوب إدارة الأراضى - فإنه لا يمكن تقرير النمط المناسب للظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة، برغم ارتفاع إنتاجية المزارع الخاصة فى حالة إزالة المعوقات عند مقارنتها بالأراضى التى يديرها القطاع العام.

ولذلك يرى التقرير ضرورة قيام الدولة بعمليات استصلاح الأراضى، بينما يقوم القطاع الخاص بمسئولية استزراع الأراضى، على أن يتحدد أسلوب الإدارة فيما بعد

لكل مشروع بما يتلاءم مع الأهداف القومية لمشروعات التوسع الأفقى، والتى تتوقف على ظروف كل منطقة. وفى الوقت نفسه وضع المخطط الرئيسى للأراضى بعض الأنماط لإدارة الأراضى تختلف حسب خواص الأراضى، والمحاصيل، وإنتاجيتها، وظروف الرى، والصرف.

وهذه الأنماط تتلاءم ـ إلى حد كبير ـ مع الواقع الفعلى؛ حيث يقترح على سبيل المثال أسلوب المزارع الأسرية وصغار الملاك للأراضى الطينية (النمط الأول)، بينما تصلح أراضى النمط الخامس ـ وهى ذات الإنتاجية الأقل وخواص التربة الخشنة الفقيرة إلى ضرورة استغلالها ـ بواسطة الشركات الكبيرة؛ بإنشاء مزارع من ١٠٠٠ ـ ٥٠٠٠ فدان. وفى هذا المجال يرى تقرير المجالس القومية المتخصصة أن الشركات المساهمة هى الأقدر على تنفيذ برامج التوسع الأفقى، مع الوضع فى الحسبان توزيع بعض المساحات على الأفراد؛ لمواجهة بعض الظروف السياسية والاقتصادية.

وقد بدأت فى السنوات الأخيرة مجهودات كبيرة يقوم بها الأفراد بتوجيه مدخراتهم فى زراعة الأراضى الجديدة لإنتاج الفاكهة بصفة أساسية، أسهمت بفاعلية فى حجم الإنتاج الزراعى. وبرغم هذا فإنه من الممكن زيادة هذا الاسهام، والوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد الأرضية والمائية؛ من خلال تحسين حالة الرى، والصرف. والإرشاد الزراعى، ومستلزمات الإنتاج، ووقاية النبات، وأخيرا وضع تصور محصولى لهذه الأراضى، مع التركيز على التسهيلات الخاصة بالتسويق.

ثانيا ـ خواص الأراضى وأساليب الاستغلال:

يعتبر استصلاح الأراضى الطينية مجزيا عند مقارنته بكل من الأراضى الجيرية والرملية، وخاصة إذا ما تناوله صغار الملاك ذوو الخبرة الطويلة فى إدارة مثل هذه الأراضى.

أما الأراضى الجيرية فإن نجاح استغلالها يعتمد على قطاع التربة وملوحته، والطبقات الصماء، والتلميح الثانوى، والتركيب المحصولى المناسب.

أما فى حالة الأراضى الرملية فإنها تحتاج إلى تطبيق مجموعة من الأساليب التى تعالج اختيار المحصول، وطريقة الرى، والمعاملات الزراعية. ولا شك فى أن الفترة السابقة التى شهدت برامج التوسع الأفقى فى مصر أدت إلى اكتساب خبرات، ووضع الأسس التى لها إسهاماتها الكبيرة فى الاستغلال الأمثل للأراضى المختلفة فى خواصها.

ثالثا ـ المحاصيل المناسبة:

تحتاج الأراضى الرملية والجيرية فى زراعتها إلى تكاليف عالية نسبيا بمقارنتها بالأراضى الطينية؛ نظرا لحاجتها إلى نظم رى متطورة يمكن تشغيلها بواسطة المنتفعين، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة بقية المدخلات؛ مما يدعو إلى زراعة محاصيل مرتفعة العائد، وإنتاجية عالية لمواجهة هذه التكلفة.

وقد أشار تقرير المخطط الرئيسى لتنمية مصادر المياه (١٩٨٤) إلى أن اختيار المحصول فى الأراضى الجديدة يعتمد على مبدأ التجربة والخطأ، والمعاملات الخاصة بالمحصول، برغم عدم توافر المعلومات لدى المنتفعين.

والملاحظ أن إنتاجية المحاصيل المختارة تقل كثيرا عن قدراتها الإنتاجية الأصلية؛ نظرا لقلة خبرة المنتفعين فى توفير الظروف الملائمة لهذه المحاصيل. وهذا الوضع يستوجب ضرورة تكوين جهاز إرشادى متكامل بكفاءة عالية؛ لمواكبة الإنجازات العلمية وتبسيطها بصورة عملية لهذا المجتمع الزراعى.

رابعا ـ التكاليف والعمالة:

يشير تقرير المخطط الرئيسى للمياه (١٩٨٤) إلى أن استصلاح الأراضى الرملية يعتبر مجزيا فى حالة توفر التكاليف الأساسية والإدارة السليمة، مع تشجيع تسويق الناتج الزراعى. وفى الوقت نفسه.. فإن مشاكل توفر العمالة بالأراضى الجديدة يمكن مراعاتها عن طريق إدخال الميكنة المناسبة التى تتلاءم مع أسلوب إدارة الملكيات المختلفة.

وجدير بالذكر أن موضوع استصلاح الأراضى قد تناولته عديد من الجهات العلمية والتشريعية. وفى هذا المجال تشير تقارير مجلس الشورى (١٩٩٢) إلى ضرورة تكامل مشروعات التوسع الرأسى والأفقى اقتصاديا، وضرورة تشجيع القطاع الخاص وشباب الخريجين على الدخول فى نشاط استصلاح الأراضى؛ عن طريق تيسير إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط، مع تعديل التشريعات المنظمة لهذا المشروع، ووضعها فى تشريع واحد، على أن يقتصر دور الدولة على أعمال البنية الأساسية والدراسات الاستكشافية؛ لتحديد أكثر المواقع التى يمكن استصلاحها.

obeikandl.com

الفصل التاسع

التلوث فى الأراضى الزراعية

obeikandl.com

obeikandl.com

مقدمة:

يقصد بالتلوث بصفة عامة التغير الحادث فى الظروف الطبيعية والكيماوية والحيوية للبيئة الذى يؤدى إلى الإضرار بالكائنات الحية من نبات وحيوان وإنسان. وقد يعزى التلوث إلى تواجد بعض المواد مثل الغازات الصناعية والكيماويات والمخلفات، أو إلى عوامل غير مادية مثل الضوضاء.

وتأتى أهمية دراسة تأثير التلوث على الإنتاج النباتى ليس من حيث الإضرار بالإنتاجية واقتصادياتها فقط بل يتعدى ذلك إلى ما تسببه من أضرار خاصة بالانسان.

وقد ارتبطت الثورة الصناعية ـ وما واكبها من تزايد فى المنشآت المقامة بالمناطق الريفية ـ بارتفاع تأثير العوامل المصاحبة لوجود هذه الصناعات فى الظروف البيئية. وقد ارتفع محتوى الطبقات السطحية للأراضى الزراعية من المعادن الثقيلة، فى حين أدى وجود بعض المبيدات إلى انخفاض نسبة إنبات البذور، علاوة على ضعف النباتات النامية، وانخفاض إنتاجيتها.

وقد أشار Magie - et - al (١٩٦٧) إلى أن إضافة المعدلات العالية من المخلفات فى الأراضى الزراعية قد يؤدى إلى تراكم بعض مكوناتها العضوية بتركيزات تسبب سمية للنباتات النامية، وخاصة عند سيادة الظروف الهوائية.

ونظرا للتطوير السريع فى المجتمع المصرى فقد شكل ازدياد حركة المرور عاملا هاما فى تلوث الهواء وما يسببه من تأثير فعال على الصحة العامة والنبات والحيوان. وبرغم

أهمية هذا العامل لم تتناوله الدراسات كثيرا بما يسهم فى تقييم آثاره تحت الظروف المصرية، ثم وضع الأساليب المناسبة لمواجهته.

وقد أجريت عديد من الدراسات استهدفت جميعها مدى تأثر الخواص الطبيعية والكيماوية للأراضى الزراعية بعوامل التلوث، سواء من حيث استخدامات المياه المنخفضة النوعية كمياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى، بالإضافة إلى مخلفات المجارى. وفى الوقت نفسه تناولت هذه الدراسات أيضا تأثير استخدام مبيدات الحشائش والمبيدات الحشرية على خواص الأراضى والمحاصيل النامية بها.

ويستعرض هذا الفصل من الكتاب نتائج الدراسات واتجاهاتها التى تناولت الموضوعات التالية:

أولا ـ إعادة استخدام المياه والتلوث بالأراضى:

يمثل التوسع الأفقى فى مصر أهمية كبرى فى مواجهة تحديات الأوضاع الحالية والمستقبلية؛ حيث أصبح العنصر الأساسى والحيوى فى برامج الدولة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

ونظرا لأن المياه هى المحدد الحاكم لبرامج التوسع الأفقى.. فقد اعتمدت السياسة المائية لوزارة الأشغال والموارد المائية ـ فى توفير احتياجات هذا التوسع ـ على ضرورة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى؛ وعلى هذا تقوم هذه السياسة على استخدام ما يقرب من ٧ مليارات متر مكعب من مياه الصرف الزراعى حتى عام (٢٠٠٠)، فى حين اشتملت برامج التوسع الأفقى بعض المناطق الجديدة التى يتم توفير احتياجاتها المائية عن طريق استخدام مياه الصرف الصحى. وهذه المناطق هى:

طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوى	٢٥,٢ ألف فدان
أحمد عرابى ـ البركة	٥,٠ ،، ،،
أبو رواش	١٠,٠ ،، ،،
الصف وغمازة	٣٦,٠ ،، ،،

ولا شك فى أن ظروف التنمية ومحدودية الموارد المائية فرضت ضرورة الاهتمام بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى، إلا أنه يجب دراسة وتقييم استخدام هذه الموارد من خلال تتبع التغيرات الحادثة فى صفات الأراضى الطبيعية والكيمياوية والمحاصيل المنزرعة. وقد تناولت دراسات عديدة تقييم هذه التغيرات كما يلى:

١ ـ استخدام مياه الصرف الصحى فى رى الأراضى:

تشير دراسات معهد بحوث الأراضى والمياه (أحمد توفيق ١٩٨٩) إلى أن استخدام مياه الصرف الصحى فى رى مناطق الجبل الأصفر وأبو رواش أسفر عن تغيرات جذرية فى صفات هذه الأراضى الخشنة القوام؛ من حيث تغير قوام الطبقات السطحية، وارتفاع محتواها العضوى، وانخفاض الكثافة الظاهرية.

كما أدى الاستخدام المستمر لهذه المياه إلى زيادة محتوى التربة من عناصر النتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، بالإضافة إلى زيادة السعة التبادلية للأراضى.

ومن ناحية أخرى لوحظت زيادة تدريجية فى محتوى الأراضى من عناصر الرصاص والكادميوم والزنك والبورون بتوالى استخدام هذه المياه. وبحساب الكمية الميسرة من هذه العناصر بالنسبة لتركيزها الكلى يلاحظ انخفاض هذه النسبة فى حالة عنصر الرصاص، فى حين تزداد فى حالة عناصر الكادميوم والزنك والبورون؛ مما يعطى مؤشرا هاما من حيث الوصول بمحتوى هذه الأراضى من هذه العناصر إلى حدود التلوث والسمية بتوالى استخدام هذه المياه.

ومن جهة أخرى فقد تناولت دراسات عبد المنعم (١٩٩١) تتبع محتوى النباتات النامية بالأراضى المضاف إليها مخلفات المجارى المحتوية على عناصر الزنك والكادميوم والنيكل؛ حيث زاد محتوى الحبوب لكل من الأرز والبسلة من هذه العناصر بتزايد معدل هذه الإضافات. أما من حيث المحصول الناتج فقد أدت الإضافات المتزايدة من مخلفات المجارى ذات المحتوى العالى من العناصر السابقة إلى زيادة معنوية فى كل من حبوب وقش الأرز والبسلة، فى حين أدى التركيز العالى من هذه الإضافات إلى حدوث نقص معنوى فى محصول الأرز.

٢ ـ استخدام مياه الصرف الصناعى فى رى الأراضى:

أثبت جلال ريحان (١٩٩٢) فى الدراسات الخاصة بنوعية المصادر المختلفة للمياه بمدينة العاشر من رمضان احتواء مياه المخلفات الصناعية على تركيزات عالية من عناصر الليثيوم والكوبالت والكادميوم والرصاص والزنك والمنجنيز والحديد بمقارنتها بمصادر المياه الأخرى المستخدمة بالمدينة. وهذه التركيزات لها أثرها على خواص الأراضى والنباتات.

وقد أشارت هذه الدراسة إلى ضرورة إجراء تحليلات دورية لمخلفات كل مصنع على حدة بهدف عزل مخلفات المصانع التى تحتوى على تركيزات عالية من المواد الضارة للنبات والتربة، وعدم السماح بصرف مخلفاتها فى نظام الصرف الصحى للمدينة. هذا بالإضافة إلى تتبع التغيرات فى نوعية المياه الجوفية ومدى تأثرها باستخدامات مياه المصانع.

وقد أوضحت الدراسة التى قامت بها وفاء عبد العزيز (١٩٩٢) تلوث الأراضى فى منطقة الصرف الناتج من استخدام المخلفات السائلة للمصانع والمجارى التى تصرف مباشرة فى الترع والقنوات المحيطة بالمنطقة؛ كترعة الخشاب وترعة الحاجر وترعة كفر طرخان؛ حيث تستخدم هذه المياه كمصادر لرى هذه المناطق. وتشير النتائج إلى ما يلى:

١ ـ ارتفاع محتوى النتروجين الكلى والذائب (الأمونيومى والنتراتى) بالأراضى، وقلة هذه المستويات فى الطبقات العميقة من القطاع الأرضى.

٢ ـ المحتوى الكلى من العناصر الثقيلة فى مترشح مصادر المياه منخفضة ماعدا عنصر الحديد، بينما يرتفع تركيز العناصر فى المواد العالقة بهذه المياه.

٣ ـ يوجد اختلاف معنوى فى محتوى العناصر الثقيلة فى كل من الأراضى التى تستخدم هذه المياه، والأراضى التى لا تستخدمها.

٤ ـ ارتبط توزيع محتوى الأراضى من العناصر الثقيلة بالتوزيع الحجمى للحبيبات. وتفوق الطين فى احتوائه على تلك العناصر.

وقد أشارت الدراسة إلى ضرورة وقف صرف مخلفات المصانع فى هذه الترع، بالإضافة إلى معالجة مياه المجارى قبل التخلص منها بهذه الترع. وقد تطرقت الدراسات أيضا إلى دراسة تأثير بعض مصادر التلوث على عملية امتصاص بعض العناصر الغذائية بواسطة النبات؛ وذلك فى منطقة مسطرد الصناعية، والمنطقة المجاورة لمصنع ٨١ الحربى ـ نوفل (١٩٨١)؛ حيث أشارت النتائج إلى:

١ ـ النواتج الثانوية كحامض النتريك والفورمالدهيد شكلت مصدرا مؤثرا على درجة حموضة الأراضى ومحتواها من العناصر الغذائية الميسرة، بل والحالة الغذائية للنباتات النامية.

٢ ـ كان للمخلفات العضوية (الفورمالدهيد وغيرها) تأثير ضار على النباتات النامية.

٣ ـ أظهرت الدراسات أن مركب TNT مصدر لتلوث التربة؛ حيث أثر على محتوى العناصر الغذائية لنباتات الطماطم، وقلّ تأثيره كلما بعدنا عن مصدر التلوث.

وقد اعتمدت هذه الدراسة على اختبارات الإنبات فى تقييمها لمصادر تلوث الأراضى.

ثانيا ـ استخدام مبيدات الحشائش وعلاقتها بخواص الأراضى:

أجريت عديد من الدراسات لتتبع تأثير استخدام المبيدات المختلفة على خواص الأراضى الزراعية. وقد أعطت الدراسة التى قامت بها نفوسه إسماعيل (١٩٨٦) اهتماما بسلوك معادن الطين عند استخدام مبيدات الحشائش بالأراضى الرسوبية والجيرية؛ فمن المعروف سيادة المونتموريللنيت والكاؤولينيت فى الأولى، بينما يسود الاتابولجيت والكاؤولينيت فى الثانية.

وباستخدام الجرامكسون والاترازين لوحظ أن معدن المونتموريللونيت يفوق ـ فى قدرة ادمصاصه للجرامكسون كلاً من معادن الكاؤولينيت والأتابولجيت؛ حيث تبلغ قدرة ادمصاصه ٦٠ مرة مثل الكاؤولينيت، وضعف الأتابولجيت.

ومن ناحية أخرى يدمص المونتموريللونيت لمبيد الجرامكسون بما يقرب من السعة التبادلية للمعدن، فى حين يصل الادمصاص فى حالة الاتابولجيت والكاؤولينيت إلى ما يقرب من ٣/٤، ١/٣ سعتهما التبادلية على الترتيب.

وبصفة عامة نجد أن الكميات المدمصة من المبيد فى حالة الأراضى الرسوبيةتفوق الكميات التى ادمصتها الأراضى الجيرية برغم تماثل منحنى الادمصاص فى كليهما.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن ادمصاص الجرامكسون فى حالة معدن المونتموريللونيت أدى إلى انضغاط المسافة الطبقية بالمعدن من ١٤,٤ إلى ١٣,٦ انجستروم، وقد فشلت المعاملة بالجليسرول فى تمدد تلك المسافة.

بالاضافة إلى ما سبق أدت معاملة معدن المونتموريللونيت بالجرامكسون إلى انخفاض قيم السعة التبادلية ومساحة الأسطح الكلية للمعدن بمقدار ٧٠,٥٪، ٤٣,٤٪ على الترتيب، فى حين بلغ هذا التناقص ٢٦,١٪، ٢٣,٤٨٪ فى حالة الأراضى الرسوبية، و ١٨,٨٪، ٥,٨٪ بأراضى النوبارية.

ومما لاشك فيه أن النقص الجائر فى السعة التبادلية للأراضى ينعكس على خواص التربة ومدى فاعليتها فى كونها عاملا مهما فى إنتاجية الأراضى، والتى لا شك فى تأثرها نتيجة الاستخدام المتكرر لمبيد الجرامكسون.

ومن ناحية أخرى أوضحت دراسة ادمصاص مبيد الاترازين على معادن الطين عدم حدوث تغير فى المسافة الطبقية للمعادن المختلفة؛ مما يشير إلى أن الادمصاص يحدث على السطوح الخارجية فقط.

ثالثا ـ المبيدات الحشرية وخواص الأراضى:

تتلقى الأراضى الزراعية إضافات سنوية من المبيدات الحشرية، لها تأثيراتها الفعلية على خواص الأراضى بصفة عامة. ويعتمد هذا التأثير ـ بصفة أساسية ـ على مدى ثبات هذه المبيدات، وكذلك على المعاملات الزراعية لكل محصول.

وقد أشار رحال (١٩٧٩) إلى أن الأراضى تختلف فى سعتها الادمصاصية للمبيدات باختلاف قوامها؛ حيث تتفوق الأراضى الطمية على كل من الأراضى الجيرية والرملية. كما أن للمحتوى العضوى بالأراضى تأثيره المعنوى فى هذا الخصوص.

وتشير الدراسة أيضا إلى أن لنوعية المبيدات المستخدمة وأسلوب الرى المتبع دورهما المباشر فى تحديد سلوك المبيدات بالقطاع الأرضى، كما أوضح أن معظم العمليات المسؤولة عن اختفاء المبيدات المحببة والمستخدمة فى الدراسة (لندين/ دورسيان / تميك) كيماوية وليست حيوية.

وقد ركزت هذه الدراسة على تتبع النشاط الحيوى لميكروبات التربة نتيجة إضافة المبيدات السابقة؛ حيث تفاوتت فيما بينها من حيث تأثيرها على تثبيت النتروجين التكافلى واللاتكافلى والأنشطة الأخرى لميكروبات التربة.

ومن ناحية أخرى أشار عبد الحميد (١٩٩٢) إلى أن إضافة بعض المبيدات أدت إلى تأثير غير واضح على المغذيات الكبرى والصغرى، فى حين أظهرت تأثيرا معنوياً على خفض النتروجين الميسر بالتربة.

رابعا ـ تلوث الأراضى والنبات بعوادم السيارات:

يمثل هذا العامل أهمية كبرى؛ نظرا للتضاعف المستمر فى أعداد السيارات وحركة المرور، سواء داخل المدن، أو على الطرق السريعة، مما استدعى ضرورة تقييم هذا التأثير بالأراضى الزراعية المجاورة، وكذلك المحاصيل المنزرعة؛ وذلك من خلال تقدير عنصر الرصاص الداخل فى عمليات رفع كفاءة البنزين.

ومما لاشك فيه أن النتائج المتحصل عليها فى الدراسة التى قام بها الملا (١٩٨٠) تمثل منعطفا حادا فى مجال التلوث البيئى فى المجتمع المصرى حاليا، والذى يجب وضع الوسائل العملية الكفيلة بمواجهة آثاره الصحية. وتشير الدراسات إلى:

١ ـ علاقة معنوية موجبة بين كثافة المرور والتلوث بالرصاص فى كل من الطبقات السطحية وتحت السطحية للأراضى؛ فقد وصلت كمية الرصاص الكلى إلى ٦٦ ـ ١٨٩,٦ ، ٤٩,٥ ـ ١١٣,٩ ، و٤٢,٣ ـ ٥٧,٨ جزءاً فى المليون فى حالة الطرق العالية والمتوسطة والمنخفضة فى كثافة المرور بها على التوالى. وتتضح هذه العلاقة بصورة أفضل عند مقارنة أرقام هذا العنصر المستخلص حيث بلغت ١٠ ـ ٣٥٪، ٦,٦ ـ ١٨,٢٪، ٥ ـ ٨,٥٪ فى حالات المرور الثلاث السابقة على الترتيب.

٢ ـ زيادة محتوى النبات من الرصاص الكلى والمستخلص فى الأماكن القريبة من الطرق، وقلته بالبعدعن الطريق؛ فقد بلغ الرصاص الكلى ٧٥,٨، ١٧٩,٨ جزءاً فى المليون. وبلغ الرصاص المستخلص ٨,٥ ـ ٣٥، ٥ ـ ١٠ جزءاً فى المليون عند مسافة تبعد مترا، وخمسين مترا من الطريق على الترتيب.

٣ ـ تلوث أشجار الفيكس المنزرعة داخل ميادين القاهرة بعنصر الرصاص . وقد كانت أقصى درجة للتلوث فى ميدان التحرير، ثم فى ميدان رمسيس، ثم العباسية، ثم كوبرى القبة، ثم نادى الشمس.

٤ ـ أدت زيادة تركيز الرصاص بالنبات إلى انخفاض كمية المادة الجافة فى كل من الجذور والأجزاء الخضرية. وعموما يزداد تركيز هذا العنصر بالجذور مقارنة بالأجزاء الخضرية.

وقد تناول مصطفى موسى (١٩٩٠) موضوع التلوث بالرصاص من حيث تأثيره على محتوى التربة من العناصر الصغرى والكبرى بالتربة والنبات؛ حيث أشارت هذه الدراسة إلى تراكم هذا العنصر بالنباتات المنزرعة على جانبى الطريق؛ إذ ينخفض عنصر الرصاص بالبعد عن الطريق، فى حين تزداد عناصر المنجنيز والنحاس والزنك. وباستثناء عنصر الحديد يلاحظ معنوية العلاقة السالبة بين هذه العناصر وتركيز الرصاص.

٥ ـ يختلف تركيز الرصاص المستخلص بمحلول DTPA فى الأراضى الواقعة على كل جانب من جانبى الطريق، والذى يتوقف على اتجاه الرياح السائدة.

وفى دراسة أخرى تناول الباحث بدر الدين السيد (١٩٨٩) موضوع التلوث لعوادم السيارات من حيث تأثيرها فى الصفات المورفولوجية والسيتوراثية لبعض المحاصيل؛ حيث وجد ما يلى:

١ ـ تختلف كمية الأتربة المتساقطة فى الصيف عنها فى الشتاء لاختلاف الكثافة المرورية بالطريق الزراعى.

٢ ـ يقل محتوى الرصاص بأعضاء النبات لكل من القمح والذرة بزيادة المسافة بين النبات والطريق. ويبلغ أعلى تركيز فى الجذور والأوراق، فى حين يقل التركيز فى الحبوب. كما احتوت بادارت القمح على تركيزات أعلى إذا قورنت بالذرة.

٣ ـ أدى التلوث إلى انخفاض إنتاج الحبوب وزاد من قابليتها للتسوس. وتختلف هذه القابلية للتسوس باختلاف البعد عن الطريق.

٤ ـ أدى التلوث إلى زيادة فرصة إحداث شذوذ كروموسومى فى النباتات، وازدادت هذه الفرصة فى حالة النباتات القريبة من الطريق؛ ويعزى هذا الأمر إلى التركيزات العالية من كل من ثانى أكسيد الكبريت وأكاسيد النتروجين. وقد زادت هذه التشوهات فى حالة القمح مقارنة بالذرة.

وقد تناولنا ـ فيما سبق ـ مصادر التلوث المختلفة التى تؤثر على الأراضى الزراعية من حيث خواصها ومحتواها؛ بما ينعكس على المحاصيل المنزرعة. ومما لا شك فيه أن مشروعات خلط مياه المصارف بالمياه العذبة من أجل خفض محتواها الملحى (تمهيدا لاستخدامها فى سد الاحتياجات المائية، دون النظر إلى محتواها من العناصر الثقيلة والمبيدات والأسمدة الكيماوية ـ يعتبر إغماضا للعين عن الآثار المترتبة على استخدامها؛ إذ أن تخفيف تركيز هذه الملوثات لا يعنى تفادى آثارها التى تتراكم بالأرض والنبات بتوالى استخدامها.

obeikandl.com

المراجـــع

obeikandl.com

obeikandl.com

أولا ـ المراجع العربية:

١ ـ الأرض الجديدة (١٩٨٥). **المجلس القومى للإنتاج والشؤون الاقتصادية** ـ شعبة الإنتاج الزراعى.

٢ ـ **السياسة السمادية الحالية والمستقبلية (١٩٨٨)**. معهد بحوث الأراضى والمياه.

٣ ـ **المخطط الرئيسى للأراضى** ـ وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية ـ التقرير النهائى (١٩٨٦).

٤ ـ **المشروع القومى لحصر الأراضى الزراعية (المرحلة التفصيلية) (١٩٨٩)**. وزارة الأشغال والموارد المائية.

٥ ـ **تقارير الحصر التصنيفى للأراضى الزراعية (١٩٥٧ ـ ١٩٧٣)**. معهد بحوث الأراضى والمياه ـ مركز البحوث الزراعية.

٦ ـ جورج باسيلى ولوريس المصرى. (١٩٦٢) **تأثير أنواع مختلفة من المحاريث على ضغط الأراضى** ـ مجلة بحوث الأراضى.

٧ ـ خالد علام (١٩٧٥). **تخطيط التنمية الريفية المصرية** ـ المجلة الأفروآسيوية للبناء.

٨ ـ عبد الحميد إبراهيم مصطفى وآخرون (١٩٦٨). **دراسة تأثير مستوى الماء الأرضى فى ملوحة الأراضى فى شمال الدلتا**.

مجلة البحوث الزراعية ـ العدد ٢ ـ ابريل ١٩٦٨.

٩ ـ عبد الله زين العابدين ـ (١٩٥٩). **أسس علوم الأراضى** ـ دار آمون ـ الجيزة.

١٠ ـ محمد حسن كامل (١٩٨٨). **مقارنة تصنيفية للتربة للوقوف على مدى التحسن أو التدهور الذى طرأ على أراضى محافظة الفيوم** (١٩٦٠ ـ ١٩٨٠). ـ الندوة العلمية لدراسة مشاكل التربة والرى والصرف فى التنمية الزراعية بالفيوم.

١١ ـ محمد طه عيد (١٩٥٩). **القواعد الرئيسية للسياسة السمادية فى مصر** ـ الأسمدة والتسميد فى مصر.

١٢ ـ محمد عبد الهادى عبد الوهاب (١٩٩٢). **دراسة التصحر فى بعض الأراضى المصرية**.

رسالة ماجستير ـ كلية الزراعة ـ جامعة الأزهر.

١٣ ـ محمود طلحة (١٩٧٨). **تأثير الاندماج على بعض الخواص الطبيعية للأراضى الرسوبية والجيرية** ـ الجمعية المصرية لعلوم الأراضى.

١٤ ـ محمود عمر (١٩٥٩). **طريقة ملائمة لتقدير الفوسفات الصالح للاستفادة فى الأراضى المصرية** ـ الأسمدة والتسميد فى مصر.

١٥ ـ **مشروع التغيرات التى طرأت على خصوبة الأراضى المصربة** ـ أكاديمية البحث العلمى ـ المركز القومى للبحوث ـ (يوليو ـ ديسمبر ١٩٩١).

١٦ ـ مصطفى الجبلى (١٩٧٥). **نحو التخطيط العلمى للزراعة المصرية حتى عام (٢٠٠٠)** ـ الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع.

١٧ ـ معهد بحوث الأراضى والمياه ـ (١٩٩٠). **دراسات العناصر الصغرى والكبرى فى أراضى القطن لموسم (١٩٩٠)**.

obeikandl.com

ثانياً ـ المراجع الأجنبية :

1 - Ahmed, S. - et - al (1969).

Effect of adsorbed cations on physical properties of 4 tropical Red Earth and tropical Black Earth. J. Soil Sci., 20: 255 - 268.

2 - Abd El-Aziz, W. H., 1922.

Study on soil pollution in El-Saff Region.

M. Sc., Fac. of Agric., Ain Shams Univ.

3 - Abd El-Monim, S. A., 1991.

Study on pollutants in Egyptian Soils "Effect of some heavy metals on plants and soil". M. Sc. Fac. of Agric, Kafr Elsheikh, Tanta Univ.

4 - Abdel-Magid, A. R., 1978.

Forms of magnesium in some Egyptian soils with special reference to non-exchangeable form.

M. Sc., Fac. of Agric., Tanta Univ.

5 - Antipov & Hamaeva, 1958.

The role of exchangeable magnesium in the solonetz properties of soils. (C. F. Soils and Fert., 21: (2182) 1958.

6 - Balba, A. A., Kishk, F. M. and M. Shenawy, 1975.

Alkalinity as a new method for determination of C. E. C. and exchangeable Ca^{2+} and Mg^{2+} in calcareous soils.

J. Agric. Res., Tanta Univ., I: 138 - 150.

7 - Ball, J., 1939.

Contribution to the Geology of Egypt.

Egyptian Government press.

obeikandl.com

8 - Buckman, H. and N-Brady, 1960.

The nature and properties of soils.

Macmillan Co., New York, U. S. A.

9 - Dobal, A. T. S., 1989.

Studies on the soil pollution in Abu Rawash and El-Gabal El-Asfar areas due to continuous irrigation by sewage water.

M. Sc., Institute of African Research and Studies, Cairo Univ.

10 - Egypt major constraints to increasing agricultural productivity (USDA, USAID, MOA).

Foreign Agric. Econ. Report No. 120, (1982).

11 - El-Hadi, O. A., 1973.

Influence of drainage conditions on some physical and chemical properties of the alluvial soils of Egypt.

M. Sc., Fac. of Agric., El-Azhar Univ.

12 - El Gabaly, M. M., 1973.

Reclamation and management of the calcareous soils of Egypt., FAO, Bull: 21.

13 - El-Mola, S. H., 1980.

Studies on soil and Plant Pollution with lead.

M. Sc., Fac. of Agric., Ain Shams Univ.

14 - El Sayed, M. N., 1989.

A study of the effect of trafic pollution on the morphological and cytogenetical characters of some crops.

M. Sc., Fac. of Agric., Alexandria Univ.

obeikandi.com

15 - El-Tobgy, H., 1976.

Contemporary Egyptian agriculture.

Second edition.

16 - Es., J. Van & Schylenbergh, I., 1967.

Contribution to the Knowledge of a solonetzic magnesium-rich alluvial silty clay in Maro koemeplain.

Neth. J. Agric. Sc., 15: 11-20.

17 - Gaith, A. M., 1958.

Aim and methods of soil survey and land classification in Egypt.

Min. of Agric. Bull.: No. 283.

18 - Hawela, F. M., 1985.

A detailed study on the nature of magnesium affected soils in A. R. E.

Ph. D., Fac. of Agric., Ain Shams Univ.

19 - Jenny, H., 1941.

Factors of soil formation.

McGraw-Hill, New York.

20 - Khadr, M. and El Gabaly, M., 1955.

Magnesium forms in Egyptian Soils.

Alex. J. of Agric. Res. III No. 1: 24-32.

21 - Kovda, V., 1964.

Seminar on water logging in relation to irrigation and salinization problems., Egypt.

22 - Land master plan, 1986.

obeikandl.com

23 - Mansour, M. A., M. A. Mahmoud, H. S. Soliman and S. A. Elkishky, 1992.

A comparative study of salinity level changes of Kafr-Elsheikh Governorate soils within the period from 1960-1991.

Egypt J. Appl. Sci. 7 (6), 1992.

24 - Milad, Sh., El-Hakim, M., and Moustafa, F., 1974.

Effect of magnesium upon some physical properties in a medium textured Nile alluvial soil.

Agric. Res. Rev., Vol. 52 (1974).

25 - Mohamed, N. I., 1986.

Adsorption of some organic molecules on clays and soils.

Ph. D., Fac. of Agric., Ain Shams Univ.

26 - Morsi, M. A., 1990.

Studies on pollution of some Egyptian soils by heavy metals.

M. Sc., Fac. of Agric, El-Minia Univ.

27 - Mourad, A. Y., 1977.

Pedological study of some soils under different depositional enviroments in Kafr El-Sheikh Governorate.

M. Sc., Fac. of Agric., Tanta Univ.

28 - Moustafa, A. T. - et - al., 1968.

Studies on the problems of salinization of soils of Fowa markaz, Kafr El-Sheikh Governorate, UAR.

Agric. Res. Rev., Cairo, Vol. 47, No. 1.

29 - Nabhan, H. M., 1966.

M. Sc., Fac. of Agric., Cairo University.

openkandi.com

30 - Nofal, M. A., 1981.

Effect of some sources of pollution on the uptake of certain nutritional elements by plant.

M. Sc., Fac. of Agric., Ain Shams Univ.

31 - Padco Inc., ECG - et - al., 1982.

National urban policy study.

Draft final Report.

32 - Rahal, A. G., 1979.

Behaviour of some insecticides in soil and plant.

Ph. D., Fac. of Agric., Cairo Univ.

33 - Rehan, M. G., 1992.

The aspects of water resources of El-Asher of Ramadan city on their suitability from the stand point of different uses Ph. D., Fac. of Agric., Menoufyia Univ.

34 - Rizk, R. M., 1980.

Impact of urbanization on the agricultural area in the A. R. E.

M. M. Sc., Fac. of Agric., Zagazig Univ.

35 - Rizk, N. S., 1992.

The role of fertilizers, plant hormones and pesticides on the soil characteristics in relation to plant growth, its constituents and nematode control.

Ph. D., Fac. of Agric., Menoufyia Univ.

36 - SAAD, 1982.

Strategies of accelerating agricultural development.

MOA, USAID, USDA, Cairo.

37 - Selim, M., 1978.

Available water capacity in relation to plant type and climatological factors.

M. Sc., Fac. of Agric., Cairo Univ.

38 - Some studies on the calcareous soils of Egypt by the soil dept., Ain Shams Univ., FAO, Bull: 21.

39 - Spoor, G. and Ford, R. A., 1987.

Mechanics of mole drainage channel deterioration.

J. Soil Science, 38: 369 - 382.

40 - Symposium of land drainage for salinity control in arid and semi-arid regions, Cairo 1990.

a) Abu-Zied

Physical feature, and drainage priorities in Egypt.

b) Amer, H.

Design of drainage system with special reference to Egypt.

c) Spoor, G. and C. J. Cronin and P. B. L. Harrison.

Mole drain Installation for Leaching purposes.

d) El-Qowsy, D.

Effect of nationalization of irrigation water on drainage water in the Nile delta.

e) Skagg, M. H.

Simulation drainage system performance as affected by irrigation management.

41 - Thorne & Peterson, 1945.

Irrigated Soils.

McGraw-Hill Publ. Co. Ltd. Bombay, New Delhi.

42 - Water Master Plan Project, Egypt:

a) Loss of agricultural land (Report 28, 1984).

b) detailed examination of existing reclamation projects (Report 29, 1984).

43 - Zanaty, M., 1970.

Ph. D., Fac. of Agric., Ain Shams University.

44 - Zanaty, M., Bakhati, H. and M. Negm, 1976.

Availability and fixation of potassium in some calcareous soils.

Agric. Res. Rev., Cairo.

45 - Zanaty, M., P. N. Soltanpour, A. Moustafa and A. Keleg., 1982.

Soil Fertility Survey of Kafr El-Sheikh, El-Mansouria and El-Minya Sites.

Ewup Tech. Rep: 10.

obeikandl.com

obeikandl.com

رقم الإيداع
١٩٩٥ / ٢٣٤٣

obeikandl.com